

GUIDE DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

2010–2011

Publication 75F

Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales

Ontario

Jeter les éditions périmées de la présente publication. Chaque année, le sous-comité concerné du Comité de la recherche et des services en matière de lutte contre les ennemis des cultures de l'Ontario revoit les pesticides énumérés dans cette publication. À la connaissance du Comité, au moment de l'impression, tous ces pesticides avaient été :

- homologués par le gouvernement fédéral;
- classés par le ministère de l'Environnement de l'Ontario (MEO).

L'information fournie dans cette publication est d'ordre général seulement. En publiant ces recommandations, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en cas de pertes de produits végétaux ou animaux, d'inconvénients pour la santé, de préjudices causés au milieu naturel ou aux personnes par suite de l'utilisation d'un pesticide mentionné dans cette publication.

Un certain nombre de marques sont mentionnées dans la publication pour en faciliter la consultation; cela ne veut pas dire que le ministère cautionne ces produits ni que des produits similaires vendus sous d'autres marques sont inefficaces.

Étiquette du pesticide

Se référer aux renseignements figurant sur l'étiquette d'un produit avant de l'utiliser. Il faut se référer à l'étiquette du produit pour savoir comment l'utiliser en toute sécurité, et connaître notamment les dangers qu'il comporte, les restrictions d'utilisation, sa compatibilité avec d'autres substances et ses effets selon les conditions du milieu.

Le mode d'emploi indiqué sur l'emballage a force de loi. Utiliser un produit de toute autre façon constitue un délit.

Homologation fédérale des pesticides

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada homologue les pesticides à la suite d'une évaluation des données scientifiques visant à vérifier la valeur et le bien-fondé de chaque produit; elle veille aussi à ce que les risques pour la santé humaine et le milieu liés à l'utilisation projetée du produit soient acceptables.

1. **Homologation complète**
   L'homologation est généralement accordée pour une période de 5 ans, renouvelable par la suite.

2. **Homologation conditionnelle**
   L'homologation conditionnelle est accordée pour une période limitée et stipulée, sous réserve que le requérant accepte de fournir des données techniques ou scientifiques durant cette période, ou que le pesticide soit utilisé pour une intervention d'urgence en cas d'infestation ou d'infection majeure.

Limites maximales de résidus

L'ARLA a fixé des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides. Comme les transformateurs et les détaillants fixent parfois des normes plus sévères, les producteurs doivent se renseigner auprès de leurs clients sur les restrictions ou limitations qu'ils appliquent. On leur conseille de tenir un registre à jour et précis sur l'usage des pesticides dans chacune de leurs cultures.

Étiquette supplémentaire

Chaque utilisateur DOIT obtenir une étiquette supplémentaire et suivre toutes les indications qui s'y trouvent si l'ARLA autorise de nouvelles utilisations d'un pesticide homologué qui ne figurent pas sur l'étiquette initiale. Une étiquette supplémentaire est nécessaire, par exemple, dans chacun des cas suivants :

- **homologation conditionnelle pour une intervention d'urgence,**
- **homologation du produit pour un nouvel usage limité.**

On peut obtenir un exemplaire de l'étiquette supplémentaire auprès du fabricant ou du fournisseur, du regroupement de producteurs qui a parrainé l'homologation d'urgence ou l'usage restreint, du MAAARO ou du Service de renseignements de l'ARLA.

Pour plus d'information sur la situation d'un pesticide à l'égard de son homologation, consulter le site Web de l'ARLA à *www.pmra-arla.gc.ca* ou composer le 1 800 267-6315.

Réglementation des pesticides en Ontario

C'est le MEO qui est chargé de réglementer la vente des pesticides, leur utilisation, leur transport, leur entreposage et leur élimination en Ontario. La province réglemente les pesticides en donnant l'éducation appropriée, et en fixant les exigences concernant la délivrance des licences et permis, conformément à la *Loi sur les pesticides* et le Règlement 63/09.

De plus, il faut utiliser tous les produits pesticides conformément à la *Loi sur les pesticides* et au Règlement 63/09. Les textes de la loi et de son règlement d'application sont affichés sur le site Web *www.e-laws.gov.on.ca*; on peut aussi en faire la demande auprès de ServiceOntario, Publications, au numéro sans frais 1 800 668-9938, ou au 416 326-5300.

Classification des pesticides

Le Comité consultatif sur les pesticides de l'Ontario (OPAC) est chargé de revoir les pesticides et de faire ses recommandations au MEO à l'égard de la classification de chaque produit avant qu'il puisse être vendu ou utilisé en Ontario. Après l'approbation par le MEO, les produits sont affichés sur le site Web du MEO à l'adresse *www.ene.gov.on.ca*.

Permis et accréditation

Exigences visant les producteurs et leurs aides

Pour des détails sur la certification des producteurs et la formation de leurs aides, consulter le site Web du Programme ontarien de formation en matière de pesticides à *www.opep.ca* ou composer le 1 800 652-8573.

Exigences visant les entrepreneurs et leurs aides

Pour plus d'information sur la certification des exterminateurs, la délivrance de licences, et la formation des techniciens, consulter le site Web de Formation et accréditation des destructeurs de parasites à *www.ontariopesticide.com/OPTC/default.htm* ou composer le 1 888 620-9999 ou le 519 674-1575.

This publication is also available in English

Jeter les éditions périmées de la présente publication. Chaque année, le sous-comité concerné du Comité de la recherche et des services en matière de lutte contre les ennemis des cultures de l'Ontario revoit les pesticides énumérés dans cette publication. À la connaissance du Comité, au moment de l'impression, tous ces pesticides avaient été :

- homologués par le gouvernement fédéral;
- classés par le ministère de l'Environnement de l'Ontario (MEO).

L'information fournie dans cette publication est d'ordre général seulement. En publiant ces recommandations, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en cas de pertes de produits végétaux ou animaux, d'inconvénients pour la santé, de préjudices causés au milieu naturel ou aux personnes par suite de l'utilisation d'un pesticide mentionné dans cette publication.

Un certain nombre de marques sont mentionnées dans la publication pour en faciliter la consultation; cela ne veut pas dire que le ministère cautionne ces produits ni que des produits similaires vendus sous d'autres marques sont inefficaces.

Étiquette du pesticide

Se référer aux renseignements figurant sur l'étiquette d'un produit avant de l'utiliser. Il faut se référer à l'étiquette du produit pour savoir comment l'utiliser en toute sécurité, et connaître notamment les rangers qu'il comporte, les restrictions d'utilisation, sa compatibilité avec d'autres substances et ses effets selon les conditions du milieu.

Le mode d'emploi indiqué sur l'emballage a force de loi. Utiliser un produit de toute autre façon constitue un délit.

Homologation fédérale des pesticides

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada homologue les pesticides à la suite d'une évaluation des données scientifiques visant à vérifier la valeur et le bien-fondé de chaque produit; elle veille aussi à ce que les risques pour la santé humaine et le milieu liés à l'utilisation projetée du produit soient acceptables.

1. **Homologation complète**
   L'homologation est généralement accordée pour une période de 5 ans, renouvelable par la suite.

2. **Homologation conditionnelle**
   L'homologation conditionnelle est accordée pour une période limitée et stipulée, sous réserve que le requérant accepte de fournir des données techniques ou scientifiques durant cette période, ou que le pesticide soit utilisé pour une intervention d'urgence en cas d'infestation ou d'infection majeure.

Limites maximales de résidus

L'ARLA a fixé des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides. Comme les transformateurs et les détaillants fixent parfois des normes plus sévères, les producteurs doivent se renseigner auprès de leurs clients sur les restrictions ou limitations qu'ils appliquent. On leur conseille de tenir un registre à jour et précis sur l'usage des pesticides dans chacune de leurs cultures.

Étiquette supplémentaire

Chaque utilisateur DOIT obtenir une étiquette supplémentaire et suivre toutes les indications qui s'y trouvent si l'ARLA autorise de nouvelles utilisations d'un pesticide homologué qui ne figurent pas sur l'étiquette initiale. Une étiquette supplémentaire est nécessaire, par exemple, dans chacun des cas suivants :

- **homologation conditionnelle pour une intervention d'urgence.**
- **homologation du produit pour un nouvel usage limité.**

On peut obtenir un exemplaire de l'étiquette supplémentaire auprès du fabricant ou du fournisseur, du regroupement de producteurs qui a parrainé l'homologation d'urgence ou l'usage restreint, du MAAARO ou du Service de renseignements de l'ARLA.

Pour plus d'information sur la situation d'un pesticide à l'égard de son homologation, consulter le site Web de l'ARLA à *www.pmra-arla.gc.ca* ou composer le 1 800 267-6315.

Réglementation des pesticides en Ontario

C'est le MEO qui est chargé de réglementer la vente des pesticides, leur utilisation, leur transport, leur entreposage et leur élimination en Ontario. La province réglemente les pesticides en donnant l'éducation appropriée, et en fixant les exigences concernant la délivrance des licences et permis, conformément à la *Loi sur les pesticides* et le Règlement 63/09.

De plus, il faut utiliser tous les produits pesticides conformément à la *Loi sur les pesticides* et au Règlement 63/09. Les textes de la loi et de son règlement d'application sont affichés sur le site Web *www.e-laws.gov.on.ca*; on peut aussi en faire la demande auprès de ServiceOntario, Publications, au numéro sans frais 1 800 668-9938, ou au 416 326-5300.

Classification des pesticides

Le Comité consultatif sur les pesticides de l'Ontario (OPAC) est chargé de revoir les pesticides et de faire ses recommandations au MEO à l'égard de la classification de chaque produit avant qu'il puisse être vendu ou utilisé en Ontario. Après l'approbation par le MEO, les produits sont affichés sur le site Web du MEO à l'adresse *www.ene.gov.on.ca*.

Permis et accréditation

Exigences visant les producteurs et leurs aides

Pour des détails sur la certification des producteurs et la formation de leurs aides, consulter le site Web du Programme ontarien de formation en matière de pesticides à *www.opep.ca* ou composer le 1 800 652-8573.

Exigences visant les entrepreneurs et leurs aides

Pour plus d'information sur la certification des exterminateurs, la délivrance de licences, et la formation des techniciens, consulter le site Web de Formation et accréditation des destructeurs de parasites à *www.ontariopesticide.com/OPTC/default.htm* ou composer le 1 888 620-9999 ou le 519 674-1575.

This publication is also available in English.

GUIDE DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

2010–2011

Publication 75F

23770

Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales

Ontario

Cherchez-vous de l'information technique ou commerciale?

Communiquez avec le Centre d'information agricole au
1 877 424-1300 ou à *ag.info.omafra@ontario.ca*

Cherchez-vous sur Internet des recommandations sur les cultures?

www.ontario.ca/cultures

Vous y trouverez des fiches techniques, des articles et des photos sur la gestion des cultures de l'Ontario.

Remerciements
Photos des pages de couverture prises par Peter Smith et Annalee Winter — Université de Guelph.

PLAT RECTO — Grande photo : Matricaire inodore. Petites photos (de gauche à droite) : ketmie trilobée, millepertuis commun, petite bardane.
PLAT VERSO — De gauche à droite : carotte sauvage, souchet comestible, violette des champs.

TABLE DES MATIÈRES

1. PRINCIPES DE LUTTE INTÉGRÉE

Lutte non chimique 1
Période critique de lutte contre les mauvaises herbes 3
TABLEAU 1–1. Périodes critiques de lutte contre les mauvaises herbes dans les grandes cultures 3
TABLEAU 1–2. Périodes critiques d'absence de mauvaises herbes dans les cultures horticoles 4
Lutte contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides 4
TABLEAU 1–3. Perte de rendement (en %) dans le maïs du fait de peuplements connus de dicotylédones et de graminées annuelles non combattues ayant levé en même temps que la culture 5
TABLEAU 1–4. Perte de rendement (en %) dans le soya du fait de peuplements connus de dicotylédones et de graminées annuelles non combattues ayant levé en même temps que la culture 5
Lutte chimique contre les mauvaises herbes 6
TABLEAU 1–5. Peuplements confirmés en Ontario de mauvaises herbes résistant à des herbicides (en décembre 2009) 7

2. TECHNIQUES D'APPLICATION

Introduction 11
Entretien et utilisation des pulvérisateurs 12
Réglage du pulvérisateur 15
Comment calculer la quantité d'herbicide requise 17
Produits, préparations et mélanges 17

3. UTILISATION DES PESTICIDES EN ONTARIO

Homologation fédérale des pesticides 19
Réglementation des pesticides en Ontario 19
Accréditation et délivrance des licences 20
Renseignements sur l'application des pesticides 20
Protection de l'environnement 21
Élimination des pesticides 22
Entreposage des pesticides 23
Déversements de pesticides 23

4. HERBICIDES UTILISÉS EN ONTARIO

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario 25
TABLEAU 4–2. Description du système de classement des pesticides de l'Ontario 32
Notes sur les herbicides 33
TABLEAU 4–3. Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate 66
TABLEAU 4–4. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol) 67
TABLEAU 4–5. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol) 70
TABLEAU 4–6. Classement des herbicides utilisés en Ontario 72
TABLEAU 4–7. Intervalle entre traitement et pluie (postlevée) 74

5. NOTES SUR LES ADJUVANTS

Introduction 75
TABLEAU 5–1. Adjuvants utilisés en Ontario 82
TABLEAU 5–2. Doses d'adjuvant en fonction du volume dans la cuve du pulvérisateur 83

6. LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES EN PRÉSEMIS ET EN POSTRÉCOLTE

TABLEAU 6–1. Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis 85
TABLEAU 6–2. Évaluation des herbicides de présemis 87
Lutte contre les mauvaises herbes en présemis 89
TABLEAU 6–3. Évaluation des herbicides de postrécolte 92
Traitements localisés et traitements de postrécolte 93

7. HARICOTS ADZUKI, SECS, DE LIMA ET MANGE-TOUT

TABLEAU 7–1. Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout 95
Haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout 99

8. CULTURES CÉRÉALIÈRES

TABLEAU 8–1. Évaluation des anti-graminées et liste des herbicides homologués pouvant s'ajouter dans des mélanges en cuve destinés aux cultures céréalières 107
TABLEAU 8–2. Évaluation des herbicides pour les cultures céréalières 108
Céréales 110
Céréales 112

9. MAÏS SUCRÉ, DE SEMENCE ET DE GRANDE CULTURE

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) 119
TABLEAU 9–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) 126
Maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) 128
Stades de croissance foliaire du maïs 129
TABLEAU 9–3. Comparaison des méthodes d'évaluation du stade de croissance 130
Importance de la maîtrise des mauvaises herbes au départ de la culture 131
Maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) 133
Maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 151
TABLEAU 9–4. Rendement du maïs avec différentes stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le maïs tolérant le glyphosate 151
TABLEAU 9–5. Évaluation des herbicides dans le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 152
TABLEAU 9–6. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 154
TABLEAU 9–7. Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 155
Maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) 159
TABLEAU 9–8. Évaluation des herbicides dans le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) 159
TABLEAU 9–9. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) 161
TABLEAU 9–10. Stade foliaire maximal (ou hauteur maximale) des mauvaises herbes pour les applications d'herbicides de postlevée dans le maïs 164

10. CULTURES FOURRAGÈRES

TABLEAU 10–1. Évaluation des herbicides pour les fourrages 167
Graminées fourragères (production de semence uniquement) 170
Légumineuses fourragères semées sans plante-abri 171
Légumineuses fourragères établies 173
Sorgho et millet fourragers 176
Rénovation des pâturages avec du lotier 176
Pâturages (surtout de graminées) 177

11. SOYA

TABLEAU 11–1. Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire .. 181
TABLEAU 11–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le soya ordinaire 185
Soya 187
Soya « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 203
TABLEAU 11–3. Évaluation des herbicides pour le soya tolérant le glyphosage 203
TABLEAU 11–4. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le soya « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) 205
TABLEAU 11–5. Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destiné au soya tolérant le glyphosate 206
Soya « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) 210
TABLEAU 11–6. Évaluation des herbicides pour le soya « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) 210
TABLEAU 11–7. Stade foliaire maximal des mauvaises herbes pour les applications d'herbicides de postlevée dans le soya 212

12. AUTRES GRANDES CULTURES

TABLEAU 12–1. Évaluation des herbicides pour le canola, le lin, le millet, la moutarde, le sorgho et le tournesol ... 215
Arachides 218
Canola semé à l'automne et au printemps 218
Chanvre industriel cultivé pour la production de fibres 222
Lin 222
Moutarde 225
Sorgho et millet (grains) 226
Tabac 226
Tournesol 227

13. CULTURES LÉGUMIÈRES

TABLEAU 13–1. Évaluation des herbicides pour les légumes 231
Ail 234
Asperge 235
Betterave à sucre de transformation 240
Betterave rouge 244
Carotte 245
Céleri 248
Chicorée à café 249
Chou, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles 250
Concombre 252
Épinard 254
Fines herbes 255
Ginseng 256
Laitue 256
Légumes de spécialité : Brocoli de Chine, chou de Chine (pé tsaï), chou-rave, moutarde à feuille de chou, radis chinois, courge cendrée et pois chinois 257
Melon brodé, melon d'eau, courge et citrouille 259
Oignon 261
Panais 264
Patate douce 265
Poireau 266
Pois 267
Poivron 270
Pomme de terre 271
Rutabaga 276
Tomate repiquée 278

14. PETITS FRUITS

Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits 285
TABLEAU 14–1. Évaluation des herbicides pour les fraisiers 287
Bleuetier en corymbe 289
Canneberge 292
Fraisiers 295
Framboisier 301
Gadellier et groseillier à maquereau 303

15. ARBRES FRUITIERS ET VIGNES

Méthodes culturales de désherbage dans les cultures fruitières 305
TABLEAU 15–1. Évaluation des herbicides pour les cultures fruitières 307
Abricotier 310
Cerisier et prunier 314
Pêcher 319
Poirier 324
Pommier 330
Vigne 336

16. CULTURES DE PÉPINIÈRE ET CULTURES ORNEMENTALES

TABLEAU 16–1. Évaluation des herbicides pour le matériel de pépinière 344
Plantes ornementales herbacées 345
Brise-vent établis 346
Brise-vent transplantés 347
Pépinière — Plantes ligneuses de plein champ 348
Plantes ligneuses de pépinière — lits destinés à recevoir des contenants 353
Allées, patios et sentiers 375
Planches de semis et terreau d'empotage 357

17. GAZONS (TERRAINS DE GOLF, GAZONNIÈRES ET AUTRES USAGES ACCEPTÉS)

Lutte contre les mauvaises herbes dans les gazons 359
Méthodes de lutte culturales 359
Désherbage chimique 360
TABLEAU 17–1. Évaluation des herbicides pour les gazons 361
Terrains de golf, gazonnières et autres usages acceptés 363

18. BORDS DE ROUTES ET SOLS NON CULTIVÉS

Bords de routes, emprises, lisières de champs et zones non cultivées 369
Lutte contre les broussailles 370
Lutte contre les conifères et autres espèces à feuillage persistant 374
Traitements généraux contre les espèces ligneuses 375
Lutte contre les mauvaises herbes vivaces sur les sols non cultivés 376
Lutte contre l'herbe à puce 379
Réduction de la dérive d'herbicide 380
Désherbage des bords de routes 381
Désherbage total à long terme 383
Désherbage sélectif à long terme 384
Désherbage total à court terme 385
Désherbage des fossés à sec 385
TABLEAU 18–1. Classement des espèces ligneuses selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires de mélanges et de produits herbicides 386
TABLEAU 18–2. Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires 388

19. MAUVAISES HERBES AQUATIQUES

Mauvaises herbes aquatiques 393
TABLEAU 19–1. Habitats et sensibilité aux herbicides des plantes aquatiques communes 397

20. ANNEXES

ANNEXE A. Personnes ayant pris part à l'élaboration du Guide 2010–2011 399
ANNEXE B. Glossaire de la lutte contre les mauvaises herbes 400
ANNEXE C. Personnel de consultation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario 402
ANNEXE D. Ministère de l'Environnement de l'Ontario — coordonnées des bureaux régionaux 405
ANNEXE E. Autres ressources 406
ANNEXE F. Service de diagnostic 406
ANNEXE G. Système international d'unités (SI) 407
ANNEXE H. Fabricants et distributeurs d'herbicides 409
ANNEXE I. Liste de sites Web de référence sur la lutte contre les mauvaises herbes 409
ANNEXE J. Usage responsable du glyphosate dans les grandes cultures 410
ANNEXE K. Registre d'épandage des herbicides 411

1. PRINCIPES DE LUTTE INTÉGRÉE

La lutte intégrée contre les mauvaises herbes tire le meilleur parti possible de toutes les stratégies de lutte offertes afin de maîtriser les peuplements de plantes adventices. Ces stratégies comprennent des méthodes de lutte culturales, mécaniques et chimiques. Toutes ces pratiques font partie de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes. Prises isolément, aucune de ces mesures n'offre une maîtrise suffisante des mauvaises herbes. En observant les principes de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes, le producteur peut réduire l'emploi d'herbicides et en même temps s'assurer d'un rendement économique optimal.

Lutte non chimique

Voici différentes méthodes de lutte non chimique; un programme de lutte contre les mauvaises herbes doit intégrer plusieurs d'entre elles pour être efficace :

- identification et connaissance des mauvaises herbes à combattre (annuelles, bisannuelles, vivaces);
- interventions planifiées (stratégie souple);
- inspections périodiques des champs pour corriger le tir;
- pratiques de travail du sol (semis direct, travail de conservation du sol, labour);
- choix de la fréquence et du moment du travail du sol;
- semis sur sol rassis;
- rotation des cultures pour qu'elles fassent concurrence aux mauvaises herbes;
- choix des cultures et des cultivars;
- choix du moment des semis;
- écartement des rangs, densité de peuplement;
- utilisation de semence propre;
- nettoyage du matériel entre les champs (cultivateurs, moissonneuses-batteuses);
- prévention de la production de graines par la maîtrise des échappées de mauvaises herbes;
- lisières des champs et abords de la propriété;
- maîtrise des apports d'éléments fertilisants;
- fumier composté;
- cultures de couverture pour garder le sol couvert et tenir les mauvaises herbes en échec;
- sols sains, biologiquement actifs;
- prédation des graines de mauvaises herbes;
- paillis de plastique ou de résidus de culture;
- hersage après les semis, avant la levée de la culture;
- passage de la houe rotative après les semis, avant la levée de la culture;
- hersage après la levée de la culture;
- passage de la houe rotative après la levée de la culture;
- sarclage des rangs;
- traitements thermiques à la flamme ou à la vapeur ou l'eau chaude;
- binage, arrachage, dépistage;
- fauchage.

Observation sur le terrain

L'observation sur le terrain, un élément clé de la lutte intégrée, consiste à parcourir le champ et à recueillir des données sur les mauvaises herbes et la culture (distribution des mauvaises herbes, stades de croissance des mauvaises herbes et de la culture, peuplements, etc.). À court terme, cette information sert à prendre des décisions immédiates pour contrer les mauvaises herbes et éviter les pertes économiques. À long terme, l'observation sur le terrain joue un rôle important dans l'évaluation de la réussite ou de l'échec des programmes de lutte contre les mauvaises herbes et dans les décisions qui seront prises à l'avenir.

Rotation des cultures

La rotation des cultures consiste à produire en alternance sur une même terre différentes cultures suivant une séquence systématique. Il s'agit d'une stratégie importante et efficace dans le cadre d'un programme à long terme de lutte contre les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ont tendance à prospérer lorsqu'elles poussent dans des cultures qui ont les mêmes exigences de croissance qu'elles. Les pratiques culturales destinées à profiter à la culture peuvent également favoriser la croissance et la propagation des mauvaises herbes. La monoculture, c.-à-d. la culture de la même espèce dans le même champ, année après année, amène une accumulation des espèces de mauvaises herbes qui se sont adaptées aux conditions de croissance de la culture. Lorsque la rotation comprend une diversité d'espèces, la germination des graines et les cycles de croissance se trouvent perturbés par les variations dans les pratiques culturales associées à chaque culture (travail du sol, dates de semis, concurrence exercée par la culture, etc.).

Cultures de couverture

Le fait d'inclure dans l'assolement des cultures de couverture comme le seigle, le trèfle rouge, le sarrasin et le radis oléagineux ou des cultures qui restent sur pied l'hiver comme les fourrages ou blés d'automne peut retarder la croissance des mauvaises herbes. Les cultures à croissance rapide ou les cultures qui affichent des propriétés allélopathiques peuvent aussi maîtriser temporairement les mauvaises herbes. On peut aussi produire pendant une courte durée des cultures offrant une forte concurrence afin d'étouffer les mauvaises herbes. De plus, les

résidus des cultures de couverture laissés à la surface du sol retardent la croissance des plantes adventices en gardant le sol plus frais et protégé des rayons du soleil. La destruction temporaire des mauvaises herbes dans une culture et après une culture réduit le nombre de graines de mauvaises herbes viables dans le sol. Au moment de choisir une culture de couverture, se demander quels effets la culture de couverture et sa gestion peuvent avoir sur la culture qui la suit.

Cultures intercalaires

L'établissement d'une culture intercalaire a pour effet d'étouffer les mauvaises herbes entre les rangs de la culture principale et de maîtriser de ce fait temporairement les mauvaises herbes. Il faut cependant faire preuve de prudence dans l'utilisation d'une culture intercalaire, car celle-ci peut abaisser considérablement le rendement de la culture principale, si elle entre en concurrence avec cette dernière pour l'eau et les éléments nutritifs.

Fertilisation azotée

L'utilisation d'engrais azoté peut influencer la concurrence qui s'exerce entre les cultures et les mauvaises herbes dans les cultures subséquentes. Par exemple, il est connu que le nitrate favorise la germination et la production de graines chez certaines espèces de mauvaises herbes. La fertilisation azotée peut donc favoriser la croissance des mauvaises herbes plutôt que le rendement de la culture. La localisation sélective de l'azote en bande peut favoriser la culture et non les mauvaises herbes. L'utilisation de résidus de légumineuses au lieu d'engrais chimiques azotés pour répondre aux besoins de fertilisation azotée d'une culture peut retarder la croissance des mauvaises herbes. Les résidus de légumineuses libèrent l'azote lentement et stimulent moins la croissance des mauvaises herbes.

Modèles de plantation

La densité de peuplement de la culture, l'arrangement spatial et le choix du cultivar (variété) peuvent influencer la croissance des mauvaises herbes. Ainsi, des rangs étroits et une densité de semis plus élevée réduisent la biomasse des mauvaises herbes qui lèvent plus tard en réduisant la quantité de lumière dont bénéficient les mauvaises herbes situées sous le feuillage de la culture. De même, les cultivars qui poussent plus rapidement ont une longueur d'avance sur les mauvaises herbes.

Système cultural

Le système cultural modifie la teneur du sol en graines et la profondeur d'enfouissement des graines de mauvaises herbes. Dans les champs où se pratique le semis direct, près de 75 % des graines de mauvaises herbes présentes dans le sol sont concentrées dans les 5 premiers cm de sol. Dans les champs labourés, toutefois, les graines sont mieux réparties sur toute la profondeur du sol. Les méthodes culturales de conservation du sol offrent des situations à mi-chemin entre les deux.

Quand les graines de mauvaises herbes sont enfouies peu profondément, la levée des plantules est souvent plus uniforme et la maîtrise se trouve de ce fait facilitée. Quand les graines de mauvaises herbes se trouvent plus près encore de la surface du sol, elles sont davantage dévorées ou endommagées par les insectes, les animaux, les prédateurs et les organismes pathogènes.

Hersage de prélevée ou hersage en plein

Le hersage se fait après le semis, quand la semence a germé et qu'elle est sur le point de lever. À ce moment crucial, le hersage détruit les plantules de mauvaises herbes déjà présentes. La culture lèvera peu après; elle aura pris de l'avance sur les mauvaises herbes qui lèveront ensuite. Bien pratiquée, cette méthode peut être très efficace contre les mauvaises herbes annuelles dans les cultures à grosses graines. Souvent, elle donne aussi d'assez bons résultats contre les dicotylédones annuelles dans les céréales. Dans les cultures en lignes, le hersage permet de supprimer la partie aérienne des mauvaises herbes jusqu'à ce que les plantes cultivées soient assez vigoureuses pour supporter les autres méthodes mécaniques. N'importe quelle herse légère peut être utilisée. Le hersage en plein de cultures contre-ensemencées de graminées ou de légumineuses est déconseillé.

Herse-bineuse

La herse-bineuse est munie de dents semi-rigides qui n'endommagent pas les plantes cultivées, mais qui arrachent ou recouvrent les mauvaises herbes annuelles qui sont plus petites. La différence de développement entre les plantes cultivées et les mauvaises herbes est donc importante. Cette technique est plus efficace si elle est faite avant la levée de la culture. Dans de nombreuses cultures, elle peut aussi être utilisée après la levée. Il s'ensuivra un certain éclaircissement du peuplement. Les réglages de la vitesse et de la pression sont importants si l'on veut réduire au minimum la perte de plants. Les herses-bineuses sont surtout efficaces dans les cultures légumières de plein champ, le maïs, le soya et les céréales.

Houe rotative

Les dents de la houe rotative soulèvent et malaxent la terre, déracinant ainsi les petites mauvaises herbes. Il est important de maintenir une vitesse de 10 à 20 km/h, pour obtenir des résultats satisfaisants. On obtient les meilleurs résultats en fin d'avant-midi ou l'après-midi quand la chaleur du soleil fait faner les mauvaises herbes déracinées. De plus, les plantes cultivées ont tendance à être plus flexibles durant cette période de la journée de telle sorte que les dommages sont ainsi réduits. Les houes rotatives causent normalement moins de dommages aux cultures que les herses. Elles permettent aussi de briser la croûte du sol et d'incorporer les herbicides appliqués en surface, ce qui améliore la destruction des mauvaises herbes. Sur les sols légers

ou les sols meubles, il faut veiller à ce que le travail de la houe rotative demeure superficiel.

Sarclage ou binage

Le travail superficiel entre les rangs des cultures en lignes déracine les mauvaises herbes jeunes et sectionne les plus développées. Divers types d'équipement peuvent être utilisés, mais quand on utilise des pattes d'oie, il faut prévoir jusqu'à 50 % de chevauchement pour obtenir un désherbage complet. Équiper les machines de caches protecteurs pour éviter d'ensevelir les petites cultures.

Le sarclage complète avantageusement un traitement herbicide. Il renforce l'action de l'herbicide, de sorte que la dose d'herbicide utilisée peut être réduite, en particulier, avec des applications en bande. Dans les cultures qui ont une longue saison de végétation, comme le maïs, il faut parfois sarcler plus d'une fois. Le premier sarclage est sans doute le plus important car les mauvaises herbes qui y échappent peuvent atteindre leur pleine maturité. La hauteur de la culture par rapport au stade de croissance des mauvaises herbes est importante et peut empêcher un désherbage à 100 %. Les techniques mentionnées précédemment, hersage en plein, passage d'une herse-bineuse et/ou d'une joue rotative, créent des conditions favorables qui contribuent à faire en sorte que le sarclage donne de bons résultats lorsque la lutte contre les mauvaises herbes se fait sans emploi de produits chimiques.

Fauchage

Le fauchage ou la tonte contribue à réduire la population de mauvaises herbes dans les vergers, en bordure de routes, dans les pâturages, dans les pelouses, etc. La récolte du foin et des céréales aide aussi à limiter les mauvaises herbes. Le fauchage des chaumes de céréales au mois d'août peut réduire la croissance des mauvaises herbes et leur montée à graines. Cela est particulièrement efficace si la céréale est contre-ensemencée d'une culture comme le trèfle rouge qui rivalise avec la repousse des mauvaises herbes. Le meilleur moment pour faucher les mauvaises herbes vivaces est au stade du bouton floral avant que leurs racines accumulent des réserves et que les tiges montent à graines. Si une application d'herbicide est prévue plus tard en saison, il faut laisser passer suffisamment de temps pour que la mauvaise herbe repousse après le fauchage.

Pour plus de détails, voir les différentes sections sur les cultures.

Période critique de lutte contre les mauvaises herbes

Le choix du moment de l'intervention est un élément clé de la lutte intégrée. On définit la période critique comme étant l'intervalle dans le cycle biologique de la culture où l'on doit maintenir celle-ci exempte de mauvaises herbes, sous peine de s'exposer à des baisses de rendement.

L'établissement d'une période critique aide à déterminer le moment optimal des applications d'herbicides de postlevée sans rémanence, ce qui réduit la nécessité de recourir aux herbicides ayant un effet rémanent qui dure toute la saison et aux applications tardives d'herbicides. Compte tenu des variations au chapitre du sol, du climat et de l'avancement de la saison, on définit les périodes critiques en fonction des stades phénologiques de la culture. Il s'agit des périodes pendant lesquelles on doit garder la culture exempte de mauvaises herbes pour éviter une baisse de rendement supérieure à 5 %. Voir le tableau 1–1, *Périodes critiques de lutte contre les mauvaises herbes dans les grandes cultures,* ci-contre et le tableau 1–2, *Périodes critiques d'absence de mauvaises herbes dans les cultures horticoles,* p. 4.

Si l'on réussit à maîtriser les mauvaises herbes durant la période critique, les mauvaises herbes qui lèveront par la suite ne nuiront pas au rendement et pourront être détruites chimiquement avant la récolte, au besoin, par un traitement destiné à dessécher la culture et à faciliter la récolte.

TABLEAU 1–1. Périodes critiques de lutte contre les mauvaises herbes dans les grandes cultures

Culture	Période critique de lutte
Haricots blancs	2e feuille trifoliée à première fleur
Maïs	3e à 8e feuille
Soya	1re à 3e feuille trifoliée

La période critique peut varier selon les conditions météorologiques et les conditions de croissance. Des recherches sur le maïs et le soya révèlent que la période critique peut varier selon le type de sol et le système de travail du sol, c'est-à-dire que la période critique peut se prolonger légèrement dans les sols argileux ou dans les systèmes de culture sans préparation de sol.

Haricot blanc — La période critique s'étend du stade de la seconde feuille trifoliée à celui de la première fleur (V3 à R1) du haricot blanc (environ les 45 jours qui suivent les semis).

Maïs — La période critique va du stade 3 feuilles au stade 8 feuilles (4e à 10e pointe de feuille visible dans le cornet, ou V2 à V6). Durant cette période critique, il faut exercer une lutte vigilante contre les mauvaises herbes. Le maïs gardé exempt de mauvaises herbes pendant environ 34 jours après les semis ou jusqu'au stade 6–8 feuilles (8e à 10e pointe de feuille) affiche une baisse de rendement de seulement 0 à 5 % sous des conditions de forte concurrence exercée par les mauvaises herbes.

Soya — La période critique s'étend du stade de la première feuille trifoliée à celui de la troisième feuille trifoliée du soya (V2 à V3). Le soya gardé exempt de mauvaises herbes pendant environ 15 jours après sa

TABLEAU 1–2. Périodes critiques d'absence de mauvaises herbes dans les cultures horticoles

Culture	Période critique d'absence
Betterave	Les 2–4 premières semaines après la levée
Carotte	Les 3–6 premières semaines après la levée
Chou hâtif	Les 3 premières semaines après les semis
Concombre à mariner	Les 4 premières semaines après les semis
Courge	Inconnue, mais les semis hâtifs livrent une meilleure concurrence
Fraisier, nouvelle plantation	Durant mai et juin
Laitue	Les 3 premières semaines après les semis
Oignon	Toute la saison
Pomme de terre	Les 4 premières semaines après les semis
Pommier, nouvelle plantation	Durant mai et juin
Pommier en production	Débourrement jusqu'à 30 jours après la floraison
Tomate repiquée	Les 36 premiers jours après le repiquage
Tomate semée	Les 9 premières semaines après la levée des plantules

levée affiche une baisse de rendement attribuable aux mauvaises herbes de seulement 0 à 5 %.

Cultures horticoles — Ces cultures sont très sensibles à la concurrence exercée par les mauvaises herbes. Elles devraient être maintenues exemptes de mauvaises herbes depuis les semis, la levée ou le débourrement, jusqu'à la fin de la période critique d'absence de mauvaises herbes. Cette période diffère légèrement de la période critique de lutte contre les mauvaises herbes, mais est utile pour les cultures dans lesquelles la lutte contre les mauvaises herbes repose essentiellement sur les herbicides de prélevée appliqués au sol ou le sarclage. Si l'on maintient la culture exempte de mauvaises herbes pendant la période critique d'absence de mauvaises herbes, on ne subit généralement pas de perte de rendement. Les mauvaises herbes qui lèvent après la période critique d'absence de mauvaises herbes n'affectent pas les rendements, mais les efforts de lutte déployés après cette période peuvent faciliter la récolte ou atténuer la gravité des infestations les années suivantes s'il s'agit de cultures vivaces.

Seuils de nuisibilité économique

Les seuils de nuisibilité économique aident à déterminer si la densité de peuplement et les répercussions des mauvaises herbes justifient le recours à des mesures de lutte. La valeur de la perte de rendement évitée devrait compenser le coût du traitement herbicide. Les pertes de rendement dépendent en bonne partie du moment de la levée des mauvaises herbes par rapport à celle de la culture. Les mauvaises herbes qui lèvent en même temps que la culture entraînent davantage de pertes de rendement que celles qui lèvent une fois que la culture est établie. Ainsi, des études des seuils de nuisibilité de l'amarante à racine rouge, de la petite herbe à poux et de l'échinochloa pied-de-coq montrent que le moment de la levée des mauvaises herbes par rapport au stade de croissance de la culture importe davantage dans le choix d'une méthode de lutte que la densité de peuplement des plantes adventices. Les pertes de rendement sont déterminées par le moment relatif de la levée des plantules de mauvaises herbes. Les tableaux 1–3 et 1–4, p. 5, présentent une estimation des pertes de rendement associées à certaines mauvaises herbes qui lèvent au même moment que le maïs et le soya.

Les périodes critiques et les seuils d'intervention économique ne s'appliquent pas aux mauvaises herbes comme le phytolaque d'Amérique et la morelle noire de l'Est, lesquelles peuvent nuire à la qualité de la culture. La tolérance à l'égard de telles mauvaises herbes est nulle.

Lutte contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides

Il n'y a pas que chez les mauvaises herbes que les résistances apparaissent. Partout dans le monde, d'autres catégories d'ennemis des cultures peuvent afficher des résistances aux antibiotiques, aux insecticides et aux fongicides.

En Ontario, la documentation fait état de la résistance de mauvaises herbes à des herbicides des groupes 2, 4, 5, 7, 9 et 22, comme l'indique le tableau 1–5, *Peuplements confirmés en Ontario de mauvaises herbes résistant à des herbicides (en décembre 2009)*, p. 7. Dans l'Ouest du pays et aux États-Unis, une résistance est apparue aux groupes 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 (voir tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario*, p. 72).

Retarder la résistance aux herbicides

Avec le temps, les peuplements de mauvaises herbes peuvent subir des changements dus à l'application répétée d'herbicides appartenant à un même groupe. La présence de biotypes de mauvaises herbes résistants peut alors réduire l'efficacité du produit. La vitesse d'apparition d'une résistance à différents types d'herbicides est extrêmement variable d'une espèce de mauvaise herbe à l'autre et d'un peuplement à l'autre. Voici une série de mesures que de nombreux agriculteurs adoptent pour prévenir ou à tout le moins ralentir la prolifération des mauvaises herbes résistantes aux herbicides.

1. **Identification et vigilance :**
   Rien ne distingue en apparence les mauvaises herbes résistantes. Elles sont donc difficiles à identifier. On sait qu'il est fréquent que des mauvaises herbes échappent aux traitements chimiques. On ne conclut normalement à l'apparition d'une résistance que lorsqu'un peuplement devient résistant dans

TABLEAU 1–3. Perte de rendement (en %) dans le maïs du fait de peuplements connus de dicotylédones et de graminées annuelles non combattues ayant levé en même temps que la culture *

Dicotylédones annuelles	% si 1 plante/m²	% si 5 plantes/m²
Abutilon	4	15
Amarante	11	34
Chénopode blanc	12	35
Grande herbe à poux	13	36
Lampourde glouteron	6	22
Morelle noire de l'Est	2	7
Moutarde des champs	5	18
Petite herbe à poux	5	21
Renouée liseron	2	10
Renouée persicaire	3	13
Graminées annuelles	**% si 1 plante/m²**	**% si 5 plantes/m²**
Digitaire	1	3
Échinochloa pied-de-coq	2	7
Panic capillaire	1	5
Panic d'automne	2	10
Panic millet	2	10
Sétaire géante	2	10
Sétaire glauque	1	5
Sétaire verte	2	7

* Adaptation d'après *www.weedpro75.com*.

TABLEAU 1–4. Perte de rendement (en %) dans le soya du fait de peuplements connus de dicotylédones et de graminées annuelles non combattues ayant levé en même temps que la culture *

Dicotylédones annuelles	% si 1 plante/m²	% si 5 plantes/m²
Abutilon	6	23
Amarante	12	36
Chénopode blanc	13	38
Grande herbe à poux	14	40
Lampourde glouteron	15	41
Morelle noire de l'Est	14	40
Moutarde des champs	5	20
Petite herbe à poux	10	33
Renouée liseron	4	15
Renouée persicaire	4	15
Graminées annuelles	**% si 1 plante/m²**	**% si 5 plantes/m²**
Digitaire	1	4
Échinochloa pied-de-coq	3	12
Maïs spontané	4	15
Panic capillaire	1	4
Panic d'automne	2	10
Panic millet	3	12
Sétaire géante	3	12
Sétaire glauque	1	5
Sétaire verte	2	8

* Adaptation d'après *www.weedpro75.com*.

une proportion de 10 à 30 %. Il faut donc inspecter les champs régulièrement et recourir à la méthode proposée ci-dessous pour détecter toute résistance avant que le problème s'aggrave.

2. **Prévention de la dissémination des mauvaises herbes :**
Avant d'entrer dans un champ ou au sortir du champ, nettoyer le matériel. Ne pas permettre la montée à graines des mauvaises herbes résistantes.

3. **Recours au désherbage mécanique :**
Combiner, dans la mesure du possible, désherbage chimique et désherbage mécanique à l'aide notamment de la houe rotative ou du cultivateur.

4. **Rotation des cultures et des herbicides :**
Faire une rotation des herbicides utilisés de façon à ne pas utiliser année après année des herbicides appartenant au même groupe. Le meilleur moyen de faire la rotation des herbicides est habituellement de pratiquer la rotation des cultures et de continuer évidemment de prêter attention aux groupes d'herbicides employés. Voir le tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario*, p. 72, pour s'assurer de choisir des herbicides appartenant à des groupes différents. Une planification soignée permet d'éviter l'utilisation excessive d'un même groupe d'herbicides. Quand il est possible de le faire, utiliser des mélanges en cuve ou des mélanges commerciaux qui renferment des ingrédients actifs ayant des modes d'action complètement différents.

5. **Tenue de registres :**
   Tenir des registres précis des rotations de cultures effectuées et des herbicides utilisés dans chacun des champs. Des registres bien tenus facilitent la planification des stratégies à long terme de lutte contre les mauvaises herbes.

6. **Communication :**
   Communiquer avec des associations de producteurs, des malherbologistes, des spécialistes en cultures, des entreprises agricoles, des amis et voisins pour discuter avec eux des problèmes de résistance dont ils sont témoins. Informer le gouvernement ou le représentant de l'industrie des cas de résistance observés de manière à faciliter la prise de mesures appropriées pour prévenir la dissémination des sources résistantes.

Diagnostiquer une résistance

Avant de conclure à l'apparition d'une résistance, il importe d'éliminer toutes les autres causes pouvant expliquer l'inefficacité d'un traitement, notamment : application mal faite, conditions météorologiques défavorables, traitement effectué au mauvais moment, et poussées de croissance des mauvaises herbes après l'application d'un herbicide non rémanent. Si, après analyse, on retient toujours la possibilité d'une résistance, faire les vérifications suivantes :

1. Le traitement a-t-il été efficace contre d'autres mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette du produit? Advenant l'apparition d'une résistance, il est fort probable que celle-ci ne se développerait dans un champ que chez une seule espèce de mauvaise herbe. S'il reste plusieurs mauvaises herbes normalement sensibles au traitement, il faut passer de nouveau en revue les autres causes possibles de l'échec du traitement.

2. A-t-on remarqué les années antérieures qu'à un même endroit dans le champ, le même herbicide ou des herbicides appartenant à un même groupe (voir tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario*, p. 72) et partageant le même mode d'action demeuraient inefficaces?

3. Selon les registres applicables au champ, y a-t-il eu année après année utilisation intensive du même herbicide ou d'herbicides appartenant à un même groupe?

Si l'on a répondu par l'affirmative à l'une ou à plusieurs des questions qui précèdent, il est possible que les mauvaises herbes soient devenues résistantes à l'herbicide. Si l'on soupçonne une résistance, il importe d'empêcher les mauvaises herbes de monter à graines en utilisant un herbicide appartenant à un groupe différent ou en recourant à une méthode de lutte autre que chimique. Il faut ensuite communiquer avec un malherbologiste, le fournisseur d'herbicides et l'entreprise de fabrication de produits chimiques pour mettre au point un programme intégré de lutte contre les mauvaises herbes afin de venir à bout du problème.

Pour plus d'information sur la résistance aux herbicides, voir :

- la fiche technique n° 01-024 du MAARO, *La résistance des mauvaises herbes aux herbicides*,
- l'étude intitulée *International Survey of Herbicide Resistant Weeds* à http://weedscience.com/
- *Herbicide Resistant Weeds in Ontario* sur le site : www.plant.uoguelph.ca/resistant-weeds/

Tests de résistance des mauvaises herbes aux herbicides

Le Département de phytotechnie de l'Université de Guelph est à même de vérifier la résistance d'espèces de mauvaises herbes suspectes. Pour plus d'information, faites le 1 877 424-1300.

Lutte chimique contre les mauvaises herbes

On utilise des produits chimiques pour détruire les mauvaises herbes, soit de façon sélective sur des sols cultivés, soit de façon non sélective dans le cas de terrains non cultivés comme le bord des routes, le long des clôtures et dans les endroits difficiles à travailler. Les recommandations concernant les traitements qui figurent dans ce guide sont basées sur de nombreux essais et observations en conditions réelles. Ne pas utiliser d'herbicides dans des couches froides ou des serres.

Périodes de désherbage chimique des cultures

La sensibilité des cultures et des mauvaises herbes aux herbicides dépend du moment où ceux-ci sont appliqués. Il est donc important d'utiliser le produit au moment où la culture présente le maximum de résistance et où les mauvaises herbes sont les plus sensibles. Ce moment varie selon la culture et selon l'herbicide utilisé. Sauf indications contraires, le moment est fonction du stade du développement des plantes cultivées.

Traitement de présemis ou de préplantation

On applique les traitements de présemis ou de préplantation (PP) avant que la superficie cultivée soit semée ou plantée. Certains herbicides ainsi utilisés agissent sur les jeunes plants de mauvaises herbes en germination, d'autres peuvent aussi faire mourir les graines de mauvaises herbes. Lorsqu'ils sont utilisés en présemis ou avant la plantation, certains herbicides doivent être complètement incorporés au sol (IPS) peu après leur application. On trouvera, dans les pages de la présente publication, des conseils sur la façon d'incorporer ces herbicides au sol, chaque fois qu'ils sont répertoriés.

Traitement de prélevée

On applique les herbicides de prélevée (PRÉ) après le semis, mais avant la levée de la mauvaise herbe ou de

TABLEAU 1–5. Peuplements confirmés en Ontario de mauvaises herbes résistant à des herbicides (en décembre 2009)

Groupe d'herbicides*	Espèce	Lieu(x)
2	amarantes à racine rouge et de Powell	Bruce, Elgin, Essex, Hamilton-Wentworth, Huron, Kent, Lambton, Middlesex, Oxford, Perth, Stormont, Dundas et Glengary, Wellington
2	chénopode blanc	Elgin, Essex, Kent, Lambton, Middlesex, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengary
2	sétaire verte	Huron, Lambton, Oxford, Perth, Wellington, Victoria
2	sétaire géante	Elgin, Lambton, Oxford
2	lampourde glouteron	Lambton
2	morelle noire de l'Est	Bruce, Elgin, Huron, Middlesex
2	petite herbe à poux	Bruce, Elgin, Essex, Haldimand/Norfolk, Huron, Kent, Lambton, Middlesex, Niagara, Oxford, Perth, Prexcott/Russel, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengary, Wellington
2	amarante rugueuse	Bruce, Lambton, Essex
2 et 5	amarante de Powell	Bruce, Oxford, Perth, Stormont, Dundas et Glengary, Wellington
2 et 5	amarante à racine rouge	Oxford
2 et 5	chénopode blanc	Kent, Lambton, Simcoe
4	carotte sauvage	Halton, Wellington
5	chénopode blanc	Nombreux comtés de l'Ontario
5	amarante de Powell	Elgin, Huron, Simcoe
5	amarante à racine rouge	Kent, Stormont, Dundas et Glengary, Waterloo
5	petite herbe à poux	Brant, Essex, Haldimand/Norfolk, Hamilton-Wentworth, Lambton, Lennox et Addington, Niagara, Wellington
5	échinochloa pied-de-coq	Waterloo
5	sétaire glauque	York
5	panic capillaire	Grenville, Grey, Haldimand/Norfolk, Prescott, Wellington
5	chénopode strié	Brant
5	moutarde des champs	Glengarry
5	séneçon vulgaire	York
5	amarante rugueuse	Essex, Lambton
6	amarante à racine rouge	Essex, Kent
6	amarante hybride	Essex
7	amarante de Powell	Simcoe
7	amarante à racine rouge	Middlesex
22	vergerette du Canada	Essex
22	lépidie des champs	Essex

* Les peuplements qui précèdent ont été trouvés résistants à une partie ou à la totalité des herbicides du groupe indiqué. Voir le tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario*, p. 72, pour la liste des herbicides appartenant à chacun des groupes.

la culture. Ces produits agissent contre les mauvaises herbes en tuant leurs plantules et/ou en créant à la surface ou sous la surface du sol une zone toxique dans laquelle les graines et les plantules de mauvaises herbes ne peuvent survivre.

Pour que les traitements de prélevée soient efficaces, il faut que la culture au stade plantule soit tolérante au produit chimique ou que la toxicité ait disparu avant la levée de la plante cultivée.

Un lit de semence bien préparé et dépourvu de mottes est essentiel à l'obtention des meilleurs résultats. La surface du sol doit aussi être humide et la température favorable à une germination rapide des graines de mauvaises herbes.

Traitements de postlevée

Les traitements de postlevée (POST) s'appliquent après la levée de la culture et des mauvaises herbes. On utilise un produit chimique sélectif qui détruit les mauvaises herbes tout en épargnant les plantes cultivées. Les types de mauvaises herbes qui peuvent être ainsi combattues dépendent de la sensibilité de la mauvaise herbe et de la tolérance de la culture au produit chimique. Il est important d'appliquer le traitement au stade approprié de développement de la culture. Comme la plupart des mauvaises herbes sont plus sensibles aux produits chimiques lorsqu'elles sont jeunes, les traitements précoces exigent moins d'herbicide et il en résulte moins de dommages aux cultures tant par la concurrence des mauvaises herbes que par le passage du matériel de pulvérisation.

Parfois, on peut appliquer l'herbicide après la levée de la culture mais avant celle des mauvaises herbes. Ainsi, on peut sarcler une culture puis épandre sur le sol propre un herbicide qui empêchera la deuxième vague de mauvaises herbes.

Travail de conservation du sol

Tous les herbicides répertoriés comme étant appropriés pour des cultures particulières dans les sections portant sur le travail de conservation du sol conviennent aux systèmes de travail de conservation du sol dans la mesure où l'on respecte les utilisations et doses indiquées sur l'étiquette.

On appelle **travail réduit du sol** une préparation sommaire du lit de semence faisant appel à très peu d'instruments aratoires. Le lit de semence ainsi obtenu a une structure relativement motteuse par rapport à celle que donnent les méthodes traditionnelles; après le semis, plus de 20 % de la surface du sol est recouverte de résidus de culture, mais les végétaux vivants sont peu nombreux. Dans ce système de culture, le désherbage s'effectue selon des méthodes semblables à bien des égards à celles du travail traditionnel du sol. Cependant, la présence abondante de résidus de cultures peut gêner l'application et l'incorporation dans le sol des herbicides de présemis. En effet, ces herbicides ne donnent des résultats satisfaisants que s'ils sont incorporés uniformément dans le sol. Lorsque cette condition ne peut pas être remplie sans un travail supplémentaire du sol, il vaut mieux appliquer des herbicides de prélevée ou de postlevée. Avec ce genre d'herbicides, il est recommandé de sarcler entre les rangs. Dans le système de travail réduit du sol, la destruction chimique des mauvaises herbes déjà levées n'est généralement pas nécessaire.

Le **semis sur billons** est un semis effectué directement sur la crête des billons créés l'année précédente par un labour spécial. Un semoir spécialement conçu prélève sur le dessus du billon une couche de 2 à 5 cm de sol et la dépose, avec les résidus de culture, les mauvaises herbes et les graines de ces dernières, dans la dérayure séparant les billons. Ce système de culture ne permet guère l'application des herbicides à incorporer en présemis, mais se prête bien à l'épandage à la volée et/ou en bandes d'herbicides de prélevée ou de postlevée. On a obtenu d'excellents résultats en appliquant en bande, directement derrière le semoir, des herbicides de prélevée sur un sol frais et humide. On peut également obtenir d'excellents résultats en sarclant entre les rangs au bon moment et en pulvérisant un herbicide de postlevée en bande sur les rangs. Les travaux de billonnage de l'automne suivant complètent le désherbage mécanique. Un réglage judicieux du semoir et un sarclage effectué peu de temps après le semis permettent parfois d'éliminer la nécessité d'une destruction chimique des mauvaises herbes. Celle-ci peut cependant être nécessaire, avant la levée de la culture, si le sarclage n'est pas fait rapidement après le semis.

Dans le système de la **culture en bandes**, seules des bandes étroites de la surface à semer sont ameublies à l'aide soit de coutres cannelés, soit de cultivateurs rotatifs entraînés par la prise de force. Les entre-rangs ne sont pas travaillés et les résidus de culture restent à la surface du sol. Le succès de l'application des herbicides incorporés en présemis dépend de la quantité et du type de résidus, de la nature de l'herbicide en question et du type d'instrument aratoire utilisé. En général, on ne sarcle pas les entre-rangs, mais on peut le faire si l'on a les machines adaptées. La plupart du temps, on applique en pleine surface des herbicides de prélevée ou de postlevée. L'application d'herbicides en bandes est également praticable lorsque le sarclage des entre-rangs fait partie intégrante du système de culture. La destruction chimique est nécessaire en cas de végétation vivante au moment du semis.

Le système de **semis direct**, sans travail du sol, est le plus exigeant en matière de désherbage. En effet, le sol n'est travaillé ni avant ni après le semis. Le désherbage est donc assuré uniquement par les produits chimiques. La destruction chimique des mauvaises herbes déjà levées est presque toujours nécessaire. Les herbicides de prélevée et de postlevée servent à tenir les mauvaises herbes en échec pendant toute la saison de végétation. Une partie de l'herbicide appliqué en prélevée risque d'être interceptée par les résidus de cultures. S'il pleut suffisamment pour lessiver l'herbicide retenu par les résidus et le faire pénétrer dans le sol, le désherbage donne de bons résultats. En revanche, l'efficacité du produit peut être réduite si le temps est sec après l'application. Par temps sec, il est conseillé d'appliquer des herbicides foliaires, en postlevée.

Changements dans les peuplements d'espèces nuisibles

On observe des changements dans les peuplements d'espèces nuisibles à la suite des changements dans le système de travail du sol. La réduction des façons culturales entraîne des modifications du milieu dans lequel vivent les graines des mauvaises herbes et les parties souterraines des vivaces. Ces modifications sont favorables à certaines espèces nuisibles et défavorables à d'autres. Les façons culturales traditionnelles

favorisent un enfouissement profond des graines de mauvaises herbes, ce qui en renforce la dormance et en accroît la longévité, perpétuant les problèmes d'infestation. Quand les façons culturales sont réduites, un plus grand nombre de graines de mauvaises herbes restent à la surface du sol et y sont livrées aux ravages naturels. Un grand pourcentage d'entre elles est détruit avant la germination (destruction par le froid, les oiseaux, les insectes ou les rongeurs). De celles qui parviennent à survivre, bon nombre germent de bonne heure et n'ont pas le temps de monter à graines et de se ressemer si on les combat. Si l'on réussit à bien détruire les mauvaises herbes au cours des premières années d'un système de travail réduit du sol, on finit par appauvrir la réserve de mauvaises herbes qui se trouve dans le sol et par réduire le risque d'infestations graves engendrées par la germination de ces espèces nuisibles. La concurrence exercée par les mauvaises herbes annuelles tend à baisser au bout de quelques années de travail réduit du sol. Par contre, le travail réduit du sol favorise les mauvaises herbes dotées d'une capacité de reproduction prolifique grâce à leurs racines et à leurs tiges souterraines, lesquelles sont moins susceptibles d'être blessées ou détruites par le passage des machines. Les mauvaises herbes vivaces et bisannuelles posent en général des problèmes plus aigus dans les champs où l'on pratique le billonnage, la culture en bandes et le semis direct sans travail du sol. Dans les champs qui font l'objet d'un travail réduit, ces mauvaises herbes lèvent plus tôt et restent plus localisées que dans les champs travaillés de façon traditionnelle. Il est donc plus facile d'appliquer les herbicides au bon moment et de faire davantage de traitements localisés. Les herbicides les plus efficaces sont de type systémique, à application foliaire, qui migrent dans les parties souterraines de la plante avant que les parties aériennes ne soient tuées. Dans le cas où l'on utilise des herbicides non sélectifs, il faut les appliquer entre deux cultures ou sacrifier la culture dans les zones traitées.

La destruction chimique est destinée à tuer les végétaux déjà présents avant la levée de la culture. Elle peut s'avérer nécessaire quand on travaille peu le sol, en particulier si des plantes couvre-sol sont utilisées, quand on pratique la culture sur billons et que le semis est retardé et/ou quand il y a présence d'annuelles d'hiver, de bisannuelles ou de vivaces. La destruction chimique est presque toujours nécessaire quand on pratique le semis direct et la culture en bandes. La végétation peut être détruite par :

- des herbicides de contact comme le paraquat;
- des herbicides systémiques ou de position comme le glyphosate, le dicamba ou le 2,4-D;
- les herbicides foliaires de postlevée qui ont un effet rémanent tels que l'atrazine, le linuron ou la métribuzine additionnés d'un surfactant ou d'une huile;
- un mélange en cuve d'un herbicide de contact ou d'un herbicide systémique avec un herbicide à effet rémanent tel que le paraquat + l'atrazine ou le glyphosate + le dicamba.

Tous ces produits sont plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués sur des plantes jeunes et en pleine croissance. Dans le cas des herbicides de contact, il est extrêmement important que la pulvérisation atteigne uniformément toutes les plantes visées. Les traitements de destruction chimique des mauvaises herbes déjà levées n'ont pas nécessairement un effet rémanent.

Toute végétation dense et vigoureuse, présente au moment du semis ou immédiatement avant celui-ci — prélève dans le sol une importante quantité d'eau. Cet assèchement est bénéfique au cours des printemps où le sol est gorgé d'eau, mais très dommageable au cours des printemps où le temps sec domine. Il est donc conseillé de ne pas tarder à brûler chimiquement la végétation existante, et de le faire parfois même au cours de l'automne précédent lorsqu'on a affaire à des plantes couvre-sol vivaces ou à des pâturages. Par temps sec, il est préférable d'utiliser un herbicide à action rapide plutôt qu'un herbicide lent.

Pour plus de précisions, voir les chapitres consacrés à chaque culture, comme le maïs (de grande culture, de semence, sucré), au chapitre 9 (p. 119), et le soya, au chapitre 11 (p. 181).

Application des herbicides

Une licence de destructeur de parasites peut être exigée de toute personne appliquant des herbicides sur une propriété autre que la sienne. Les entrepreneurs en traitements phytosanitaires doivent être titulaires d'une licence. Pour de plus amples renseignements, consulter le bureau local du ministère de l'Environnement de l'Ontario ou la Section des pesticides, Ministère de l'Environnement de l'Ontario, 135, avenue St. Clair Ouest, Toronto (Ontario), M4V 1P5.

La réussite du désherbage chimique dépend de l'exactitude des doses et de l'uniformité de l'épandage. Le désherbage des grandes cultures au moyen d'herbicides sélectifs est un travail de précision faisant appel à du matériel fiable.

Le produit chimique est appliqué sous forme d'émulsion, de solution ou de suspension. Le volume de bouillie utilisée à l'hectare dépend de l'herbicide utilisé et de la culture que l'on traite. On emploie généralement de faibles volumes (de 50 à 200 L/ha) lorsque des herbicides du type phénoxy comme le 2,4-D sont pulvérisés sur des mauvaises herbes déjà levées. De plus forts volumes (de 150 à 300 L/ha) servent aux applications de prélevée.

Les petites superficies peuvent être traitées avec un pulvérisateur dorsal, ou même un arrosoir, pourvu qu'on prenne bien soin de mouiller tout le feuillage.

Il faut de l'équipement motorisé pour traiter des superficies plus considérables. Ne pas utiliser de matériel servant à appliquer des produits à base de 2,4-D pour appliquer d'autres traitements aux cultures et aux plantes de jardin sensibles au 2,4-D.



2. TECHNIQUES D'APPLICATION

Introduction

L'application d'herbicides doit être une opération de précision. Les progrès récents dans le domaine du matériel et des systèmes de réglage peuvent rendre ce travail relativement simple et précis.

Effectuée sans discernement, la pulvérisation d'un herbicide risque de se solder par un gaspillage de produits, un désherbage partiel ou nul, des dommages aux cultures (parfois à celles du voisin) ou une contamination de l'environnement. On doit prendre toutes les précautions nécessaires pour appliquer les pesticides de façon appropriée.

Développement de nouvelles machines

Étant donné la précision avec laquelle les herbicides doivent être épandus, les fabricants de matériel travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes de la protection phytosanitaire pour perfectionner les pulvérisateurs. On a maintenant recours à de nouveaux systèmes d'injection fermés dans lesquels l'herbicide concentré est séparé du liquide porteur (eau). On bénéficie par ailleurs du degré de précision accru apporté par les régulateurs électroniques de dose qui, grâce à leurs capteurs de vitesse, régulateurs de débit et microprocesseurs, assurent l'administration de la dose exacte, et grâce à leur radar, mesurent avec exactitude la vitesse d'avancement réelle du pulvérisateur. Bien des entrepreneurs en traitements phytosanitaires utilisent ces régulateurs électroniques de dose.

L'industrie s'oriente actuellement vers le système d'injection fermé. La recherche se poursuit dans le domaine de la réduction de la dérive par des procédés pneumatiques et électrostatiques.

Les buses à admission d'air réduisent considérablement la dérive d'herbicide et sont fabriquées par un certain nombre d'entreprises en un éventail de grosseurs. Il est crucial de faire fonctionner ces buses à l'intérieur de leurs plages de pressions d'utilisation, si l'on veut obtenir l'angle de pulvérisation souhaité et la bonne induction d'air dans la buse. Avant d'acheter des pastilles de buses à admission d'air, il faut s'assurer que la pompe du pulvérisateur peut produire suffisamment de pression pour permettre à ces pastilles de fonctionner sous toutes les conditions. Se renseigner sur les plages de pressions d'utilisation nécessaires auprès des fabricants de buses.

Pulvérisateurs agricoles

Le type de pulvérisateur le plus communément utilisé pour les applications d'herbicides est le pulvérisateur à rampe. Ce pulvérisateur applique une quantité uniforme de bouillie sur toute la largeur de la rampe.

Les conditions principales d'une pulvérisation de plein champ sont :

- une pression uniforme sur toute la largeur de la rampe,
- le même débit pour toutes les buses et une bonne forme de dispersion du jet,
- une vitesse d'avancement uniforme dans des conditions réelles de plein champ,
- une hauteur de rampe stable afin que les jets des buses se chevauchent pour une application uniforme.

La plupart des pulvérisateurs commerciaux peuvent être modifiés et utilisés sans danger pour l'épandage d'engrais liquides. Il faut parfois dans ce cas augmenter l'agitation de la bouillie. L'agriculteur doit s'assurer que les éléments du pulvérisateur utilisé sont compatibles avec la solution fertilisante et suivre les recommandations du fabricant.

Pulvérisateurs à jet porté et nébulisateurs

Ne jamais utiliser ces machines pour appliquer des herbicides, particulièrement les phytohormones comme le 2,4-D. Le danger de causer des dommages même loin des superficies traitées serait très élevé.

Désherbage sélectif par humectation

Les humecteurs à cordes, à rouleaux ou à brosses sont désormais largement employés pour appliquer le glyphosate. En ce qui concerne les autres herbicides, vérifier sur le mode d'emploi si ces produits peuvent aussi être appliqués par humectation. Le mode d'emploi indique également les cultures sur lesquelles ce type d'application a été homologué. Pour qu'un traitement par humectation soit efficace :

- veiller à ce que la substance herbicide entre en contact avec une surface suffisante de la plante à combattre;
- maintenir les dispositifs imprégnés d'herbicides, au-dessus des cultures à traiter, pour ne pas endommager ces dernières.

Il est conseillé de faire l'application par humectation à une vitesse de 4–10 km/h. Il est bon de faire deux passages perpendiculaires, en particulier dans les endroits très infestés et si l'on travaille à vitesse assez rapide. Prendre soin de ne pas toucher les bourgeons des arbres fruitiers, des vignes et des haies vives (brise-vent), sous peine d'endommager la culture.

FIGURE 2–1. Comparaison des buses traditionnelles et des buses à admission d'air



Risque de dérive de brouillard exprimé en pourcentage de la dérive produite par une buse à jet plat conçue pour une plage de pressions étendue

Entretien et utilisation des pulvérisateurs

Vitesse d'avancement du pulvérisateur

Comme la plupart des traitements herbicides en terres agricoles ou en bordures de routes exigent une dose uniformément distribuée, il est essentiel que la vitesse à laquelle avance le pulvérisateur soit constante pendant que la bouillie s'échappe des buses. Si les roues motrices du tracteur glissent sur le sol, l'indicateur de vitesse du tracteur ne signale pas le changement dans la vitesse d'avancement. Pour être sûr que la vitesse est constante en dépit du patinage des roues dans un terrain en pente ou sur un terrain meuble, utiliser un indicateur de vitesse indépendant avec roue non entraînée. Des moniteurs et d'autres instruments électroniques peuvent aussi être installés. Seuls les régulateurs de dose corrigent automatiquement le débit des buses selon la vitesse du tracteur de sorte que le taux d'application soit constant.

Eau

N'utiliser que de l'eau propre exempte de débris, de sable et de boue. Quand on puise l'eau dans une source d'eau potable, il faut installer à l'extérieur du bâtiment une borne-fontaine à l'épreuve du gel. Celle-ci doit toujours être munie d'un siphon ou d'un clapet anti-retour. Ne jamais laisser reposer le filtre de la prise d'eau sur le fond de l'étang lorsqu'on remplit le réservoir du pulvérisateur. La conduite d'amenée d'eau doit, aux termes de la loi, être équipée d'un clapet anti-retour situé près du filtre pour prévenir la contamination de l'étang ou du cours d'eau lorsque la pompe est fermée. Éviter d'employer une buse de surpression, une buse de remplissage ou une pompe d'injection pour accélérer le remplissage du réservoir. De tels accessoires peuvent contaminer l'eau de l'étang ou du cours d'eau.

Agitation

Lorsqu'on utilise des produits chimiques en solution (p. ex. 2,4-D et eau), au moins de 2 à 14 L de bouillie à la minute doivent retourner en cuve pour y maintenir une agitation adéquate. Dans le cas des poudres mouillables, la quantité de bouillie qui retourne en cuve doit être plus élevée. Le tuyau d'agitation en provenance de la pompe doit passer par une soupape de réglage et amener le liquide dans la partie inférieure du réservoir (non dans la partie supérieure) pour que l'agitation soit suffisante. Toujours utiliser des buses d'agitation ou un tuyau d'agitation pour assurer une circulation du liquide suffisante dans le réservoir.

Lorsqu'on utilise des poudres mouillables (atrazine, par exemple), le volume de bouillie retourné au réservoir doit être de 14 à 27 L/min pour chaque 450 L de capacité du réservoir, selon la concentration de la poudre mouillable et la taille du réservoir. Une conduite spéciale doit relier le côté sous pression de la pompe (non le régulateur de pression) au réservoir pour faire circuler le liquide nécessaire à l'agitation hydraulique dans le réservoir. Toujours utiliser un jet venturi ou un tuyau d'agitation. Le débit peut être moindre si le pulvérisateur est muni d'un agitateur mécanique. L'agitation hydraulique par tuyau nécessite une circulation d'eau beaucoup plus élevée que celle par buse venturi pour un même résultat.

Éviter une agitation excessive qui risquerait de transformer la bouillie en une émulsion inverse, une masse huileuse qui se déposera au fond du réservoir et ne pourra être pompée. Une agitation excessive peut aussi

entraîner la formation d'une mousse surabondante responsable de problèmes de pompage. Pour prévenir une accumulation d'huile dans le pulvérisateur, vider complètement le réservoir avant de le remplir à nouveau. Après chaque arrêt de la pulvérisation, agiter à fond avant de reprendre le travail. Nettoyer le réservoir et le pulvérisateur dès le travail terminé avec un détergent ou un solvant et rincer avec de l'eau propre.

Pompes

La pompe est le cœur du pulvérisateur. Elle doit être de capacité suffisante pour maintenir la pression, le volume et l'agitation voulus. Les pompes à piston, à membrane ou centrifuges conviennent mieux pour les suspensions de poudres mouillables. Pour épandre les herbicides liquides, on peut utiliser les pompes à rouleaux ou les pompes mentionnées ci-dessus. Pour les poudres mouillables et les produits secs fluides, opter pour une pompe dont la chambre résiste à l'abrasion. Observer scrupuleusement les directives du fabricant au sujet des soins et de l'entreposage afin d'obtenir une performance optimale de l'appareil.

ATTENTION : Laisser la pompe d'un pulvérisateur tourner à vide, c'est l'exposer à des dommages ou à une usure prématurée.

Pastilles de buse

De nombreuses entreprises fabriquent des pastilles de buse. Même si celles-ci se ressemblent, le mode d'installation peut varier légèrement. Toujours suivre les recommandations du fabricant quant à l'espacement des buses ou à la distance buse-cible. Ces distances peuvent varier en fonction de l'angle de pulvérisation de la buse. Il est essentiel de s'attarder à l'espacement et à l'orientation des buses si l'on veut obtenir un chevauchement convenable des jets.

Il faut veiller tout particulièrement à maintenir la rampe à une hauteur stable afin que les jets des buses se chevauchent uniformément.

La réussite de la pulvérisation dépend en partie de l'état des pastilles et de l'uniformité de l'application à l'échelle de la rampe. Examiner la forme de dispersion du jet qu'elles émettent toutes avant de les employer. Vérifier aussi chacune des buses au moment d'effectuer le réglage du pulvérisateur.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des pastilles vont du laiton à l'acier inoxydable, trempé ou non, en passant par les plastiques/polymères et la céramique. Toutes les préparations de pesticides et les diluants provoquent l'usure de la pastille. Les poudres mouillables entraînent une plus grande usure que les autres formulations.

Les pulvérisateurs doivent être réglés de façon régulière (voir plus bas les remarques sur le réglage du pulvérisateur).

Remplacer les pastilles des buses dès qu'elles donnent un débit de 10 % supérieur au débit nominal indiqué par le fabricant. Des pastilles usées occasionnent une distribution inégale de la bouillie et altèrent la forme de dispersion du jet de façon indésirable.

Les buses à jet plat sont largement utilisées sur les pulvérisateurs à rampe servant au désherbage chimique. Il est important de maintenir la pression à l'intérieur de la fourchette indiquée par le fabricant. Les buses ayant un angle de pulvérisation de 110 degrés offrent un plus grand chevauchement des jets que les buses ayant un angle de pulvérisation de 80 degrés. Ou, les buses offrant un plus grand angle de pulvérisation réduisent les risques de manques lorsque la rampe se déplace plus près du sol. Toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui a trait à l'espacement des buses, à la distance minimale buse-cible et aux plages des pressions d'utilisation.

Il existe des pastilles à jet plat qui fonctionnent à basse pression, soit à environ 140 kPa. Elles permettent de réduire encore davantage le risque de dérive.

Les buses à admission d'air ou venturi sont maintenant offertes par au moins dix fournisseurs différents. Ces buses sont spécialement conçues pour réduire la quantité de fines gouttelettes produites par les buses à plus petites ouvertures. Ces buses viennent en différentes grosseurs.

De l'air est aspiré à l'intérieur de la buse à mesure que le liquide y circule. Il en résulte un jet grossier comptant très peu de fines gouttelettes sujettes à dériver de la trajectoire. Ces gouttelettes grossières renferment des bulles d'air qui provoquent la rupture des gouttelettes lorsqu'elles entrent en contact avec les surfaces des végétaux.

Les buses à induction d'air sont conçues pour deux plages de pression : pressions faibles et pressions élevées. Si un pulvérisateur ne peut dépasser 345 kPa, il faut nécessairement opter pour un modèle conçu pour les pressions faibles. Toutes les buses à admission d'air doivent travailler dans le milieu de la fourchette de pression pour laquelle elles ont été conçues, soit autour de 275 kPa dans le cas des modèles pour pressions faibles, et autour de 550 kPa dans le cas des modèles pour pressions élevées. Toutes les buses à admission d'air sont extrêmement sensibles aux faibles pressions. Si la pression est trop faible, le jet s'effondre et présente un angle inférieur à l'angle normal. Et en deçà d'un certain seuil de pression, l'air cesse d'être admis dans la bouillie.

Cette nouvelle technologie a vite été adoptée par bien des producteurs qui apprécient la diminution substantielle de la dérive de brouillard comparativement aux buses à jet plat traditionnelles. Certains producteurs

utilisent les buses à admission d'air pour tous leurs traitements herbicides.

Ces buses ont déjà occasionné des problèmes avec certains produits. On attribue ces problèmes à l'un ou l'autre ou à plusieurs des facteurs suivants : mauvais choix du moment des pulvérisations, volumes d'eau insuffisants, pressions insuffisantes et mauvaises herbes difficiles à mouiller.

Il existe des buses à jet bâton spécialement conçues pour pulvériser les herbicides en bandes. Ces buses répartissent la bouillie uniformément sur la largeur de la bande. Elles viennent en une variété de grosseurs, d'angles de pulvérisation et de matériaux différents. La largeur de la bande est fonction de la hauteur des buses par rapport à la cible, de l'angle de dispersion du jet et de l'orientation des pastilles par rapport à la direction du déplacement du pulvérisateur. Il faut suivre à la lettre les recommandations du fabricant.

Les pastilles à miroir fonctionnent à faible pression et, à cause de leur grand angle de dispersion, peuvent être utilisées plus près du sol, réduisant ainsi les risques de dérive. Les améliorations apportées aux nouvelles pastilles de buse à miroir ont fait en sorte qu'elles offrent désormais une répartition de la bouillie comparable à celle que procurent les pastilles des buses à jet plat. Les pastilles à miroir existent en laiton, en plastique/polymère et en acier inoxydable. Il faut moitié moins de pastilles de ce genre pour couvrir la même largeur de terrain, si on les compare aux pastilles à jet plat. Les pulvérisateurs munis de buses à jet large couvrent une large bande de terrain. Ils sont particulièrement commodes pour désherber les chemins de ferme et le long des clôtures où la répartition de l'herbicide n'est pas essentielle. La forme de dispersion du jet est affectée par le vent et il suffit d'une brise légère pour occasionner une dérive importante. Ne jamais utiliser de buses à jet large près d'une culture sensible.

Les buses à jet conique, plein ou creux, peuvent servir à épandre au sol des herbicides qui doivent ensuite être incorporés avec un pulvérisateur, un cultivateur ou une autre machine du même genre.

REMARQUE : Quel que soit le type de pastilles que l'on utilise pour pulvériser des poudres mouillables ou des oligo-éléments, il est essentiel de régler souvent le pulvérisateur. En effet, l'usure de la buse se traduit par une augmentation de la quantité de pesticide appliquée et une distribution inégale. Des buses usées donnent habituellement une mauvaise forme de dispersion du jet.

Les catalogues des fabricants de buses énumèrent les tamis de buse nécessaires pour les différents types et formats de buses. On prévient l'égouttage à l'arrêt du pulvérisateur en équipant chaque buse d'un clapet anti-égouttage à membrane. Pour nettoyer les tamis de buses, il est nécessaire de les retirer de leur logement et de les laver à fond à l'eau et au savon, avec une brosse à poils souples conçue pour nettoyer les pastilles de buse. Faire circuler de l'eau dans la rampe et les buses ne suffit pas pour décoller les résidus de pesticides qui se sont accumulés à la surface extérieure des tamis de buse.

Nettoyage du pulvérisateur

Avant de nettoyer le pulvérisateur, il faut se débarrasser de la bouillie qui reste dans le réservoir. Pour ce faire, le cours *L'utilisation sécuritaire des pesticides par l'agriculteur* recommande, entre autres, de diluer la bouillie restante avec de l'eau dans une proportion d'au moins 10 pour 1 et de l'appliquer sur la zone déjà traitée à condition que la dose maximale de produit recommandée sur l'étiquette ne soit pas dépassée.

Nettoyer le pulvérisateur tout de suite après la journée de travail ou au moment de passer d'un produit chimique à un autre. Une fois la journée de pulvérisation terminée, bien rincer la rampe à grande eau, y compris les conduits, les clapets anti-égouttage à membrane et les buses. Lorsque le nettoyage est différé, ne serait-ce que jusqu'au lendemain, il se forme des dépôts d'herbicide difficiles à éliminer. La cuve du pulvérisateur est beaucoup plus difficile à nettoyer si elle a eu le temps de s'assécher. Ne pas oublier non plus de nettoyer les contenants servant à mesurer.

Étapes :

1. Consulter l'étiquette du produit pour connaître les directives de nettoyage. Rassembler le matériel nécessaire au nettoyage, y compris l'équipement de protection individuel approprié.

2. Purger le réservoir du pulvérisateur.

3. Remplir le réservoir d'eau, ajouter le détergent, l'ammoniaque ou le produit servant au nettoyage de la cuve du pulvérisateur, puis agiter pendant 10–20 minutes (nettoyer le réservoir au complet, et non seulement la moitié inférieure). Rincer la rampe et les boyaux avec la solution, la laisser reposer plusieurs heures (toute la nuit si possible), puis rincer encore abondamment la rampe et les buses et vider la cuve. Pendant le rinçage de la rampe, ouvrir les extrémités de la rampe pour permettre aux particules de sortir.

4. Inspecter l'intérieur du réservoir pour voir si des résidus sont visibles. Rincer au besoin l'intérieur de la cuve. Répéter la deuxième étape.

5. Laver l'extérieur du pulvérisateur avec de l'eau et du détergent doux ou du savon.

6. Enlever les buses et les tamis de buse, puis les laver séparément dans un seau contenant de la solution propre. Laver avec la solution de nettoyage le contenant ayant servi à mesurer.

7. Retirer tous les bouchons ou capuchons aux extrémités de la rampe. Les résidus de produits qui s'accumulent aux extrémités des différentes sections de tuyaux risqueraient d'endommager les cultures. Nettoyer à fond les bouchons ou capuchons et les extrémités des tuyaux avec la solution de nettoyage. Replacer ensuite soigneusement ces pièces aux extrémités de la rampe.

Rincer à fond le réservoir, les boyaux, la rampe, les buses et les tamis de buse avec de l'eau propre pendant au moins 5 minutes. Répéter immédiatement avant la prochaine utilisation.

Utiliser un détergent domestique à raison de 250 mL/100 L ou 1 kg/150 L d'eau. Utiliser de l'ammoniaque (3 %) à raison de 1 L/100 L d'eau. Utiliser d'autres agents de nettoyage en fonction de ce qui est indiqué sur l'étiquette du produit. **Ne jamais** mélanger d'ammoniaque avec de l'eau de Javel, sous peine de provoquer la formation de chlore gazeux, lequel peut causer une irritation grave aux yeux, au nez, à la gorge ou aux poumons.

REMARQUE : Communiquer avec le fabricant des pesticides utilisés pour connaître la méthode et les produits les meilleurs pour éliminer les résidus qui se forment dans les réservoirs et le matériel de pulvérisation. Lire l'étiquette étant donné que pour bien des produits, dont ACCENT, BANVEL II, CONQUEST, PEAK, celle-ci comporte des directives pour le nettoyage du réservoir. Certains produits, comme AGRAL 90 ou ALL CLEAR, sont recommandés comme agents de nettoyage du réservoir.

Ne pas utiliser de pulvérisateurs ayant servi à épandre des herbicides du groupe 4 (2,4-D, MCPA et herbicides à base de phénoxy apparentés) ou bon nombre des herbicides du groupe 2 pour pulvériser des fongicides ou d'autres produits sur des cultures sensibles. Ne pas stationner ni ranger ces pulvérisateurs à proximité de serres ou d'autres endroits où poussent des cultures sensibles.

Nettoyer en premier la cuve, la rampe et les boyaux du pulvérisateur. S'assurer de nettoyer également les buses et les pastilles, les tamis de buse, les filtres, la crépine et la pompe. Le nettoyage de ces pièces, pourtant susceptibles de receler des résidus, est souvent négligé. Avec l'essor des pulvérisations de produits extrêmement phytotoxiques et concentrés, il est indispensable d'éliminer du pulvérisateur la plus infime trace de matière active.

Les surfactants ou solutions de fertilisants (p. ex. AGRAL 90, NAU 28 %) qu'on utilise dans un mélange recommandé avec des herbicides peuvent, par inadvertance, débarrasser la cuve ou le matériel des résidus d'un traitement précédent qui risquent d'endommager la culture. Un bon nettoyage au moment de passer d'un produit à un autre est essentiel pour éviter d'endommager les cultures.

L'eau de lavage contient des résidus d'herbicide; il ne faut donc jamais la laisser s'écouler dans un puits, un lac, un étang, une rivière ou toute autre source d'eau.

Ne jamais laisser de flaque d'eau contaminée qui soit accessible aux enfants, aux animaux de compagnie, aux animaux de ferme ou aux animaux sauvages.

Réglage du pulvérisateur

Réglage d'un pulvérisateur à rampe pour grande culture

(Détermination du taux d'application de la bouillie à appliquer par hectare.)

Il existe différentes façons de déterminer le taux d'application de la bouillie à l'hectare.

Instructions

1. Noter l'heure.

   - Planter deux piquets à 50 m de distance dans le champ.
   - Choisir la vitesse et le régime du moteur (tr/min) qui seront utilisés pendant la pulvérisation. Remplir le pulvérisateur à moitié d'eau.
   - Parcourir trois fois la distance entre les deux piquets et noter le temps nécessaire à chaque passage. Chaque fois, s'assurer que le tracteur roule à la bonne vitesse au moment de franchir le premier piquet. Continuer de rouler à cette vitesse jusqu'au moment de franchir le deuxième piquet.
   - Calculer un temps moyen à partir des données sur les trois passages.

2. Mesurer le débit moyen à la buse.

   - Faire fonctionner le pulvérisateur immobilisé, en laissant la prise de force engagée et en réglant le régime de telle sorte que la prise de force atteigne le même nombre de tours par minute que lors du parcours d'essai.

- Régler la pression à la pression de travail voulue sans restriction de débit à la buse.
- Recueillir le liquide sortant de chaque buse pendant le laps de temps nécessaire en moyenne (établi lors du test) pour parcourir les 50 m.
- Noter la quantité de liquide recueilli par buse dans le tableau qui suit.
- Nettoyer ou remplacer toute buse ayant un débit supérieur ou inférieur de 5 % au débit moyen.

3. Mesurer l'espacement des buses en mètres.

4. Utiliser la formule suivante pour déterminer le débit du pulvérisateur :

$$\text{Débit du pulvérisateur (litres/hectare)} = \frac{\text{Débit moyen des buses (mL)}}{\text{Espacement des buses (m)}} \times 0{,}2$$

5. Calculer la superficie effectivement pulvérisée après l'application de chaque réservoir de bouillie. Vérifier à nouveau le réglage du pulvérisateur après l'application de chaque réservoir de bouillie en divisant le volume pulvérisé par la superficie effectivement traitée. La nature de certains produits peut modifier légèrement le débit par rapport à celui de l'eau propre utilisée pour le réglage.

6. Les producteurs qui préfèrent utiliser des mesures en litres/acre ou en gallons/acre peuvent utiliser les facteurs de conversion suivants :

   L/ha × 0,4 = L/acre
   L/ha × 0,09 = gal imp/acre
   L/ha × 0,11 = gal US/acre

Exemple de calcul

Temps moyen pour parcourir 50 m (164 pi) = 24,5 sec
Quantité moyenne de liquide recueilli par buse durant 24,5 sec = 525 mL
Espacement des buses sur la rampe = 0,5 m (= 20 po)

$$\text{Taux d'application} = \frac{5{,}25\ \text{mL}}{0{,}5\ \text{m}} \times 0{,}2 = 210\ \text{L/ha}$$

210 L/ha × 0,4 = 84 L/acre
210 L/ha × 0,09 = 18,9 gal imp/acre
210 L/ha × 0,11 = 23 gal US/acre

Application en bandes : Si le pulvérisateur compte 10 buses et que chaque buse couvre une bande de 36 cm (0,36 m) de large, la largeur totale de la bande traitée est la suivante : 10 × 0,36 ou 3,6 m.

Remarque 1 : Un certain nombre de fournisseurs offrent des flacons ou nécessaires à réglage. Pour plus de renseignements, consulter un bureau du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) ou les fabricants de pulvérisateurs, de pièces de pulvérisateurs ou d'herbicides.

Remarque 2 : Pour les applications en bande, mesurer la largeur de la bande traitée (au niveau du sol ou au niveau du feuillage) et utiliser cette donnée dans la formule à la place de l'espacement des buses. Pour les applications en bande, la superficie effectivement traitée n'est pas la même que la superficie cultivée. (Si on pulvérise un herbicide en pleine surface sur une culture en lignes ayant des rangs de 1 m, toute la surface du champ est traitée. Si l'application en bande ne traite que 30 cm de chaque rang, la superficie effectivement traitée est égale à 1/3 du rang. Les doses d'herbicides mentionnées dans la plupart des publications traitant d'herbicides et sur les étiquettes renvoient à une superficie effectivement traitée, à moins d'indication différente.

Réglage d'un pulvérisateur manuel ou portatif

De nombreuses personnes se servent d'un petit appareil manuel ou portatif pour traiter des zones très infestées ou reprendre des zones qui ont été manquées. Le réglage de ce genre d'appareil est aussi important que celui des pulvérisateurs de grande capacité.

Méthode I

1. Mesurer une superficie de 100 m^2. Par exemple : 10 m × 10 m, ou 25 m × 4 m.

2. Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau. Marquer le niveau sur un bâton à mesurer. Faire fonctionner le pulvérisateur à la pression qui sera utilisée pendant le traitement.

3. Pulvériser l'eau sur la superficie de 100 m^2. Marcher toujours au même rythme en prenant soin de pulvériser aussi uniformément que possible, comme s'il s'agissait du traitement véritable.

4. Mesurer la quantité d'eau nécessaire pour remplir le pulvérisateur jusqu'à la marque sur le bâton de mesure. Cette quantité correspond à la quantité pulvérisée sur une superficie de 100 m^2.

Méthode II

1. Planter deux piquets à 50 m (164 pi) de distance.

2. Remplir le pulvérisateur à moitié d'eau.

3. Parcourir trois fois la distance de 50 m, en marchant toujours au même rythme. Calculer le temps mis en moyenne pour parcourir la distance de 50 m.

4. Mesurer la largeur de la bande couverte par le jet de la buse (en mètres) à la vitesse à laquelle on a marché.

5. Actionner le pulvérisateur en recueillant le liquide émis par la buse pendant le temps mis en moyenne pour parcourir les 50 m.

6. Taux d'application (litres/ha) =

$$\frac{\text{mL de liquide par buse}}{\text{largeur traitée (m)}} \times 0{,}2$$

Méthode III

1. Remplir partiellement le pulvérisateur. Faire fonctionner l'appareil à la pression qui sera utilisée pendant le traitement.

2. Pulvériser pour mesurer la largeur de la bande (en mètres).

3. Marcher à un rythme constant pendant 15 secondes. Mesurer la distance parcourue (en mètres).

4. Multiplier la largeur traitée par la distance parcourue afin de connaître la superficie (en mètres carrés) traitée en 15 secondes.

5. Actionner le pulvérisateur en recueillant le liquide émis par la buse pendant 15 secondes. Déterminer la quantité de liquide (en litres) nécessaire pour traiter la superficie. (Donne une quantité de solution pulvérisée en 15 secondes.)

6. Taux d'application (L/ha) =

$$\frac{\text{quantité pulvérisée}}{\text{superficie (longueur} \times \text{largeur)}} = \frac{\text{L} \times 10\,000}{(\text{m}^2)}$$

Pour convertir une dose recommandée pour une grande surface en une dose pour surface restreinte, suivre la règle suivante :

- 1 kg/ha équivaut à 10 g/100 m^2.
- S'il s'agit d'un produit liquide, 100 L/ha équivalent à 1 L/100 m^2.

Source : *Ontario Pesticide Education Program Manual*, 1995.

Comment calculer la quantité d'herbicide requise

Comment calculer la quantité de produit par hectare

La plupart des doses conseillées dans cette publication sont exprimées en quantité de matière active (nom commun) et de produit (NOM COMMERCIAL) par hectare. Cependant, lorsque la quantité de matière active varie considérablement selon les préparations disponibles (p. ex. le 2,4-D qui existe dans des concentrations de 100 g/L, 400 g/L, 500 g/L, etc.), la quantité à appliquer est exprimée en matière active seulement.

> **Remarque :** Dans la présente publication, le nom générique de chaque herbicide (matière active) est imprimé en lettres minuscules (exemple : dicamba, atrazine, glyphosate). Le nom commercial du produit (liquide ou en poudre, par exemple, contenu de l'emballage tel que vendu par le fabricant) est imprimé en lettres majuscules (exemples : AATREX, BANVEL II). La préparation figure entre parenthèses à la suite du nom commercial.

Comment déterminer la quantité d'herbicide à verser dans un réservoir plein

Après avoir déterminé la quantité de produit commercial nécessaire par hectare, réglé le pulvérisateur et déterminé le nombre d'hectares traités par le contenu de chaque réservoir, déterminer la quantité d'herbicide à ajouter au réservoir en utilisant l'équation suivante :

Quantité de produit à ajouter au réservoir =
N^{bre} d'hectares traités/réservoir × quant. de produit/ha

Exemple de calculs :

a) quantité de produit/réservoir
= 4,1 ha × 2,2 kg/ha
= 9,02 kg de LOROX/réservoir

b) quantité de produit/réservoir
= 4,1 ha × 4,5 L/ha
= 18,45 L d'ATRAZINE/réservoir

Suivre les recommandations du fabricant pour l'ordre et les méthodes de mélange.

Produits, préparations et mélanges

Les préparations d'herbicides solides incluent les granulés, les poudres solubles et les poudres mouillables. Les granulés n'impliquent aucun mélange préalable dans une pâte fluide et sont prêts à être mélangés à l'eau. Les poudres solubles peuvent être dissoutes dans l'eau. Les poudres mouillables sont insolubles, mais formeront une suspension qui a besoin d'une constante agitation.

Les préparations d'herbicides liquides se mélangent à l'eau pour former une bouillie, ou à l'huile pour former une émulsion qui doit être agitée.

Les étiquettes de pesticides comportent habituellement des directives sur la préparation des mélanges en cuve homologués et précisent souvent l'ordre dans lequel on doit ajouter les ingrédients. Si l'étiquette comporte des directives de préparation des mélanges, toujours s'y conformer. Consulter les étiquettes des emballages pour se renseigner sur la compatibilité des divers herbicides. En effet, certaines préparations peuvent réagir lorsqu'elles sont mélangées et former de nouveaux produits dont les propriétés et les effets diffèrent de ceux des produits initiaux. S'il faut ajuster le pH ou la dureté de l'eau, ces ajustements doivent se faire avant l'ajout de produits dans la cuve.

En l'absence de directives concernant la préparation d'un mélange en cuve homologué, voici, en général, comment procéder.

- Remplir la cuve avec de l'eau jusqu'à la moitié du volume total de bouillie nécessaire et commencer l'agitation. Ajouter les différentes préparations dans l'ordre indiqué ci-dessous, en laissant le temps à chaque produit de bien se mélanger et se disperser avant d'ajouter le suivant :

    1. emballages soluble;
    2. poudres mouillables;
    3. produits pulvérulents et granulés dispersables dans l'eau;

- Tout en faisant fonctionner l'agitateur, ajouter de l'eau jusqu'aux trois quarts du volume de bouillie souhaité. Puis ajouter :

    4. solutions à base d'eau;
    5. concentrés émulsifiables;
    6. adjuvants.

- Finir de remplir la cuve jusqu'au volume voulu. Maintenir l'agitateur en marche pendant le mélange, le remplissage final et la pulvérisation.

Ne pas mélanger dans le but de les appliquer en une seule opération des herbicides différents ou des herbicides combinés à des pesticides ou des engrais foliaires, sauf si les produits ont été homologués à cette fin.

À moins qu'on ne le mentionne spécifiquement dans cette publication ou sur l'étiquette de l'herbicide, l'ajout d'un surfactant ou d'un détergent à la bouillie est **déconseillé**.

Quand on sait que l'eau utilisée contient un excès de sel, on doit d'abord faire un essai de compatibilité de cette eau et du produit chimique à la concentration désirée, mais sur une petite échelle. Voir la rubrique *Agitation*, sous *Entretien et utilisation des pulvérisateurs*.

Indicateurs d'applications

Colorants et marqueurs de mousse

L'adjonction d'un colorant dans la solution herbicide permet de mieux voir la zone traitée. Les dispositifs qui déposent un trait de mousse le long des bandes traitées aident la personne qui conduit le pulvérisateur à minimiser les chevauchements. Quand on ajoute un colorant aux produits que l'on pulvérise sur les souches de plantes ligneuses, on peut vérifier que l'on a traité partout sans avoir à recommencer l'opération. Voici des exemples de colorants :

- bleu Blazon, hydrosoluble,
- rouge Bas-oil, liposoluble,
- rouge, sous forme de mousse.

En vente chez les fournisseurs de produits agrochimiques.

Information additionnelle

Vidéos

n° 39, *Field Crop Sprayer Calibration*
n° 44, *Nozzle Selection for Field Sprayers*

Offerts par :

Faculté de l'Éducation permanente,
Université de Guelph
Guelph (Ontario) Canada N1G 2W1
tél. : 519 824-4120 poste 3375
www.horticulturecertificates.com

Fiches techniques du MAAARO

00-104 *Diminution de la dérive des pesticides et des dommages aux cultures*
00-100 *Contamination des sources d'approvisionnement en eau par les pesticides*
96-026 *Comment éviter les déversements accidentels de pesticides*
07-060 *Installation d'entreposage de pesticides à la ferme*
96-110 *Réglage des pulvérisateurs agricoles*
09-040 *Les six clés de l'efficacité des pulvérisations dans les vergers et vignobles*
09-038 *Effets des conditions météorologiques sur les pulvérisations*



3. UTILISATION DES PESTICIDES EN ONTARIO

Avant d'utiliser un pesticide, lisez le mode d'emploi sur l'étiquette! Assurez-vous que l'étiquette n'est pas périmée.

Consultez également le manuel du Cours sur l'utilisation sécuritaire des pesticides par l'agriculteur.

Notez par écrit tous les détails sur vos pulvérisations.

Homologation fédérale des pesticides

Avant qu'un pesticide puisse être vendu ou utilisé en Ontario, il doit avoir été homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires* (Canada) et classé en vertu de la *Loi sur les pesticides* (Ontario). L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada homologue chaque pesticide qu'un fabricant souhaite mettre sur le marché canadien après en avoir évalué le dossier scientifique et vérifié l'intérêt et la valeur; elle s'assure aussi que les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation projetée du produit restent dans les limites acceptables.

L'ARLA soumet les pesticides déjà homologués à des réévaluations pour déterminer s'ils continuent de respecter les normes actuelles visant la protection de la santé humaine et de l'environnement lorsqu'ils sont employés conformément à leur mode d'emploi. Ce genre de réévaluation aboutit à plusieurs résultats possibles :

- le maintien de l'homologation telle quelle;
- la modification des renseignements sur l'étiquette (p. ex. nouvelles exigences en matière de protection individuelle, de délai de sécurité et de bandes tampons);
- la modification des limites maximales de résidus (LMR) existantes;
- l'élimination pure et simple ou graduelle de certains usages ou de certaines formulations;
- le retrait de l'homologation.

L'étiquette d'un pesticide est un document qui a valeur de loi. Elle édicte en effet les conditions dans lesquelles le produit doit être utilisé pour que cette utilisation soit légale. Toute utilisation non prévue sur l'étiquette est interdite. Il est illégal d'utiliser le pesticide selon des méthodes et dans des conditions non spécifiées sur l'étiquette (mode d'emploi, cultures, organismes nuisibles). Les étiquettes de tous les produits homologués se trouvent sur le site Web de l'ARLA à *www.pmra-arla.gc.ca* (cliquer sur Recherche d'étiquette). L'utilisateur doit s'assurer de consulter uniquement l'étiquette qui est à jour et être au courant des décisions qui auraient été prises concernant le pesticide après une réévaluation.

Réglementation des pesticides en Ontario

En Ontario, c'est le ministère de l'Environnement (MEO) qui est chargé de réglementer la vente, l'emploi, le transport, l'entreposage et l'élimination des pesticides. La province réglemente les pesticides en vertu de la *Loi sur les pesticides* et du Règlement 63/09 en exigeant des utilisateurs qu'ils suivent une formation et qu'ils obtiennent des licences et des permis. Tous les pesticides doivent être utilisés conformément à la *Loi sur les pesticides* et au Règlement 63/09. La Loi et son règlement sont affichés sur le site Lois-en-ligne de la province de l'Ontario à *www.e-laws.gov.on.ca*; on peut aussi se les procurer en appelant Service Ontario au 1 800 668-9938 ou au 416 326-5300.

Classement des pesticides

Avant qu'une spécialité pesticide puisse être vendue ou utilisée en Ontario, le Comité consultatif sur les pesticides de l'Ontario (CCPO) doit l'examiner pour déterminer sa catégorie et faire ses recommandations au MEO. Le CCPO classe chaque pesticide en fonction de sa toxicité, des dangers qu'il peut poser à la santé ou à l'environnement, de la persistance de sa matière active ou de ses métabolites, de sa concentration, de l'emploi auquel il est destiné, de sa catégorie dans la législation fédérale et de son statut à l'égard de l'homologation. Ce système de classement est à la base des règles établies par l'Ontario en matière de distribution, de disponibilité et d'utilisation des pesticides sur son territoire. Une fois qu'il a approuvé le classement d'un pesticide, le MEO l'affiche sur son site Web à *www.ene.gov.on.ca*.

Le système de classement des pesticides de l'Ontario a changé. Il comporte désormais 11 catégories (au lieu des 6 annexes ou listes) (Règlement 63/09).

Pour en savoir plus sur la réglementation des pesticides et sur l'accréditation et la délivrance des licences, consulter :

- Deuxième page de couverture de la présente publication
- Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Site Web : *www.pmra-arla.gc.ca*
- Service d'information sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA : 1 800 267-6315 (du Canada) ou 1 613 736-3799 (de l'étranger)
- Ministère de l'Environnement de l'Ontario (MEO). Site Web : *www.ene.gov.on.ca*
- Le spécialiste des pesticides du MEO de chaque région (Voir l'annexe D, *Coordonnées des bureaux régionaux du ministère de l'Environnement de l'Ontario*, p. 405.)
- Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO). Site Web : *www.ontario.ca/maaaro*
- Programme ontarien de formation en matière de pesticides (Université de Guelph, campus de Ridgetown). Site Web : *www.opep.ca*
- Formation et accréditation des destructeurs de parasites. Site Web : *www.ontariopesticide.com/OPTC/default.htm.*

Accréditation et délivrance des licences

Exigences visant les producteurs agricoles et leurs aides

Pour s'informer sur l'accréditation des producteurs agricoles et sur la formation des aides agricoles, consulter le site Web du Programme ontarien de formation en matière de pesticides à *www.opep.ca* ou appeler le 1 800 652-8573.

Exigences visant les exploitants d'entreprise de destruction (exterminateurs) et leurs techniciens.

Pour connaître les exigences en matière d'accréditation des destructeurs de parasites et de formation des techniciens, consulter le site Web « Formation et accréditation des destructeurs de parasites » à *www.ontariopesticide.com/OPTC/default.htm* ou appeler le 1 888 620-9999 ou le 519 674-1575.

Renseignements sur l'application des pesticides

Quand on pense nécessaire d'utiliser un pesticide, choisir la formulation et la méthode d'application qui sont les mieux adaptées au traitement envisagé. Épandre le produit uniquement avec un pulvérisateur qu'on aura d'abord réglé avec soin. Autant que possible, choisir la formulation la moins toxique. Prendre toutes les précautions possibles pour empêcher que le pesticide atteigne des personnes et des organismes non visés. Avant d'entreprendre le traitement, lire intégralement et attentivement l'étiquette à jour du pesticide. Sur l'étiquette se trouvent des renseignements importants, notamment :

- le mode d'emploi (doses et taux d'application, cultures pouvant être traitées, parasites visés, restrictions sur les cultures suivantes, nombre maximal de pulvérisations, taille des gouttelettes et type de buses, matériel de pulvérisation, moments d'application et conditions atmosphériques idéales);
- l'équipement de protection individuelle à porter;
- la toxicité du pesticide et les dangers pour la santé;
- les délais de non-retour dans les zones traitées;
- les bandes tampons;
- les mises en garde particulières;
- les mesures à prendre en cas d'accident;
- les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

Pour des renseignements complets sur les dangers d'un pesticide, consulter la fiche signalétique (fiche technique santé-sécurité) du produit ou appeler le fabricant.

Délais d'attente après traitement

Le délai d'attente (ou délai de sécurité ou délai de non-retour) est la période durant laquelle il est interdit aux travailleurs de retourner dans un lieu qui vient d'être traité sans avoir revêtu une tenue et un équipement de protection individuelle. Ce délai permet aux émanations et aux résidus du pesticide épandu dans le lieu traité (p. ex. un champ) de se dissiper et donc d'éviter que les travailleurs y soient exposés.

L'ARLA examine chaque pesticide pour déterminer s'il est nécessaire que l'étiquette précise un délai de sécurité. Si l'étiquette n'indique rien, la règle est d'attendre au minimum que les surfaces traitées soient de nouveau sèches. L'étiquette de certains pesticides met en garde contre les risques que l'on court en travaillant dans des zones récemment traitées. Il est important de suivre les recommandations.

Périodes sans traitement à observer avant de récolter les cultures alimentaires ou fourragères : Délai avant récolte, délai avant pâturage ou délai avant affouragement.

Ce sont les périodes minimales qui doivent séparer le dernier traitement appliqué à une culture et la récolte

de celle-ci, ou sa mise en pâturage ou fauchage pour l'alimentation des animaux. Une culture récoltée avant la fin du délai d'attente risque d'avoir un taux de résidus de pesticide qui dépasse la limite maximale de résidus (LMR) fixée par l'ARLA.

Pour éviter de dépasser la limite maximale de résidus (LMR), respectez toujours le mode d'emploi qui figure sur l'étiquette.

Bandes tampons

Les bandes tampons sont les zones que la pulvérisation ne doit pas atteindre afin de protéger une zone adjacente qui est fragile (p. ex. un habitat aquatique ou terrestre, une tête de puits, une culture non visée et un lieu fréquenté par des enfants).

Laisser une bande suffisamment large entre la zone traitée et les zones voisines à protéger. Cette bande est plus ou moins large selon la technique employée (pulvérisation par voie aérienne, par pulvérisateur à rampe ou par pulvérisateur à main). L'étiquette de certains pesticides prescrit les exigences concernant les bandes tampons. Consulter l'étiquette du produit utilisé.

Les habitats terrestres vulnérables sont les haies, pâturages, rideaux d'arbres, plantations brise-vent, aires boisées, bandes filtrantes végétalisées, etc.

Les habitats aquatiques vulnérables sont les lacs, réservoirs, cours d'eau, ruisseaux, fossés, marais, marécages, étangs, bassins d'une exploitation aquicole, etc.

Distances de retrait par rapport aux plans d'eau
Quiconque introduit dans l'eau des matières pouvant nuire aux poissons ou à leur habitat commet une infraction à la *Loi sur les pêches* (Canada). Pour protéger l'eau, la personne qui se prépare à appliquer un pesticide doit déterminer la largeur de la zone sans traitement qu'il faut laisser entre le plan d'eau à protéger et la zone à traiter (lorsque l'étiquette du pesticide n'indique rien de précis à ce sujet). La zone à protéger comprend le plan d'eau ou le cours d'eau, ainsi que ses rives ou berges (zones riveraines) car elles jouent un rôle important dans l'alimentation et l'habitat du poisson.

Protection de l'environnement

Protection des sources d'eau

Selon le British Crop Protection Council (BCPC — Conseil de défense des cultures de la Grande-Bretagne), de 40 à 70 % de la contamination des eaux de surface par les pesticides provient des lieux où les utilisateurs préparent les bouillies et remplissent le matériel de pulvérisation.

Procéder aux mélanges ou au remplissage du pulvérisateur uniquement sur une surface imperméable qui est située aussi loin que possible des cours d'eau ou autres écosystèmes vulnérables. Si une quantité de pesticide ou de bouillie s'écoule sur le sol, il faut l'endiguer, la recueillir et l'éliminer de manière à ne créer aucun risque (Your guide to using pesticides, BCPC, 2007).

Pour nettoyer le matériel de pulvérisation, on doit s'installer loin des puits, des étangs, des cours d'eau et des fossés. Pulvériser l'eau de rinçage diluée (en général, selon un rapport de 10 à 1) sur la zone traitée (culture), mais en veillant à ne pas dépasser la dose maximale recommandée sur l'étiquette.

Ne pas faire un branchement direct entre la source d'approvisionnement en eau (p. ex. le réseau public, le puits, le cours d'eau ou l'étang) et le réservoir du pulvérisateur. Utiliser un clapet anti-retour ou un système intercalaire pour empêcher le contenu du réservoir de refluer vers la source d'eau et de la contaminer.

Endiguer et ramasser immédiatement toute quantité de produit déversée pour éviter de contaminer les sources d'eau.

Consulter l'étiquette pour voir si elle contient des directives concernant la protection des sources d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur la protection des sources d'eau, consulter les documents suivants :

- MAAARO. *Contamination des sources d'approvisionnement en eau par les pesticides*, fiche technique n° 00-100
- MAAARO. *Les eaux souterraines – Une ressource rurale importante : Protéger la qualité des réserves d'eau souterraine*, fiche technique n° 06-116
- MAAARO et AAC. *Entreposage, manipulation et application de pesticides, fascicule de la série « Les pratiques de gestion optimales »*, commande n° BMP13F

Protection des abeilles contre l'intoxication

Il est important de protéger les abeilles lorsqu'on pulvérise des insecticides. Les abeilles domestiques, ou mouches à miel, comme les autres abeilles et d'autres insectes, jouent un grand rôle dans la pollinisation des cultures. De nombreuses cultures sont également la source du nectar indispensable à la production du miel.

Consulter l'étiquette de chaque pesticide pour savoir quelles précautions il faut prendre pour ne pas nuire aux abeilles. Choisir autant que possible les formulations les moins toxiques. La plupart des insecticides

à base d'organophosphorés et de carbamates sont extrêmement toxiques pour les abeilles.

Prévenir les apiculteurs de la localité avant de pulvériser un pesticide, pour qu'ils puissent prendre des précautions supplémentaires pour protéger leurs abeilles. Appeler l'apiculteur provincial au 1 888 466-2372, poste 63595, pour obtenir la liste des apiculteurs de la région. Suivre les lignes directrices pour déterminer à quel moment on peut faire la pulvérisation de manière à causer le moins de tort possible aux abeilles. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consulter la section du site Web du MAAARO traitant de l'apiculture à *www.ontario.ca/cultures*.

Dérive du brouillard de pulvérisation

- Ne pas faire de pulvérisations quand les vents sont forts ou soufflent en rafales, car ils emporteront le brouillard de pulvérisation hors de sa cible. Consulter l'étiquette du pesticide pour savoir dans quelles conditions de vent il est encore possible de pulvériser le produit. Certaines étiquettes ne fournissent pas de précisions à ce sujet. Surveiller les conditions de vent tout au long de la pulvérisation en utilisant un anémomètre de bonne qualité. Noter par écrit la vitesse du vent et sa direction. Si les conditions de vent changent, on devra probablement faire des ajustements pour réduire encore plus le risque de dérive : par exemple, augmenter le volume d'eau, réduire le plus possible la distance entre la buse et la cible, changer de type de buses, changer de champ à cause des influences environnantes ou cesser la pulvérisation jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

- Ne pas faire de pulvérisations quand l'air est totalement immobile. Ces périodes de calme plat se produisent habituellement tôt le matin ou tard le soir, moments de la journée où, généralement, la température est plus fraîche et l'humidité relative plus élevée. Quand ces facteurs sont réunis, de fines gouttelettes de bouillie peuvent rester en suspension dans le champ. Lorsque l'air s'agitera de nouveau, ces gouttelettes seront emportées et pourront causer des effets préjudiciables dans les zones adjacentes non visées.

- Régler le pulvérisateur pour qu'il débite la bouillie selon le taux recommandé (volume d'eau).

- Utiliser les buses capables de produire les gouttelettes de la taille exigée, le cas échéant, sur l'étiquette.

- Utiliser les buses les mieux adaptées au type de pulvérisation. Dans la mesure du possible, utiliser des buses à admission d'air ou buses venturi, qui préviennent la dérive beaucoup mieux que les buses classiques.

- Vérifier la hauteur de la rampe par rapport à la cible et réduire cette distance le plus possible tout en maintenant l'uniformité des jets.

- Respecter les consignes de l'étiquette concernant les bandes tampons pour protéger les zones vulnérables.

- Équiper le pulvérisateur de dispositifs qui aident à rabattre ou maintenir le brouillard sur la culture ciblée, dans la mesure où il y en a de disponibles et où leur mise en œuvre est possible (écrans, caches ou jupes de protection, soufflerie à rideau d'air).

- Ajouter des adjuvants anti-dérive à la bouillie dans la cuve en respectant le mode d'emploi.

- Chaque fois que possible, remplacer les pulvérisations par des applications avec des humecteurs à cordes.

- Utiliser des formulations ou des spécialités pesticides non volatiles.

Pour des conseils sur les mesures permettant de limiter la dérive :

- MAAARO et AAC. *Entreposage, manipulation et application de pesticides, fascicule de la série « Les pratiques de gestion optimales »*, commande n° BMP13F
- Université de Guelph, campus de Ridgetown. Vidéos *How to Manage Spray Drift* (Comment limiter la dérive du brouillard de pulvérisation) et *Spray Drift Reduction Through Air Induction* (Limiter la dérive du brouillard de pulvérisation grâce aux buses à injection d'air), produits dans le cadre du Programme ontarien de formation en matière de pesticides. Pour se procurer les vidéos, consulter le site Web *www.opep.ca/Educational/EducationalMaterials.htm*.

Élimination des pesticides

Contenants de pesticides vides

Ne jamais réutiliser les contenants de pesticides vides. On devrait les nettoyer et les perforer pour les rendre inutilisables.

L'Ontario offre aux producteurs et aux entrepreneurs en traitements phytosanitaires un programme de recyclage des contenants de pesticides. Grâce à ce programme, on peut rapporter dans des dépôts situés un peu partout dans la province les contenants de pesticides en plastique (contenance maximale de 23 litres) ou en métal (contenance maximale de 20 L) après les avoir vidés, nettoyés et rincés trois fois. Avant de les rapporter, décoller leur petit livret de papier. Pour trouver l'adresse du dépôt le plus proche, appeler le Programme ontarien de formation en matière de pesticides au 1 800 652-8573, un vendeur de pesticides ou la municipalité. On peut aussi trouver ce renseignement sur le site Web de CropLife Canada à *www.croplife.ca*.

Restes de bouillie

Le meilleur moyen de se débarrasser d'un fond de cuve est de le pulvériser sur un autre champ qui a besoin du même traitement. Mais, avant, il faut s'assurer, en consultant l'étiquette, que le pesticide est homologué pour emploi sur la culture présente dans ce champ.

S'il n'y a pas d'autre champ disponible, diluer le reste de bouillie à raison de 10 parties d'eau pour une partie de bouillie. On peut alors l'appliquer sans risque sur le champ qui vient d'être traité à condition de ne pas dépasser la dose maximale recommandée sur l'étiquette. Vérifier sur l'étiquette les éventuelles restrictions quant au choix des cultures suivantes, le délai avant récolte ou les méthodes d'élimination des restes de bouillie.

Ne jamais pulvériser sur le champ déjà traité un reste de bouillie non diluée. La partie du champ dans laquelle serait faite la seconde pulvérisation recevrait le double de la dose recommandée. On risquerait de récolter un produit contenant un taux illégal de résidus; on risquerait aussi de laisser dans le sol suffisamment de résidus pour endommager la culture suivante.

Restes de pesticides en entreposage

Éliminer de façon sécuritaire les pesticides qui ne sont plus utiles. Voici les options possibles :

- Communiquer avec le fournisseur. Il est possible qu'il accepte de reprendre un pesticide inutilisé qui est encore dans son contenant d'origine non ouvert.

- Faire appel à une entreprise de transport autorisée à transporter des déchets dangereux en vertu de la partie V de la *Loi sur la protection de l'environnement*. Consulter les pages jaunes de l'annuaire téléphonique sous la rubrique Déchets — Enlèvement.

- Surveiller dans le journal local ou sur le site Web de Croplife Canada (www.croplife.ca) les avis de collecte de pesticides périmés.

Communiquer avec la municipalité pour savoir si elle organise des journées de collecte de déchets et si elle accepte les pesticides à usage agricole et en quelles quantités.

Entreposage des pesticides

La *Loi sur les pesticides de l'Ontario* et le Règlement 63/09 énoncent les exigences auxquelles doivent répondre les installations où des pesticides sont entreposés. Les exigences varient suivant la catégorie à laquelle appartiennent les pesticides.

Pour de plus amples renseignements sur l'entreposage des pesticides :

- MAAARO. *Installation d'entreposage de pesticides à la ferme*, fiche technique nº 07-060
- MAAARO et AAC. *Entreposage, manipulation et application de pesticides, fascicule de la série « Les pratiques de gestion optimales »*, commande nº BMP13F
- Université de Guelph, campus de Ridgetown. *Manuel sur l'utilisation sécuritaire des pesticides par l'agriculteur, publié dans le cadre du Programme ontarien de formation en matière de pesticides*, que l'on peut commander à *www.opep.ca/Educational/EducationalMaterials.htm*.

Déversements de pesticides

Si un déversement de pesticide cause ou risque de causer un effet préjudiciable plus grave que celui qui pourrait résulter de l'emploi légal de ce pesticide, il faut obligatoirement informer le Centre d'intervention en cas de déversement du ministère de l'Environnement en appelant au 1 800 268-6060 (numéro en service jour et nuit et tous les jours de la semaine), ainsi que la municipalité.

Le terme « déversement » désigne un incident au cours duquel un polluant s'échappe d'un ouvrage, d'un véhicule ou d'un contenant quelconque et se répand dans l'environnement naturel en quantité et en concentration anormales. Un incident comme le renversement d'un pulvérisateur qui répand son contenu sur le sol est un exemple de déversement. Un contenant de pesticide qui se rompt et laisse écouler son contenu est un autre exemple. Le fait de laisser le brouillard d'une pulvérisation se répandre ou atteindre un lieu où l'emploi du produit n'est pas approuvé – une pulvérisation hors cible – est également considéré comme un déversement.

Avant de commencer à nettoyer un déversement de quelque nature que ce soit, ne pas oublier de se protéger pour éviter d'être exposé au pesticide. Revêtir la tenue et l'équipement de protection exigés par la situation. Si le déversement s'est produit dans un lieu clos (p. ex. dans la remise à pesticides ou dans un véhicule pendant un transport), commencer par l'aérer. Après avoir revêtu une tenue de protection et/ou vous être éloigné du lieu du déversement et, s'il y a lieu, avoir éloigné les autres personnes ou les animaux, faire le nécessaire pour stopper le déversement à la source et empêcher le produit de se répandre et/ou de contaminer des cours d'eau. L'étiquette de certains produits spécifie les précautions particulières à prendre en cas de déversement, les numéros des organismes d'intervention d'urgence et les premiers soins à administrer.

Si la quantité déversée est peu importante, on peut corriger la situation comme suit.

- **Pesticide sous forme liquide** – Recouvrir le produit d'une épaisse couche d'un matériau absorbant comme de la litière pour chat, de la vermiculite ou de la terre sèche. Ramasser le matériau au balai ou à la pelle et le placer dans un fût à déchets qu'on éliminera avec les mêmes précautions que les déchets dangereux.

- **Pesticide en poudre ou en granulés** – Ramasser le produit au balai ou à la pelle et le placer dans un fût à déchets qu'on éliminera avec les mêmes précautions que les déchets dangereux.

- Si une grande quantité de produit s'est déversée, il faut absolument l'endiguer pour empêcher le produit de se répandre. La méthode de ramassage indiquée ci-dessus n'est pas applicable à tous les cas de déversement. Une fois le déversement endigué, suivre les consignes du fabricant et des organismes compétents pour remettre en état le lieu contaminé.

Pour en savoir plus sur la prévention des déversements :

- MAAARO. *Comment éviter les déversements accidentels de pesticides*, fiche technique n° 96-026
- MAAARO et AAC. *Entreposage, manipulation et application de pesticides, fascicule de la série « Les pratiques de gestion optimales »*, commande n° BMP13F
- Université de Guelph, campus de Ridgetown. *Manuel sur l'utilisation sécuritaire des pesticides par l'agriculteur, publié dans le cadre du Programme ontarien de formation en matière de pesticides*, que l'on peut commander à *www.opep.ca/Educational/EducationalMaterials.htm*.

En cas d'empoisonnement ou de lésions attribuables à des pesticides, appelez :

Le Centre antipoison :

1 800 268-9017

(Malentendants) 1 877 750-2233

Pour de plus amples renseignements, référez-vous à la troisième page de couverture (à la fin de la présente publication) « *Mesures d'urgence et premiers soins en cas d'empoisonnement par les pesticides* ».



4. HERBICIDES UTILISÉS EN ONTARIO

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
2,4-D	2,4-D AMINE 500	EC	470 g/L	4	A	4	UAG
2,4-D	2,4-D AMINE 600	EC	564 g/L	4	A	4	*
2,4-D	2,4-D ESTER 600	EC	564 g/L	4	C	3	INT, UAG
2,4-D	2,4-D ESTER 700	EC	660 g/L	4	C	3	*
2,4-DB	CALIBER 625	EC	625 g/L	4	B	3	UAG
2,4-DB	COBUTOX 625	EC	625 g/L	4	B	3	INT
2,4-DB	EMBUTOX	EC	625 g/L	4	B	3	NUA
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	IPCO PREMIUM 3-WAY XP TURF HERBICIDE2	Sn	308 g/L	4	A	4	INT
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	KILLEX 500	Sn	308 g/L	3	A	4	SGF
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	PAR III	Sn	308 g/L	4	A	4	UAG
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	PREMIUM 3-WAY	Sn	308 g/L	4	A	4	INT
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	TRI-KIL	Sn	308 g/L	4	A	4	AGR
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	TRILLION-P LIQUID TURF HERBICIDE	Sn	308 g/L	4	A	4	PLG
2,4-D/dicamba/mécoprop-P	WEEDAWAY PREMIUM 3-WAY XP TURF HERBICIDE	Sn	308 g/L	4	A	4	INT
acide acétique	ECOCLEAR	Li	25 %	—	C	4	TIU
acifluorfène	BLAZER	Sn	240 g/L	14	B	3	UPI
aminopyralide	MILESTONE	EC	240 g/L	4	A	3	DWE
amitrole	AMITROL 240	SC	231 g/L	11	E	3	NUA
atrazine	AATREX LIQUID	Su	480 g/L	5	B	3	SYN
atrazine	CLEAN CROP ATRAZINE 480	Su	480 g/L	5	B	3	UAG
atrazine	CONVERGE 480	Su	480 g/L	5	B	3	BCZ
atrazine/2,4-D	SHOTGUN	Su	390 g/L	4, 5	A	3	UAG
bensulide	BETASAN	EC	480 g/L	8	A	4	GOW
bentazone	BASAGRAN	Sn	480 g/L	6	B	4	BAZ
bentazone	BASAGRAN FORTÉ	Sn	480 g/L	6	A	4	BAZ

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
bentazone/atrazine	LADDOK	Su	(1:1) 400 g/L	5, 6	A	3	BAZ
bromacil	HYVAR X-L	Sn	240 g/L	5	C	3	DUQ
bromacil/diuron	KROVAR	DF	(1:1) 80 %	5, 7	C	3	DUQ
bromoxynil	BROTEX	EC	240 g/L	6	C	3	INT
bromoxynil	KORIL	EC	235 g/L	6	C	3	NUA
bromoxynil	PARDNER	EC	280 g/L	6	C	3	BCZ
bromoxynil/MCPA	BADGE	EC	(1:1) 450 g/L	4, 6	C	3	UAG
bromoxynil/MCPA	BUCTRIL M	EC	(1:1) 560 g/L	4, 6	C	3	BCZ
bromoxynil/MCPA	LOGIC M	EC	(1:1) 450 g/L	4, 6	C	3	INT
bromoxynil/MCPA	MEXTROL	EC	(1:1) 450 g/L	4, 6	C	3	NUA
carfentrazone-éthyle	AIM EC	EC	240 g/L	14	B	3	NUA
carfentrazone-éthyle + glyphosate	CLEANSTART PLUS[1] (AIM EC + CREDIT PLUS)	EC + Sn	240 g/L + 360 g/L	14, 9	B	3	NUA
chlorimuron-éthyle	CLASSIC	DF	25 %	2	C	3	DUQ
chlorimuron-éthyle + glyphosate	GARDIEN (CLASSIC + TOUCHDOWN TOTAL)	DF + Sn	360 g/L + 25 DF	2, 9	C, B	3, 4	DUQ
chlorsulfuron	TELAR	DF	75 %	2	C	3	DUQ
chlorthal-diméthyl	DACTHAL W-75	DF	75 %	3	C	4	UAG
cléthodime	SELECT	EC	240 g/L	1	C	3	AVV
clomazone	COMMAND 360 ME	ME	360 g/L	13	B	3	UAG
clopyralide	LONTREL 360	Sn	360 g/L	4	A	3	DWE
clopyralide	TRANSLINE	Sn	360 g/L	4	A	3	DWE
cloransulame-méthyle	FIRSTRATE	WG	84 %	2	C	3	DWE
dazomet	BASAMID	Gr	98 %	27	C	3	BAZ
desmédiphame/phenmédiphame	BETAMIX	EC	(1:1) 150 g/L	7	B	4	BCZ
dicamba	BANVEL II	Sn	480 g/L	4	B	3	BAZ
dicamba	ORACLE	Sn	480 g/L	4	B	3	UAG
dicamba	VANQUISH	Sn	480 g/L	4	B	3	SYN
dicamba/atrazine	MARKSMAN	Su	393 g/L	4, 5	B	3	BAZ
dicamba/atrazine	PROPERO	Su	393 g/L	4, 5	B	3	SYN
dicamba/MCPA	DYVEL	Sn	(1:4) 420 g/L	4	B	3	BAZ

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
dicamba/MCPA/mécoprop-P	SWORD	Sn	400 g/L	4	A	4	UAG
dicamba/MCPA/mécoprop-P	TARGET	Sn	400 g/L	4	A	4	SYN
dicamba/MCPA/mécoprop-P	TRACKER XP	Sn	400 g/L	4	A	4	INT
dichlobénil	CASORON 4G	Gr	4 %	20	C	4	CRE
dichlorprop/2,4-D	DESORMONE	EC	680 g/L	4	B	3	NUA
dichlorprop/2,4-D	DICHLORPROP D	EC	(1:1) 582 g/L	4	B	3	INT
dichlorprop/2,4-D	DIPHENOPROP BK 700	EC	679 g/L	4	B	3	UAG
dichlorprop/2,4-D	ESTAPROP PLUS	EC	582 g/L	4	B	3	NUA
dichlorprop/2,4-D	TURBOPROP	EC	582 g/L	4	B	3	UAG
diflufenzopyr/dicamba	DISTINCT	WDG	70 %	4, 19	C	3	BAZ
diméthénamide	FRONTIER	EC	900 g/L	15	A	3	BAZ
diméthénamide-P	FRONTIER MAX	EC	720 g/L	15	A	3	BAZ
dithiopyr	DIMENSION	EC	120 g/L	3	B	3	DWE
diuron	DIUREX 80WDG	WP	80 %	7	C	3	UAG
diuron	KARMEX	DF	80 %	7	C	3	DUQ
diquat	DÉFANANT REGLONE	Li	240 g/L	22	A	4	SYN
diquat (aquatique)	REWARD AQUATIC	Li	240 g/L	22	A	3	SYN
EPTC	EPTAM	EC	800 g/L	8	C	5	GOW
éthametsulfuron-méthyl	MUSTER	DF	75 %	2	C	3	DUQ
éthofumésate	NORTRON SC	Su	480 g/L	16	A	3	BCZ
farine de gluten de maïs	TURFMAIZE	Gr	98 %	—	C	4	ENF
fénoxaprop-p-éthyl	ACCLAIM SUPER	EC	80,5 g/L	1	A	3	BCZ
fénoxaprop-p-éthyl	EXCEL SUPER	EC	80,5 g/L	1	A	3	BCZ
fénoxaprop-p-éthyl/phytoprotecteur	PUMA[120] SUPER	EC	120 g/L	1	A	3	BCZ
fénoxaprop-p-éthyl/phytoprotecteur	PUMA ADVANCE	EC	90 g/L	1	A	3	BCZ
flufénacet	DEFINE	DF	60 %	15	C	3	BCZ
fluazifop-p-butyl	VENTURE L	EC	125 g/L	1	C	2	SYN
flumetsulam/métolachlore	BROADSTRIKE DUAL MAGNUM	SC	924,7 g/L	2, 15	C	3	DWE
flumioxazine	BROADSTAR	Gr	25 %	14	C	4	VAJ
flumioxazine	CHATEAU	WDG	51,1 %	14	C	4	VAJ
flumioxazine	PAYLOAD	WDG	51,1 %	14	C	4	VAJ

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
flumioxazine	SUREGUARD	WDG	51,1 %	14	C	4	VAJ
flumioxazine	VALTERA	WDG	51,1 %	14	C	4	VAJ
fluroxypyr	TROPHY A	EC	180 g/L	4	B	3	NUA
fomésafène	REFLEX	Sn	240 g/L	14	B	3	SYN
foramsulfuron + flufénacet	OPTION 1.2.3[1] (OPTION 2.25 OD + DEFINE)	OD + WG	22,5 g/L + 60 %	2, 15	C	4, 3	BCZ
foramsulfuron	OPTION 2.25 OD	OD	22,5 g/L	2	C	4	BCZ
fosamine d'ammonium	KRENITE	Sn	480 g/L	27	B	4	DUQ
glyphosate	CATENA HERBICIDE	Sn	360 g/L	9	B	3	MOX
glyphosate	CREDIT 45	Sn	450 g/L	9	B	3	NUA
glyphosate	CREDIT PLUS	Sn	360 g/L	9	B	3	NUA
glyphosate	EZJECT	P	0.15 g/capsule	9	C	4	MOX
glyphosate	FACTOR	Sn	356 g/L	9	B	4	INT
glyphosate	FACTOR 540	Sn	540 g/L	9	B	4	INT
glyphosate	FORZA SILVICULTURAL HERBICIDE	Sn	360 g/L	9	B	4	CAU
glyphosate	GLYFOS	Sn	360 g/L	9	B	4	CAU
glyphosate	MAVERICK III	Sn	480 g/L	9	B	4	DOW
glyphosate	RENEGADE	Sn	356 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	RENEGADE HC	Sn	540 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	ROUNDUP ULTRA2	Sn	540 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	ROUNDUP WEATHERMAX	Sn	540 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	SHARPSHOOTER	SC	356 g/L	9	B	4	UAG
glyphosate	SHARPSHOOTER PLUS	Sn	360 g/L	9	B	4	UAG
glyphosate	TOUCHDOWN TOTAL	Sn	500 g/L	9	B	4	SYN
glyphosate	VISION	Sn	356 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	VISION MAX	Sn	540 g/L	9	B	4	MOX
glyphosate	VANTAGE	Sn	356 g/L	9	B	4	DOW
glyphosate	VANTAGE FORESTRY	Sn	356 g/L	9	B	4	DOW
glyphosate	VANTAGE PLUS	Sn	360 g/L	9	B	4	DOW
glyphosate	VANTAGE PLUS MAX	Sn	480 g/L	9	B	4	DOW
glyphosate	VANTAGE PLUS MAX II	Sn	480 g/L	9	B	4	DOW

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
glyphosate	WISE UP	Sn	356 g/L	9	B	4	ADJ
glyphosate/mésotrione/ s-métolachlore/benoxacor	HALEX GT	SC	525 g/L	9, 27, 15	B	3	SYN
glufosinate ammonium	IGNITE	Sn	150 g/L	10	A	4	BCZ
glufosinate ammonium	LIBERTY 200SN	Sn	200 g/L	10	A	4	BCZ
hexazinone	PRONONE	Gr	10 %	5	C	4	DUQ
hexazinone	VELPAR	DF	75 %	5	C	3	DUQ
imazapyr	ARSENAL	Sn	240 g/L	2	B	3	BAZ
imazéthapyr	PURSUIT	Sn	240 g/L	2	A	3	BAZ
imazéthapyr/pendiméthaline	VALOR	Sn	342 g/L	2, 3	A	3, 2	BAZ
imazéthapyr + bentazone	CLEANSWEEP[1] (PURSUIT + BASAGRAN FORTÉ)	Sn + Sn	240 g/L + 480 g/L	2, 6	A	3, 4	BAZ
imazéthapyr + métribuzine	CONQUEST LQ[1] (PURSUIT + SENCOR 480F)	Sn + F	240 g/L + 480 g/L	2, 5	C	3	BAZ
isoxabène	GALLERY	DF	75 %	21	C	3	DWE
isoxaflutole	CONVERGE FLEXX	Su	240 g/L	27	B	2	BCZ
isoxaflutole + atrazine	CONVERGE XT[1] (CONVERGE FLEXX + CONVERGE 480)	Su + Su	240 g/L + 480 g/L	5, 27	B	2, 3	BCZ
linuron	LOROX L	LiSu	480 g/L	7	A	4	TES
MCPA	MCPA AMINE 500	Sn	500 g/L	4	A	5	*
MCPA	MCPA AMINE 600	Sn	600 g/L	4	A	3	*
MCPA	MCPA ESTER 500	Sn	500 g/L	4	B	3	*
MCPA	MCPA ESTER 600	Sn	600 g/L	4	B	3	*
MCPA	MCPA SODIUM 300	Sn	300 g/L	4	A	4	*
MCPA	TROPHY B	Sn	500 g/L	4	B	3	NUA
MCPB/MCPA	CLOVITOX PLUS	Sn	375 g/L + 25 g/L	4	A	4	INT
MCPB/MCPA	TOPSIDE	Sn	400 g/L	4	A	4	UAG
MCPB/MCPA	TROPOTOX PLUS	Sn	400 g/L	4	A	4	NUA
mécoprop-P	COMPITOX	Sn	150 g/L	4	A	4	NUA
mécoprop-P	MECOPROP	Sn	150 g/L	4	A	4	UAG
mécoprop/2,4-D	TURF-RITE 2+2	Sn	(1:1) 400 g/L	4	A	4	AGR

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
mécoprop-P/2,4-D	IPCO PREMIUM 2-WAY XP TURF HERBICIDE	Sn	(1:1) 400 g/L	4	A	4	INT
mécoprop-P/2,4-D	MECOTURF PLUS 2,4-D	Sn	(1:1) 400 g/L	4	A	4	NUA
mésotrione	CALLISTO	SC	480 g/L	27	B	3	SYN
métam-sodium	VAPAM	Sn	380 g/L	27	C	4	UAG
métribuzine	SENCOR 480 F	Su	480 g/L	5	C	3	BCZ
métribuzine	SENCOR 75 DF	WG	75 %	5	C	3	BCZ
métribuzine	SENCOR SOLUPAK	WG	75 %	5	C	3	BCZ
napropamide	DEVRINOL 10G	Gr	10 %	15	C	4	UAG
napropamide	DEVRINOL 2G	Gr	2 %	15	C	4	UAG
napropamide	DEVRINOL DF	DF	50 DF	15	C	4	UAG
nicosulfuron	ACCENT	DF	75 %	2	C	3	DUQ
nicosulfuron + prosulfuron + dicamba	ACCENT 1-PASS[1] (ACCENT + PEAKPLUS)	DF + WG + Sn	75 % + 75 % + 480 g/L	2, 4	C	3	DUQ
nicosulfuron + diflufenzopyr/dicamba	ACCENT TOTAL[1] (ACCENT + DISTINCT)	DF + WG	75 % + 70 %	2, 4	C	3	DUQ
nicosulfuron/rimsulfuron	ULTIM 75DF	DF	(1:1) 75 %	2	C	3	DUQ
nicosulfuron/rimsulfuron + diflufenzopyr/dicamba	ULTIM TOTAL[1] (ULTIM + DISTINCT)	DF + WDG	75 % + 70 %	2, 4	C	3	DUQ
oxadiazon	RONSTAR 2G	Gr	2 %	14	C	3	BCZ
oxyfluorfène	GOAL 2XL	EC	240 g/L	14	A	2	DWE
paraquat	GRAMOXONE	Sn	200 g/L	22	A	3	SYN
pendiméthaline	PROWL 400	EC	400 g/L	3	A	2	BAZ
piclorame/2,4-D	TORDON 101	Sn	(1:3,7) 305 g/L	4	A	3	DWE
prométryne	GESAGARD 480 SC	Su	480 g/L	5	B	3	SYN
propyzamide	KERB	WP	50 %	15	C	3	DWE
prosulfuron + dicamba	PEAKPLUS[1] (PEAK + BANVEL II)	WG + Sn	75 % + 480 g/L	2, 4	C	3	SYN
pyrasulfotole/bromoxynil	INFINITY	EC	256 g/L	27, 6	C	3	BCZ
pyrazone	PYRAMIN FL	Su	430 g/L	5	B	4	BAZ
quizalofop-p-éthyl	ASSURE II	EC	96 g/L	1	A	3	DUQ
rimsulfuron	ELIM EP	DF	25 %	2	C	3	DUQ

TABLEAU 4–1. Herbicides utilisés en Ontario (suite)

Abréviations et titres de colonne expliqués à la p. 32.

MATIÈRE ACTIVE	NOM COMMERCIAL	Préparation	Concentration garantie de matière active	Groupe	Entreposage durant l'hiver	Classement	Code du fabricant
rimsulfuron	PRISM	DF	25 %	2	C	3	DUQ
rimsulfuron + s-métolachlore/benoxacor + dicamba	BATTALION[1] (ELIM + DUAL II MAGNUM + BANVEL II)	DF + EC + Sn	25 % + 915 g/L + 480 g/L	2, 15, 4	B	3	DUQ
rimsulfuron + glyphosate	GALAXY[1] (ELIM EP + ROUNDUP WEATHERMAX)	DF + Sn	25 % + 540 g/L	2, 9	C, B	3, 4	DUQ
s-métolachlore + métribuzine	BOUNDARY	EC + WG	915 g/L + 75 %	5, 15	B	3	SYN
s-métolachlore/benoxacor	DUAL II MAGNUM	EC	915 g/L	15	B	3	SYN
s-métolachlore/benoxacor/atrazine	PRIMEXTRA II MAGNUM	SC	(1:0,8) 720 g/L	5, 15	B	3	SYN
Sclerotinia minor, souche IMI 344141	SARRITOR	Gr	300 UFC/g	—	—	3	SAR
séthoxydime	POAST ULTRA	EC	450 g/L	1	B	4	BAZ
simazine	PRINCEP NINE-T	WG	90 %	5	C	3	SYN
simazine	SIMADEX	Su	500 g/L	5	A	3	BCZ
simazine	SIMAZINE 480	Su	480 g/L	5	A	3	UAG
sulfate de cuivre	POLYDEX MC	MC	5 %	—	A	4	ENR
terbacile	SINBAR	WP	80 %	5	C	3	DUQ
thifensulfuron-méthyl	PINNACLE	DF	75 %	2	C	4	DUQ
thifensulfuron-méthyl/ tribenuron-méthyl	REFINE SG	SG	50 %	2	C	3	DUQ
thifensulfuron-méthyl/ tribenuron-méthyl + MCPA	REFINE M[1] (REFINE SG + MCPA ESTER 500)	SG	50 %	2, 4	C	3	DUQ
topramézone	IMPACT	SC	336 g/L	27	A	3	BAZ
tralkoxydime	ACHIEVE LIQUID	EC	400 g/L	1	B	4	SYN
triclopyr	GARLON 4	EC	480 g/L	4	B	3	DWE
triclopyr	RELEASE	EC	480 g/L	4	B	3	DWE
trifluraline	BONANZA 400	EC	400 g/L	3	B	4	UAG
trifluraline	RIVAL	EC	500 g/L	3	A	4	NUA
trifluraline	TREFLAN EC	EC	480 g/L	3	A	4	DWE
triflusulfuron-méthyl	UPBEET	DF	50 %	2	C	3	DUQ

NOTES

La mention d'une marque ou d'un nom commercial dans le tableau qui précède ne signifie pas que le Comité ontarien de lutte contre les mauvaises herbes cautionne ce produit ni qu'il en recommande l'utilisation à l'exclusion des autres produits comparables. Les noms commerciaux apparaissent tous en majuscules.

* Divers fabricants.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous ce nom commercial.

Abréviations des préparations

DC = concentré dispersable
DF = produit pulvérulent
DG = granulés secs
DS = produit sec soluble
EC = concentré émulsifiable
EM = émulsion
FI = suspension aqueuse
Gi = gel
Gr = granulé
Li = liquide
ME = suspension en microcapsules
OD = dispersant de pétrole
PE = pastilles
PS = produit pressurisé
SC = concentré soluble
SG = granulés solubles
Sn = solution
SP = poudre soluble
Su = suspension autodispersable
WDG = granulés dispersables dans l'eau
WG = granulés mouillables
WP = poudre mouillable

Entreposage durant l'hiver

A — Ne pas laisser geler.
B — Il est préférable de ne pas laisser geler le produit. Si cela arrive, le réchauffer à 10 ou 20 °C et bien l'agiter avant l'utilisation.
C — En général, ne craint pas le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.
D — Ne pas laisser geler — entreposer à une température supérieure à 10 °C.
E — Ne pas laisser geler — entreposer à une température supérieure à 4 °C (applicable à l'AMITROL 240).

Code du fabricant

Voir l'annexe H, *Fabricants et distributeurs d'herbicides*, p. 409. Les numéros de téléphone et les sites Web y sont également inscrits.

TABLEAU 4–2. Description du système de classement des pesticides de l'Ontario

Catégorie	Résumé*
1	Le pesticide est désigné en application de la *Loi sur les produits antiparasitaires* (Canada) comme pesticide de la catégorie Fabrication ou est enregistré en application de la *Loi sur les engrais* (Canada).
2, 3, 4	Le pesticide est désigné en application de la *Loi sur les produits antiparasitaires* (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale (c.-à-d. destiné aux activités commerciales précisées sur l'étiquette) ou Restreinte (c.-à-d. lorsque l'étiquette précise des restrictions touchant l'affichage, la distribution, l'utilisation du produit ou les qualifications des personnes qui l'utilisent.
5, 6, 7	Le pesticide désigné en application de la *Loi sur les produits antiparasitaires* (Canada) comme pesticide de la catégorie Domestique (c.-à-d. distribué principalement auprès du grand public à des fins personnelles à l'intérieur ou autour de la maison.
8	Le pesticide est un produit dont l'utilisation est interdite en Ontario.
9	Le pesticide est un produit qu'il est interdit d'épandre sur le sol ou au-dessus du sol ou d'incorporer au sol, à moins que ce soit pour des activités jouissant d'une exception.
10	Le pesticide peut être utilisé conformément à l'exception prévue pour des raisons de santé publique et de sûreté.
11	Le pesticide renferme des ingrédients qui obligent les personnes qui les utilisent sur des terrains non résidentiels ou les titulaires d'un permis de lutte antiparasitaire qui les utilisent sur les terrains résidentiels où ils font des traitements de poser un écriteau vert avisant le public que des pesticides sont utilisés à ces endroits.

*On trouve une description détaillée de chacune des catégories au : *http://www.ene.gov.on.ca/en/land/pesticides/class-pesticides.php*.

Notes sur les herbicides

Les notes ci-dessous complètent les recommandations données plus loin dans la présente publication au sujet de l'utilisation et de la toxicité des herbicides, et des précautions à prendre. À part quelques exceptions, les herbicides sont inscrits sous leur nom commun (générique) et non sous leur nom commercial. Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, afin de trouver le nom commun correspondant à un nom commercial particulier. Par exemple, le tableau 4–1 indique que le produit vendu sous le nom commercial AATREX a comme nom commun atrazine; les notes sur le produit AATREX se trouvent donc sous *atrazine* dans la présente partie. Pour de l'information sur les adjuvants, voir le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75.

L'information complète relative à chaque herbicide se trouve sur l'étiquette apposée sur le contenant du produit. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (un organisme fédéral) présente sur son site Web les étiquettes des pesticides à l'adresse www.pmra-arla.gc.ca. De nombreux fabricants reproduisent également les étiquettes et/ou les fiches signalétiques des produits sur leurs sites Web dont les adresses se trouvent à la dernière page de cette publication.

2,4-D

Noms commerciaux : 2,4-D AMINE 500, 2,4-D ESTER 600, 2,4-D ESTER 700.

Groupe chimique : Phénoxy.

Homologations : Céréales, gazon, pâturages, sols non cultivés, asperges, maïs de grande culture, canneberge, framboisiers, fraisiers, arbres fruitiers en production dont pommier, poirier, pêcher, prunier, abricotier et cerisier, mauvaises herbes aquatiques et broussailles.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des dicotylédones, broussailles.

Absorption et diffusion : Le 2,4-D est absorbé rapidement par les racines et les feuilles, transporté surtout dans le phloème avec les sucres, mais aussi avec l'eau dans le xylème. L'accumulation se fait surtout dans les jeunes régions méristématiques (en croissance rapide) des racines et des plantules.

Base de sélectivité : Des différences dans l'interception, la pénétration, la diffusion, le métabolisme et la sensibilité des sites actifs rendent le 2,4-D plus toxique pour les dicotylédones que pour les graminées.

Modes d'application : En postlevée (dicotylédones), sur les tiges, le feuillage et la base des troncs (broussailles).

Rémanence : Sa demi-vie dans le sol n'est normalement que d'une à deux semaines pendant la saison de végétation à cause de la rapide décomposition du produit par les micro-organismes du sol.

Particularités : Toutes les mauvaises herbes sont plus facilement éliminées lorsqu'elles poussent vigoureusement dans un sol humide. Malheureusement, quelques dicotylédones cultivées, plantes ornementales et de jardin, sont aussi sensibles au 2,4-D que bon nombre de mauvaises herbes. Il suffit d'une quantité infime d'herbicide sous forme de dérive de gouttelettes, de dérive de vapeur ou de contaminant dans le sol ou dans l'eau, pour causer de sérieux dommages. Même les cultures pouvant être traitées sans danger peuvent être sensibles à un certain stade de leur croissance ou à des doses excessives; il faut donc suivre à la lettre le mode d'emploi. Les amines et les esters sont les formes les plus communes de 2,4-D. Les esters sont les plus puissants et peuvent être utilisés à basse dose et en tant que débroussaillant. Puisque la dérive de vapeur est un problème potentiel avec les esters, n'utiliser que les amines sur les pelouses ou près des jardins et des cultures sensibles. Des esters peu volatils peuvent être utilisés par des agriculteurs ou des entrepreneurs agréés dans les zones où le risque de dommages sur la végétation sensible non visée est faible. Les recommandations sont exprimées en équivalent acide. Lors du calcul de la quantité de produit à utiliser, il faut tenir compte de la quantité d'équivalent acide, laquelle diffère selon les spécialités commerciales.

2,4-D/DICAMBA/MÉCOPROP-P

Noms commerciaux : KILLEX 500, PAR III, PREMIUM 3-WAY XP, TRI-KIL, TRILLION-P LIQUID TURF HERBICIDE, WEEDAWAY XP TURF HERBICIDE.

Groupe chimique : Phénoxy/acide benzoïque/phénoxy.

Homologation : Gazon.

Mauvaises herbes sensibles : Aux doses recommandées en grandes cultures : renouée liseron, renouée persicaire, renouée scabre, soude roulante, laiteron potager, liseron des haies, spargoute des champs, renouée, sarrasin spontané, petite herbe à poux, lampourde glouteron, tabouret des champs, moutardes, sisymbres et vélars, amarante fausse-blite, amarante à racine rouge et chénopode blanc. Aux doses recommandées en sols non cultivés : un grand nombre de dicotylédones dont chardon vulgaire, chicorée sauvage, salsifis majeur, séneçon, lychnide blanche, herbe à puce, aulne et kalmia à feuilles étroites.

Modes d'application : En postlevée lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active.

Particularités : Ce mélange d'herbicides détruit une gamme plus large de mauvaises herbes que chacun de ces herbicides employé seul.

2,4-DB

Noms commerciaux : COBUTOX, EMBUTOX, CALIBER.

Groupe chimique : Phénoxy.

Homologations : Luzerne, lotier, trèfles (sauf mélilot) au stade plantules, semés ou non avec du blé de printemps, de l'orge ou de l'avoine; maïs.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses dicotylédones jeunes : tabouret des champs, petite herbe à poux, chénopode blanc, renouée liseron, moutardes sisymbres et vélars. Destruction de la partie

aérienne du chardon des champs, du liseron des champs, et du laiteron des champs.

Absorption et diffusion : Le 2,4-DB est absorbé par le feuillage et migre rapidement vers les points de croissance.

Base de sélectivité : Les mauvaises herbes sensibles transforment rapidement le 2,4-DB en 2,4-D; ce que ne font pas les espèces tolérantes, normalement.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Aucune.

Particularités : Les mauvaises herbes de la famille des crucifères ne sont habituellement pas détruites par un traitement au 2,4-DB seul, après le stade 4 feuilles; il vaut mieux appliquer le 2,4-DB en association avec le MCPA. La luzerne risque de souffrir du traitement en période de sécheresse ou lorsqu'elle a dépassé le stade 4 feuilles.

ACIDE ACÉTIQUE

Nom commercial : ECOCLEAR.

Groupe chimique : Inconnu.

Homologations : Endroits non cultivés, servitudes et terrains à vocation industrielle.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées et dicotylédones annuelles, dont petite herbe à poux, stellaire moyenne, chénopode blanc et lupuline. Supprime la partie aérienne de vivaces dont pissenlit, plantains, trèfles, carotte sauvage, linaire, chiendent commun, vesce jargeau, épervières et patience crépue.

Base de sélectivité : Non sélectif.

Modes d'application : Appliquer par pulvérisation en postlevée quand les mauvaises herbes sont peu développées et en croissance active. ECOCLEAR étant un herbicide de contact, un bon recouvrement est indispensable à l'efficacité du traitement. ECOCLEAR peut servir à des traitements localisés ou à des traitements de pleine surface. Si l'application se fait en pleine surface, utiliser 750–1250 L de bouillie/ha.

Rémanence : Aucune.

Particularités : ECOCLEAR agit très rapidement. Peut procurer une maîtrise complète en aussi peu que 24 heures. Les mauvaises herbes matures, dormantes ou endurcies par un stress hydrique ont tendance à tolérer davantage le traitement à l'EcoClear.

ACIFLUORFÈNE

Nom commercial : BLAZER.

Groupe chimique : Éthers diphényliques.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles y compris : lampourde glouteron, stramoine commune, renouée persicaire, chénopode blanc, moutarde des champs, amarante à racine rouge, petite herbe à poux et morelle noire de l'Est. Détruit temporairement certaines vivaces dont : chardon des champs, liseron des haies, liseron des champs et asclépiade de Syrie.

Absorption et diffusion : L'absorption se fait par le feuillage. Diffusion limitée.

Base de sélectivité : Métabolisé par les plantes tolérantes.

Modes d'application : En postlevée quand les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. Épandre dans 200 à 400 L d'eau/ha, à la pression de 275 à 400 kPa. Le soya est tolérant passé le stade de la première feuille trifoliée. La pulvérisation doit atteindre toutes les herbes visées. Il est recommandé d'utiliser des buses à jet plat. Ne pas ajouter d'adjuvants si l'on utilise la pleine dose d'acifluorfène. On peut mélanger l'acifluorfène et BASAGRAN dans la cuve du pulvérisateur pour tuer une gamme complémentaire de dicotylédones, y compris l'abutilon. Il est recommandé d'ajouter au mélange acifluorfène et BASAGRAN 1 L de concentré d'huile ASSIST/ha.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : L'acifluorfène n'est pas volatil. Peut endommager gravement la culture s'il est appliqué par temps très chaud et humide ou si la culture souffre à cause d'un désherbage chimique précédent, d'un excès d'eau, de la sécheresse, ou d'une période de froid précédant le traitement. Le froid ou la sécheresse peut retarder l'effet désherbant. Une pluie tombant dans les 6 heures qui suivent le traitement peut en réduire l'efficacité. L'acifluorfène n'étant pas rémanent, on peut s'attendre à ce qu'une nouvelle vague de mauvaises herbes succède à la première qui aura été tuée.

ADJUVANTS

Voir chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75.

AMINOPYRALIDE

Nom commercial : MILESTONE HERBICIDE.

Groupe chimique : Pyridines.

Homologations : Parcours naturels, pâturages de graminées, terrains industriels et sols non cultivés du Canada.

Mauvaises herbes sensibles : Le MILESTONE utilisé seul maîtrise : chardon des champs, centaurée maculée, verge d'or du Canada, matricaire inodore, armoise absinthe et tanaisie vulgaire. Le MILESTONE peut être mélangé en cuve avec du 2,4-D amine pour maîtriser symphorine de l'Ouest, pissenlit, laiteron potager, bardanette épineuse, chardon vulgaire, bardane, renoncule, lampourde glouteron, plantain majeur, patience crépue, sagesse-des-chirurgiens, salsifis majeur, épervières, cranson dravier, lépidie densiflore, laiteron des champs, laitue scariole, grande ortie, mélilot et carotte sauvage.

Absorption et diffusion : L'absorption se fait surtout par le feuillage, mais aussi, grâce à l'action rémanente du produit, par les racines, les plantules et les graines. Forte diffusion.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée quand les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. Appliquer à l'aide de matériel terrestre dans un minimum de 100 L/ha ou par voie aérienne dans un mini-

mum de 19 L de bouillie/ha. Un bon recouvrement du feuillage est indispensable.

Rémanence : Action rémanente à court terme dans le sol permettant de maîtriser la plupart des espèces pendant deux ans.

Particularités : Le MILESTONE ne comporte aucune contre-indication au pâturage des animaux ni même à celui des animaux laitiers en lactation dans les zones traitées. Faire brouter aux animaux des pâturages non traités ou leur servir du foin non traité pendant 3 jours avant de les transférer dans des zones où peuvent pousser des cultures à feuilles larges sensibles. Ne pas transporter de compost de fumier renfermant du MILESTONE sur des fleurs, des potagers, des cultures sensibles, etc. N'utiliser que sur des graminées fourragères bien établies (croissance racinaire secondaire). Le MILESTONE herbicide fait mourir les légumineuses (y compris la luzerne et le trèfle dans des prairies artificielles). Prévoir une zone tampon suffisante entre les zones traitées et les cultures sensibles. Ne pas laisser le brouillard de pulvérisation dériver vers des cultures sensibles. Attendre 48 mois avant de semer des légumineuses sur les terres traitées. Nettoyer le matériel de pulvérisation à fond avant de l'utiliser pour d'autres applications sur des cultures sensibles. Ne pas appliquer le MILE-STONE sur les pelouses cultivées résidentielles ou commerciales. Résiste à l'entraînement par la pluie pendant 2 heures.

AMITROLE

Nom commercial : AMITROL 240.

Groupe chimique : Triazoles.

Homologations : En présemis pour le blé, l'orge, le canola, les pois de grande culture, le maïs, le soya et les haricots blancs. Après la récolte dans toute culture. Désherbage des vergers de pommiers durant la saison de production. Désherbage des brise-vent, des zones incultes, des marécages et des fossés. Désherbage localisé des pâturages.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses graminées et dicotylédones annuelles et vivaces, dont chiendent commun, pissenlit, chardon des champs, laiteron, herbe à puce, sumac à vernis, linaire, asclépiade, cranson, euphorbe ésule, prêle des champs, quenouilles, chèvrefeuille, robinier, frêne, sumac.

Absorption et diffusion : Absorbé par le feuillage et les racines, l'amitrole est transporté dans le xylème et le phloème. S'accumule dans les zones de croissance de la plante.

Base de sélectivité : Les plantes résistantes métabolisent l'amitrole plus rapidement que les plantes sensibles; elles l'absorbent moins parfois grâce à leur structure foliaire qui réduit les points de pénétration.

Modes d'application : Application foliaire sur les plants en pleine croissance. L'uniformité du traitement est essentielle. Si les mauvaises herbes sont parvenues à maturité, il vaut mieux les faucher, pour ensuite pulvériser sur la repousse. Ne pas déranger les plants traités pendant au moins 2 semaines. Ne pas faire de traitement post-récolte après le 1er octobre. Contre le chiendent commun et le chardon des champs, appliquer au printemps ou à l'automne sur des plants en pleine croissance (15–20 cm de haut); attendre 10–14 jours pour ensuite labourer ou passer les disques.

Rémanence : Approximativement 2 à 4 semaines dans un sol chaud et humide.

Particularités : La plupart des cultures sont affectées si elles entrent en contact avec ce produit. Les résultats du traitement sont médiocres : si le feuillage n'est pas bien recouvert par la pulvérisation, si les plants sont trop développés ou souffrent de la sécheresse, ou si de fortes pluies surviennent dans les 6 heures suivant l'application. Ne pas faire pâturer le terrain traité ni semer céréales, pois, luzerne ou trèfle pendant les 8 mois suivant le traitement. Ne pas faire pâturer le bétail pendant 6 mois après le désherbage localisé d'un pré.

ATRAZINE

Noms commerciaux : ATRAZINE 480, CLEAN CROP AATREX LIQUID 480, CONVERGE 480.

Groupe chimique : S-triazine.

Homologations : Maïs à ensilage, de grande culture, de semence et sucré, bleuetiers nains, canola (colza) résistant aux triazines.

Mauvaises herbes sensibles : Détruit la majorité des dicotylédones : moutardes, sisymbres, vélars, pourpier potager, herbe à poux, renouée scabre, renouée persicaire, renouée liseron, chénopode blanc, amarante et trèfle spontané. Certaines populations de chénopodes blancs, d'amarantes et d'herbes à poux sont résistantes aux triazines et échappent donc au traitement.

Absorption et diffusion : Rapide absorption foliaire, mais surtout radiculaire. L'atrazine migre ensuite vers le sommet de la plante et s'accumule sur le pourtour des feuilles et aux points de croissance.

Base de sélectivité : L'atrazine est métabolisée par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Pour le maïs : incorporation en présemis, traitement de prélevée ou de postlevée (avec ou sans huile), habituellement avant que les annuelles atteignent plus de 4 cm; par temps sec, une incorporation peu profonde peut accroître l'activité de l'herbicide; des mélanges d'huile ou huile/surfactant augmentent l'activité en postlevée. Pour le bleuetier nain, traitement de prélevée. Pour le canola tolérant les triazines, traitement de postlevée. Il est possible d'imprégner d'atrazine un engrais solide et de l'incorporer en présemis. L'atrazine peut être mélangée en cuve avec plusieurs autres herbicides afin d'accroître le spectre du désherbage dans le maïs.

Rémanence : Peut persister dans le sol plus ou moins longtemps selon la dose utilisée, les conditions météorologiques et les types de sol (plus longtemps s'il fait sec et frais et si le sol est sablonneux). Les traitements de postlevée tendent à persister plus longtemps que les traitements de prélevée. Voir la

section *Notes spéciales sur le maïs sucré et le maïs de grande culture*, p. 128.

Particularités : Les effets de l'atrazine peuvent se prolonger au-delà d'un an. La plupart des cultures succédant au maïs ne souffrent pas en général des résidus d'atrazine si l'on n'en a pas épandu plus de 1,5 kg (m. active) à l'hectare. Les problèmes de rémanence peuvent se poser en sols sablonneux et par temps sec et frais. Voir *Résidus d'atrazine et simazine dans le sol*, p. 128.

ATRAZINE/2,4-D

Nom commercial : SHOTGUN.

Groupe chimique : Triazine/phénoxy.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Renouée persicaire, chénopode blanc, moutarde des champs, amarante à racine rouge, petite herbe à poux, abutilon, renouée liseron; mélanger en cuve avec pendiméthaline + rimsulfuron, nicosulfuron, rimsulfuron ou nicosulfuron/rimsulfuron pour lutter contre l'échinochloa pied-de-coq, les sétaires verte et glauque; mélanger en cuve avec rimsulfuron ou nicosulfuron/rimsulfuron pour lutter contre le panic d'automne.

Absorption et diffusion : Les deux composants peuvent être assimilés par les racines ou les pousses, mais l'atrazine est surtout assimilée par les racines et se diffuse par transpiration, alors que le 2,4-D est absorbé essentiellement par les pousses et se diffuse dans le phloème.

Base de sélectivité : Voir les notes sur le 2,4-D et l'atrazine.

Modes d'application : Postlevée.

Rémanence : Des dommages sont possibles si la terre traitée à l'atrazine/2,4-D sert la même année à une culture autre que le maïs. Dans l'année qui suit le traitement, s'abstenir de cultiver des cultures sensibles comme le tabac et la betterave sucrière. Si l'année du traitement est marquée par des périodes prolongées de temps sec, les cultures qui suivent, notamment les haricots blancs, oignons, pois, tomates et navets peuvent en souffrir quelque peu. Les dommages aux cultures sont plus sujets à se produire lorsque les jeunes plants sont soumis à des périodes de stress comme des périodes de temps anormalement chaud et sec.

Particularités : Voir les notes sur le 2,4-D pour de l'information sur la pulvérisation et la dérive de vapeur. Voir *Résidus d'atrazine et simazine dans le sol*, p. 128.

BENSULIDE

Nom commercial : BETASAN.

Groupe chimique : Benzène-sulfamides.

Homologations : Gazons, pelouses et concombres.

Mauvaises herbes sensibles : Les graminées annuelles en germination comme le pâturin annuel, l'échinochloa pied-de-coq, la digitaire et la sétaire. L'amarante à racine rouge, le chénopode blanc et la bourse-à-pasteur sont moins sensibles.

Absorption et diffusion : Le produit est adsorbé à la surface des racines qui en absorbent un peu. Migration négligeable vers les feuilles.

Base de sélectivité : Inhibe la croissance des racines et inhibe partiellement la division cellulaire des plantules sensibles. Les espèces sensibles sont affectées seulement au stade plantule. Métabolisé par les graminées établies.

Modes d'application : En prélevée au printemps ou à l'automne sur pelouse (bien établie seulement); à l'automne, épandre la dose supérieure pour empêcher les mauvaises herbes de germer le printemps suivant; incorporer dans le sol par une légère irrigation.

Rémanence : Assure le désherbage toute la saison. Dégradé lentement par les micro-organismes du sol avec une demi-vie de 4–6 mois selon les types de sols. À cause des résidus présents dans le sol, ne planter l'année suivante que cucurbitacées, choux, carottes, laitue, poivrons et tomates.

Particularités : Le bensulide est inactif dans les sols riches en matière organique (sols organiques). L'incorporation est recommandée afin d'éviter la photodécomposition. Ne pas ressemer de gazon moins d'un an après le traitement. Les jardiniers amateurs peuvent traiter leur pelouse avec des préparations commerciales associant le bensulide et un engrais.

BENTAZONE

Noms commerciaux : BASAGRAN FORTÉ et BASAGRAN.

Groupe chimique : Benzothiadiazines.

Homologations : BASAGRAN FORTÉ et BASAGRAN : Pois, lin, millet, sorgho, soya et maïs. BASAGRAN est également homologué sur les arachides, les haricots de Lima, les haricots mange-tout, les bleuetiers en corymbe, les nouvelles plantations de pommiers, de cerisiers, d'abricotiers, de pêchers, de poiriers et le gazon. BASAGRAN FORTÉ et BASAGRAN sont homologués pour être utilisés sur un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles. Voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des précisions sur les homologations.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones : morelle faux-sarracha, chénopode blanc, amarante à racine rouge, gnaphale des vases, pourpier potager, petite herbe à poux, radis sauvage, soude roulante, galinsoga cilié, spargoute des champs, moutarde des oiseaux, ketmie trilobée, renoncules, séneçon vulgaire, stramoine commune, grande herbe à poux, abutilon, renouée persicaire, moutarde des champs, lampourde glouteron, tabouret des champs, bourse-à-pasteur et stellaire. Il tue aussi les biotypes de chénopode blanc, d'amarante à racine rouge, de petite herbe à poux et de séneçon vulgaire qui sont résistants aux triazines). Détruit la partie aérienne du chardon des champs et du souchet. Deux traitements à 10 jours d'intervalle permettent de stopper la croissance du liseron des champs.

Absorption et diffusion : Absorption foliaire. Diffusion nulle.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée. Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. La culture doit être à un stade de végétation où elle est tolérante (voir les recommandations spécifiques à chaque culture sur l'étiquette). Il faut que la pulvérisation couvre bien tout le feuillage. Utiliser des buses à jet plat inclinées à 45° vers l'avant. Utiliser le CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST avec le BASAGRAN. Réduire la dose d'ASSIST par temps chaud et humide. On peut ajouter au BASAGRAN FORTÉ ou au BASAGRAN du sulfate d'ammonium liquide ou du nitrate d'ammonium et de l'urée en solution 28 % pour mieux lutter contre l'abutilon et le chénopode blanc, dans le soya seulement. On peut mélanger PINNACLE avec BASAGRAN FORTÉ ou BASAGRAN dans le pulvérisateur pour mieux lutter contre l'amarante et le chénopode blanc, dans le soya seulement. L'ajout d'autres adjuvants n'est pas nécessaire avec BASAGRAN FORTÉ. Ce produit n'est pas homologué pour épandage par aéronef. BASAGRAN est homologué en traitement aérien sur le soya, les haricots secs et les haricots mange-tout.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : Le maïs et la pelouse sont tolérants à tous les stades de leur croissance. Le bentazone n'est pas volatil. La culture risque de souffrir temporairement du traitement par temps chaud et humide ou si elle subit un stress (inondation, sécheresse, froid). Une température fraiche ou une sécheresse peut retarder l'action de l'herbicide. Une pluie dans les 6 ou 8 heures après l'application peut réduire l'efficacité du produit. Le bentazone n'étant pas rémanent, une deuxième vague de mauvaises herbes est possible.

BENTAZONE/ATRAZINE

Nom commercial : LADDOK.

Groupe chimique : Benzothiadiazine/s-triazine.

Homologations : Maïs à ensilage, de grande culture, de semence et sucré.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles : morelle noire, amarante à racine rouge, chénopode blanc, gnaphale des vases, pourpier potager, petite herbe à poux, soude roulante, spargoute des champs, ketmie trilobée, renouée persicaire, moutarde des champs, galinsoga cilié, moutarde des oiseaux, renoncule, stellaire, séneçon vulgaire, stramoine commune, grande herbe à poux, abutilon et lampourde glouteron. Tue aussi les biotypes résistant aux triazines. Détruit la partie aérienne du chardon des champs et du souchet; peut stopper la croissance du liseron des champs.

Absorption et diffusion : Absorption principalement foliaire. Le mélange bentazone/atrazine agit surtout par contact, sa diffusion est minime.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Appliquer en début de postlevée lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active, dans 200–400 L d'eau/ha. Traiter avant que les mauvaises herbes aient atteint la taille maximale inscrite sur le mode d'emploi. Pour le maïs, cela correspond généralement au stade 1–5 feuilles. Dans de bonnes conditions de croissance, le meilleur moment pour traiter se situe de 18 à 28 jours après le semis. Le CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST devrait être ajouté dans le réservoir du pulvérisateur pour tous les traitements. Tout le feuillage doit être touché par la pulvérisation. Utiliser des buses à jet plat. Les buses à gros jet sont déconseillées car la bouillie est mal répartie.

Rémanence : Toutes les cultures autres que le maïs risquent de souffrir sur un sol traité au bentazone/atrazine durant la même saison. Un an après, si l'on a respecté les doses recommandées contre les annuelles, la plupart des cultures ne seront pas affectées. Dans les endroits où il y a eu chevauchement ou lorsqu'on a traité deux fois contre le souchet, les cultures suivantes de la rotation risquent de souffrir à cause des résidus d'atrazine.

Particularités : Le maïs est tolérant à tous les stades de sa croissance. Une pluie dans les 6 à 8 heures suivant l'application peut réduire l'efficacité de la bouillie. Le mélange bentazone/atrazine n'est pas volatil, mais ne devrait pas être appliqué lorsque la culture est mal en point à cause d'une période prolongée de froid ou d'humidité, de la pauvreté du sol ou d'autres facteurs.

BROMACIL

Nom commercial : HYVAR X-L.

Groupe chimique : Uraciles.

Homologations : Désherbage total des zones incultes, traitement localisé contre les broussailles.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées et dicotylédones annuelles et vivaces (traitement généralisé). Plusieurs espèces ligneuses (traitement localisé).

Absorption et diffusion : Absorption principalement radiculaire. Les surfactants peuvent stimuler l'absorption foliaire. Le produit migre avec l'eau vers le haut et les feuilles où il inhibe la photosynthèse.

Base de sélectivité : Non sélectif aux doses normales.

Modes d'application : Contre les mauvaises herbes herbacées, pulvériser en pleine surface, de préférence juste avant ou pendant les périodes de croissance active des mauvaises herbes. Contre les broussailles, faire des traitements localisés à l'aide d'un pistolet à distribution exacte, soit à la base de la broussaille visée, soit sur une surface restreinte déterminée.

Rémanence : On a noté une demi-vie de 5–6 mois pour 4,4 kg de bromacil/ha dans un loam limoneux.

Particularités : Ne pas épandre du bromacil quand ce produit risque d'être entrainé par lessivage, ruissellement ou érosion vers les racines des arbres et arbustes que l'on désire conserver. Ne pas appliquer sur la broussaille poussant dans l'eau.

BROMACIL/DIURON

Nom commercial : KROVAR.

Groupe chimique : Uraciles/urées substituées.

Homologations : Désherbage des zones incultes.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des mauvaises herbes herbacées.

Base de sélectivité : Nulle.

Modes d'application : Pulvériser en pleine surface juste avant ou pendant la période de croissance active des mauvaises herbes.

Particularités : Normalement moins d'espèces échappent au traitement avec ce mélange ou repoussent, comparativement à l'utilisation de la même quantité d'un des deux produits. Voir aussi les notes sur le bromacil et le diuron.

BROMOXYNIL

Noms commerciaux : BROTOX, KORIL, PARDNER.

Groupe chimique : Hydroxybenzonitriles.

Homologations : Blé de printemps, orge, avoine, maïs, seigle d'automne, triticale, sorgho fourrager, millet et nombreuses graminées, ail, oignons de garde.

Mauvaises herbes sensibles : Renouée scabre, morelle, abutilon, amarante, petite herbe à poux, lampourde glouteron, tabouret des champs, et moutarde des champs meurent si la pulvérisation les recouvre complètement avant le stade 4 feuilles vraies; la renouée liseron et le chénopode blanc sont maîtrisés jusqu'au stade 8 feuilles. La plupart des dicotylédones vivaces établies, la stellaire et les graminées tolèrent les doses de cet herbicide habituellement employées en plein champ.

Absorption et diffusion : Le bromoxynil est absorbé par le feuillage et migre très peu à l'intérieur de la plante.

Base de sélectivité : Différences au niveau de la rétention de la bouillie, de l'absorption, de la diffusion et de la dégradation.

Mode d'application : Postlevée.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : La culture peut manifester des symptômes (dessèchement des feuilles) si elle subit un stress dans les 2–3 jours avant ou après la pulvérisation; ce stress peut être causé par des températures élevées ou une forte humidité ou, dans le cas du maïs, si le traitement suit une période fraîche et humide. Le rendement n'en est pas en général réduit pour autant. La préparation commerciale comprend un agent mouillant qui améliore l'étalement des gouttelettes sur la feuille. Même si le bromoxynil n'est pas un herbicide efficace lorsqu'il est épandu au sol, il ne faut pas semer les dicotylédones cultivées comme les navets, les pois et les haricots moins d'une semaine après le traitement.

BROMOXYNIL/MCPA

Noms commerciaux : BADGE, BUCTRIL M, LOGIC M, MEXTROL.

Groupe chimique : Hydroxybenzonitriles/phénoxy.

Homologations : Blé d'automne et de printemps, orge, avoine, lin, seigle d'automne, maïs, foin de fléole et alpiste.

Particularités : L'association bromoxynil et MCPA détruit mieux les crucifères que le bromoxynil seul. Voir aussi les notes sur le bromoxynil et le MCPA.

CARFENTRAZONE-ÉTHYLE

Nom commercial : AIM EC.

Groupe chimique : Aryltriazolinones.

Homologations : Destruction chimique en présemis (toutes les cultures sauf tabac, asperge, ginseng, matériel de pépinière et pelouses); traitements à l'aide d'un pulvérisateur muni d'écrans de réduction de la dérive (dans les cultures de racines, tubercules, bulbes, légumineuses, fruits, légumes-feuilles, fruits à pépins, drupes et petits fruits – consulter l'étiquette du produit pour connaître les usages homologués); traitement d'aide à la récolte dans les pommes de terre, haricots secs, soya et céréales.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones.

Absorption et diffusion : Le carfentrazone-éthyle est absorbé par le feuillage et ne se diffuse pas facilement.

Base de sélectivité : Métabolisme.

Modes d'application : Le recouvrement des mauvaises herbes est indispensable à l'efficacité du traitement. Pour la dessiccation, appliquer quand la culture est à maturité et que le grain a commencé à sécher.

Rémanence : Aucune.

Particularités : AIM EC est un produit non rémanent qui n'endommage pas les cultures subséquentes.

CARFENTRAZONE-ÉTHYLE + GLYPHOSATE

Nom commercial : CLEANSTART PLUS (emballage combiné d'AIM EC + CREDIT PLUS).

Groupe chimique : Aryltriazolinones + acides aminés.

Homologations : Destruction chimique en présemis (toutes les cultures sauf tabac, asperge, ginseng, matériel de pépinière et pelouses).

Mauvaises herbes sensibles : Graminées et dicotylédones annuelles et vivaces.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au carfentrazone-éthyle et au glyphosate respectivement.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au carfentrazone-éthyle et au glyphosate respectivement.

Modes d'application : Voir les notes relatives au carfentrazone-éthyle et au glyphosate respectivement.

Particularités : Voir les notes relatives au carfentrazone-éthyle et au glyphosate respectivement.

CHLORIMURON-ÉTHYLE

Nom commercial : CLASSIC.

Groupe chimique : Sulfonylurée.

Homologation : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Petite herbe à poux, amarante à racine rouge et abutilon.

Absorption et diffusion : Après un traitement foliaire, absorption rapide du chlorimuron-éthyle par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement le chlorimuron en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Le chlorimuron-éthyle a une certaine activité rémanente, quoique limitée.

Particularités : Ajouter un surfactant non ionique à raison de 0,2 % v./v. L'ajout de nitrate d'ammonium et d'urée (NAU) en solution 28 % à raison de 2 L/ha renforce l'action contre l'abutilon. Les symptômes types de la mort du plant (chlorose, nécrose) se manifestent entre 1 et 3 semaines suivant le traitement, selon les conditions de croissance. Le produit agit plus rapidement si les conditions de croissance sont favorables tandis que son action est ralentie par temps frais et sec.

CHLORIMURON-ÉTHYLE + GLYPHOSATE

Nom commercial : GARDIEN.

Groupe chimique : Sulfonylurées, acides aminés.

Homologations : Avant les semis de soya. En postlevée, uniquement avec de la semence de soya « Roundup Ready » tolérant le glyphosate.

Mauvaises herbes sensibles : Voir les notes relatives au chlorimuron-éthyle et au glyphosate respectivement.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au chlorimuron-éthyle et au glyphosate respectivement.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au chlorimuron-éthyle et au glyphosate respectivement.

Modes d'application : Voir sous Homologations.

Rémanence : Le chlorimuron-éthyle continue d'agir contre les dicotylédones sensibles après l'application.

Particularités : L'ajout d'un surfactant non ionique n'est pas nécessaire quand le chlorimuron-éthyle est mélangé en cuve avec le glyphosate.

CHLORSULFURON

Nom commercial : TELAR.

Groupe chimique : Sulfonylurées.

Homologations : Sols non cultivés.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles et vivaces : carotte sauvage, chardon des champs, laiteron potager, matricaire inodore, chénopode blanc, moutarde des champs, amarante à racine rouge, tabouret des champs, saponaire des vaches, stellaire et soude roulante.

Absorption et diffusion : Le produit migre dans toute la plante après l'absorption foliaire ou racinaire. L'absorption foliaire est rapide.

Base de sélectivité : La perturbation du métabolisme des acides aminés aboutit à l'inhibition de la division cellulaire chez les espèces sensibles. Des rythmes plus rapides de désintoxication métabolique ont été observés chez des espèces tolérantes.

Modes d'application : En prélevée ou en début de postlevée.

Rémanence : La demi-vie est de 4 à 6 semaines pendant la saison de croissance. La dégradation est plus rapide lorsque la température du sol est élevée et/ou le pH du sol plus faible.

Particularités : Malgré une dégradation modérément rapide, d'infimes quantités de résidus dans le sol peuvent être hautement toxiques pour certaines dicotylédones comme la carotte sauvage, et ce, jusqu'à 2 ans après l'application. Il faut ajouter un surfactant à la bouillie.

CHLORTHAL-DIMÉTHYL

Nom commercial : DACTHAL W-75.

Groupe chimique : Phthalates.

Homologations : Brocoli, choux de Bruxelles, chou, chou-fleur, haricots secs et mange-tout, aubergine, plantes ornementales établies, ail, gazon, oignon, poivron, pomme de terre, melon ensemencé, soya, fraisier, patate douce, tomate, plantes ligneuses de pépinière.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles en germination et certaines dicotylédones annuelles dont chénopode blanc, pourpier potager, stellaire, amarante à racine rouge, mollugine verticillée et coqueret hétérophylle.

Absorption et diffusion : Absorption par les racines, mais non par le feuillage. Diffusion inexistante dans la plante.

Base de sélectivité : Inhibe la croissance des graines en germination par un mécanisme encore inconnu.

Modes d'application : Doit être appliqué avant la germination des graines de mauvaises herbes. Selon la culture, le traitement peut se faire par incorporation en présemis, en prélevée, en postlevée ou après le repiquage de la culture. Au moins 1 cm d'eau de pluie ou d'irrigation est nécessaire pour activer l'herbicide. Dans les pelouses, le traitement peut se faire au printemps ou à l'automne.

Rémanence : La demi-vie moyenne est de 100 jours dans la plupart des principaux types de sol. Selon la dose et le type de sol, assure un désherbage efficace pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois.

Particularités : Peut être appliqué sur la partie aérienne de la plupart des végétaux sans effets phytotoxiques. Peu efficace contre abutilon, herbe à poux, moutarde des champs, stramoine commune, galinsoga, renouée, souchet et lampourde glouteron. Les champs de gazon établi (sauf ceux d'agrostide) affichent une bonne tolérance au produit. Le gazon ne doit pas être ressemé pendant les 60 jours qui suivent le traitement. N'utiliser que sur des sols minéraux.

CLÉTHODIME

Nom commercial : SELECT.

Groupe chimique : Cyclohexanédiones.

Homologations : Canola, lin, un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles (voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des

détails sur les usages homologués), soya, tournesol, oignons de garde et pommes de terre.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles (folle avoine, sétaire verte et sétaire glauque, céréales spontanées, maïs spontané et échinochloa pied-de-coq).

Absorption et diffusion : Absorption par le feuillage, et diffusion par le phloème et le xylème dans toute la plante, avec accumulation dans les méristèmes tant aériens que souterrains.

Base de sélectivité : Les plantes tolérantes transforment rapidement le cléthodime en plusieurs métabolites conjugués.

Modes d'application : En postlevée sur les graminées qui sont en pleine croissance, au stade 2–6 feuilles vraies.

Rémanence : Dégradation rapide dans l'eau et dans le sol; aucune activité dans le sol.

Particularités : Grande efficacité contre toutes les graminées annuelles et les céréales spontanées, à la dose de seulement 0,19 L/ha, dans une bouillie à laquelle on a ajouté l'adjuvant CC-16255.

CLOMAZONE

Nom commercial : COMMAND 360 ME.

Groupe chimique : Isoxazolidinones.

Homologations : Soya, patate douce.

Mauvaises herbes sensibles : Abutilon, chénopode blanc, renouée persicaire, morelle noire de l'Est, échinochloa pied-de-coq, sétaire verte, sétaire glauque.

Absorption et diffusion : Absorbé surtout par les racines, se diffuse par le xylème.

Base de sélectivité : Métabolisé par le soya.

Modes d'application : En prélevée.

Rémanence : Lorsqu'il est appliqué aux doses recommandées, COMMAND 360 ME tient les mauvaises herbes en échec pendant toute la saison. Il est relativement immobile dans le sol et se dissipe essentiellement par décomposition microbienne. Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; pour des précisions, voir les tableaux 4–4 et 4–5, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67 et 70. La texture du sol influence l'efficacité du produit et sa rémanence; consulter l'étiquette du produit pour connaître les doses à utiliser.

Particularités : Inhibe la biosynthèse des caroténoïdes, ce qui cause le blanchiment des plantes sensibles dans la zone traitée.

CLOPYRALIDE

Noms commerciaux : LONTREL 360, TRANSLINE.

Groupe chimique : Pyridines.

Homologations : Fraisiers, bleuetiers en corymbe, pommiers nouvellement plantés et fructifères, canneberges, betteraves à sucre, rutabagas, crucifères (chou, chou-fleur, brocoli, crucifères asiatiques), canola, orge, avoine, blé, maîtrise des dicotylédones dans les servitudes (réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications, de chemin de fer, de pipelines) et les postes de ces réseaux, les sites de fabrication industrielle, les sites d'entreposage et les bords de routes, aéroports, bases militaires et étendues de gazon grossier de faible entretien. Terrains de parcours, pâturages de graminées et peuplements ou plantations de sapins baumiers destinés au marché des arbres de Noël.

Mauvaises herbes sensibles : Tue certaines mauvaises herbes annuelles et vivaces ou en arrête la croissance : chardon des champs, verge d'or, marguerite blanche, vesce jargeau, petite oseille, pissenlit, renouée liseron, matricaire inodore, séneçon vulgaire, herbe à poux, tussilage, centaurée maculée.

Absorption et diffusion : Absorption rapide par le feuillage. La diffusion s'effectue rapidement dans la plante à la fois par le xylème et le phloème. Le clopyralide se diffuse dans toute la plante jusqu'aux tissus méristématiques.

Base de sélectivité : Le métabolisme de l'acide nucléique et la croissance des graminées et des autres espèces tolérantes ne semblent pas affectés.

Modes d'application : En postlevée, comme pulvérisation généralisée ou foliaire sélective.

Rémanence : La demi-vie dans le sol est inférieure à 30 jours sous des conditions qui sont favorables à la dégradation microbienne. Rémanence de légère à inexistante.

Particularités : Le clopyralide a peu sinon pas d'effets sur les plantes ligneuses, sauf celles de la famille des légumineuses.

CLORANSULAM-MÉTHYL

Nom commercial : FIRSTRATE.

Groupe chimique : Triazolopyrimidine sulfonanilide.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Petite herbe à poux, grande herbe à poux, lampourde glouteron, abutilon et stramoine commune.

Absorption et diffusion : Absorption par les racines, les pousses et le feuillage. Transport dans le xylème et le phloème et accumulation aux points végétatifs.

Base de sélectivité : Métabolisé par le soya. L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance.

Modes d'application : En prélevée à la fois dans des systèmes traditionnels de travail du sol et dans des systèmes de conservation du sol ou en postlevée avant le stade de la floraison du soya.

Rémanence : La décomposition dans le sol est attribuable essentiellement à la dégradation microbienne. Certaines restrictions s'appliquent à la rotation des cultures. Pour plus d'information, voir les tableaux 4–4 et 4–5, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, pp. 67 et 70.

Particularités : Ne pas appliquer sur des sols tourbeux ou de la terre noire. Pour les traitements de prélevée ou de postlevée, une pluie humectant le sol jusqu'à une profondeur d'au moins 5 cm est nécessaire pour activer FIRSTRATE et le faire migrer dans la zone de germination des mauvaises herbes. À défaut d'une pluie suffisante dans les 7 à 10 jours suivant

le traitement, un léger travail du sol ou le passage d'une houe rotative est recommandé. Ne pas traiter lorsque la température de l'air frôle le point de congélation ou si l'on prévoit du gel dans les jours qui suivent le traitement. Des périodes prolongées de temps froid et humide ou des conditions de sol anormalement humides pendant la levée et les premiers stades de croissance de la culture peuvent amener l'apparition des symptômes suivants sur le soya : jaunissement temporaire des feuilles et/ou rabougrissement de la culture. Le soya se remet rapidement de ces symptômes après le rétablissement de conditions de croissance normales. Les traitements de postlevée effectués avant que la première feuille trifoliée soit entièrement déployée peuvent causer le jaunissement temporaire du soya. Cet effet est temporaire et sans répercussions sur le rendement du soya. Pour les traitements de postlevée, ajouter un surfactant non ionique (AGRAL 90) et une solution fertilisante liquide à base d'ammonium (28-0-0 ou 32-0-0). Voir l'étiquette pour plus de détails.

DAZOMET

Nom commercial : BASAMID.

Groupe chimique : Dithiocarbamates.

Homologations : Planches d'aubergine, de laitue, de poivron et de tomate, de plein champ et en serre; traitement automnal seulement sur les planches de tabac en serre; planches de fleurs annuelles, de plein champ et en serre, semis ou repiquage; lit de semence pour gazon.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des mauvaises herbes en germination.

Absorption et diffusion : Au contact de l'humidité du sol, le dazomet se décompose et les gaz toxiques qu'il libère détruisent les mauvaises herbes.

Base de sélectivité : Non sélectif. Le produit chimique doit avoir complètement disparu de la couche de semis avant la mise en culture, sous peine de dommages. Se dégrade par contact avec l'humidité du sol et libère des gaz toxiques qui tuent les graines de mauvaises herbes en germination.

Modes d'application : Appliquer le produit granulaire sur un lit de semence bien travaillé et incorporer uniformément. Immédiatement après l'incorporation, rendre le sol étanche en le roulant et en l'inondant ou en le recouvrant d'une épaisse membrane de plastique dont on plaque soigneusement les bords. Après une période de 10 à 40 jours, selon la température du sol, aérer celui-ci. Pour plus de sûreté, faire un test de germination avant de cultiver la zone traitée. Ne pas cultiver lorsque la température du sol est inférieure à 6 °C.

Rémanence : Variable selon la dose utilisée, l'humidité et la température du sol. Les gaz sont toxiques pour toutes les plantes en croissance et un test de germination doit être fait afin de déterminer si l'on peut mettre le sol en culture.

Particularités : Tue aussi les nématodes non enkystés et les champignons du sol.

DESMÉDIPHAME/PHENMÉDIPHAME

Nom commercial : BETAMIX.

Groupe chimique : Phénylcarbamates.

Homologations : Betterave à sucre.

Mauvaises herbes sensibles : Espèces d'amarante, chénopode blanc, moutarde des champs, renouée liseron, sétaires verte et glauque. D'autres mauvaises herbes comme les espèces d'herbe à poux, les espèces de morelle, le kochia à balais, l'ansérine et le tabouret des champs sont maîtrisées lorsque l'application de desmédiphame/phenmédiphame suit un autre traitement à l'aide d'un herbicide de présemis ou de prélevée.

Absorption et diffusion : Le desmédiphame/phenmédiphame est facilement absorbé par le feuillage où il inhibe la photosynthèse dans les chloroplastes des cellules de la feuille.

Base de sélectivité : Métabolisé rapidement chez les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée, à partir du stade 2 feuilles vraies de la betterave à sucre, jusqu'au stade 2–4 feuilles des mauvaises herbes, selon l'espèce. L'efficacité est maximale lorsque les mauvaises herbes sont très petites et en croissance active.

Rémanence : La demi-vie du desmédiphame dans le sol est inférieure à 1 mois et celle du phenmédiphame est de 25–30 jours.

Particularités : Le desmédiphame/phenmédiphame peut causer un retard de croissance temporaire et/ou la chlorose ou la brûlure de la pointe des feuilles de la betterave à sucre lorsqu'on l'applique sur des plants soumis à un stress. La croissance normale reprend 10 jours après le traitement.

DICAMBA

Noms commerciaux : BANVEL II, ORACLE, VANQUISH.

Groupe chimique : Acides benzoïques.

Homologations : Maïs de grande culture, blé de printemps et d'automne, orge de printemps, seigle de printemps, avoine, jachère d'été et chaumes, pâturage, fétuque rouge, bleuetiers nains et pelouses; endroits non cultivés comme le bord des routes, les servitudes et les voies ferrées.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles, vivaces et bisannuelles et plusieurs espèces arbustives dont les conifères. Efficace contre l'abutilon, le chardon des champs, le liseron des champs et plusieurs dicotylédones résistantes aux triazines. Le traitement donne les meilleurs résultats lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active.

Absorption et diffusion : Absorption rapide par les racines, les tiges ou les feuilles, puis diffusion vers les autres parties de la plante.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En prélevée ou en postlevée sur le maïs-grain. Pour toutes les autres cultures et les endroits non cultivés, le désherbage de postlevée est recommandé.

Rémanence : La demi-vie dans le sol est d'environ 30 jours. Aux doses recommandées pour les cultures, le traitement ne laisse pas de résidus l'année suivante.

Particularités : Le dicamba est souvent mélangé à des anti-graminées ou à des herbicides phénoxy pour lutter contre une gamme plus large de mauvaises herbes. La dérive de dicamba est aussi toxique pour les plantes sensibles que celle de 2,4-D; des précautions similaires doivent donc être prises. Des conditions météorologiques froides et/ou de fortes pluies après un traitement au dicamba peuvent causer des dommages temporaires au maïs, particulièrement aux hybrides hâtifs cultivés dans la région est de l'Ontario. Il y a aussi possibilité de dérive des vapeurs de dicamba à partir du feuillage par température supérieure à 25 °C. À fortes doses, le dicamba peut être toxique pour les arbres et arbustes dont les racines s'étendent sous la superficie traitée.

DICAMBA/ATRAZINE

Nom commercial : MARKSMAN, PROPERO.

Groupe chimique : Acide benzoïque/s-triazine.

Homologations : Maïs-grain.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles et bisannuelles, y compris les biotypes résistant aux triazines.

Modes d'application : En postlevée, jusqu'à ce que le plant de maïs ait atteint 13 cm (stade 5 feuilles).

Particularités : Dans le maïs, assure une maîtrise des dicotylédones pendant toute la saison. Est excellent contre les dicotylédones résistantes aux triazines et est particulièrement efficace contre l'abutilon et autres annuelles à racines profondes qui germent tardivement.

DICAMBA/MCPA

Nom commercial : DYVEL.

Groupe chimique : Acide benzoïque/phénoxy.

Homologations : Orge, blé de printemps, blé d'automne et avoine.

Particularités : Plus efficace contre les moutardes et l'ortie royale que le dicamba seul. Voir aussi les notes sur le DICAMBA et le MCPA.

DICAMBA/MCPA/MÉCOPROP-P

Noms commerciaux : SWORD, TARGET, TRACKER XP.

Groupe chimique : Acide benzoïque/phénoxy/phénoxy.

Homologations : Blé de printemps, orge, avoine (non contre-ensemencés de légumineuses), chaumes et jachère.

Mauvaises herbes sensibles : Aux doses recommandées pour les grandes cultures : renouée liseron, saponaire des vaches, renouée persicaire, renouée scabre, moutardes, sisymbres, vélars, ortie royale, soude roulante, spargoute des champs, sagesse, laiteron potager, bourse-à-pasteur, petite herbe à poux, amarantes, stellaire, chénopode blanc, renouée, repousses de colza et de tournesol.

Modes d'application : En postlevée, lorsque les plantules de mauvaises herbes sont au stade 2–3 feuilles, le blé de printemps et l'avoine au stade 4–5 feuilles, et l'orge au stade 2–3 feuilles. Diluer dans l'eau et appliquer à raison de 100 L de bouillie à l'hectare.

Particularités : Ce mélange détruit une gamme plus large de mauvaises herbes que n'importe lequel des herbicides qui le composent utilisé seul. Dans certaines conditions, ce mélange peut causer un raccourcissement de la paille des céréales, mais le rendement n'en est pas affecté. Voir aussi les notes relatives au DICAMBA, au MÉCOPROP-P et au MCPA.

DICHLOBÉNIL

Nom commercial : CASORON 4G.

Groupe chimique : Benzonitriles.

Homologations : Canneberges, arbres fruitiers, vignes, bleuetiers en corymbe (géants), framboisiers, plantes ligneuses de pépinière, brise-vent et endroits non cultivés.

Mauvaises herbes sensibles : Le dichlobénil détruit la plupart des mauvaises herbes, ou en empêche le développement, notamment les vivaces, la vesce et la prêle.

Absorption et diffusion : Absorption radiculaire et diffusion rapide vers le haut de la plante.

Base de sélectivité : La sélectivité est basée sur la séparation physique entre la couche de vapeur de dichlobénil dans les 5 premiers cm de sol et les racines de la culture établie qui se trouvent au-dessous de ce niveau.

Modes d'application : Appliquer avant la levée des mauvaises herbes, de préférence à l'automne ou au début du printemps.

Rémanence : Le désherbage peut durer de 2 à 6 mois; l'application des doses supérieures pendant plusieurs années peut causer une accumulation de résidus dans le sol qui persisteront plus d'une année.

Particularités : Bien qu'appliqué sous forme granulaire, il tue les mauvaises herbes par les vapeurs qu'il dégage dans la couche arable du sol. Les racines des mauvaises herbes absorbent l'herbicide à mesure qu'elles pénètrent cette couche toxique. Ne pas traiter durant des périodes de température élevée du sol, car le dichlobénil se volatilise et perd de son efficacité.

DICHLORPROP/2,4-D

Noms commerciaux : DESORMONE, DICHLORPROP D, DIPHENOPROP BK 700, ESTAPROP PLUS, TURBOPROP.

Groupe chimique : Phénoxy/phénoxy.

Homologations : Blé de printemps et d'automne, orge; lutte contre les mauvaises herbes vivaces et les broussailles dans les zones incultes.

Particularités : La majorité des propriétés du dichlorprop sont très similaires à celles du 2,4-D. La stellaire, la renouée liseron, la renouée scabre, et quelques espèces ligneuses sont plus sensibles au dichlorprop/2,4-D qu'au 2,4-D seul. Ne pas utiliser sur l'avoine. Voir aussi les notes sur le 2,4-D.

DIFLUFENZOPYR/DICAMBA

Nom commercial : DISTINCT.

Groupe chimique : Semicarbazone/acide benzoïque.

Homologation : Maïs de grande culture (maïs à ensilage et maïs-grain).

Mauvaises herbes sensibles : Amarante à racine rouge, petite herbe à poux, chénopode blanc, renouée liseron, renouée persicaire et abutilon. Maîtrise la morelle de Caroline et la prêle lorsque mélangé en cuve avec du nicosulfuron/rimsulfuron. Efficacité optimale quand les mauvaises herbes sont en croissance active.

Absorption et diffusion : Le produit est absorbé rapidement par les racines, les tiges ou les feuilles, puis diffusé aux autres parties de la plante.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Peu après la levée jusqu'au stade 6 feuilles du maïs.

Rémanence : Demi-vie d'environ 30 jours dans le sol. Pour minimiser les résidus dans le sol l'année suivant l'application, ne pas dépasser les doses recommandées.

Particularités : Ce produit se caractérise par une fenêtre d'application plus étendue, une dose plus faible et une plus grande efficacité contre les vivaces que le dicamba employé seul. Comme le brouillard de pulvérisation est toxique pour les plantes sensibles, comme l'est le 2,4-D, les mêmes précautions s'appliquent. Le diflufenzopyr, inhibiteur de transport de l'auxine, sera également actif avec d'autres herbicides hormonaux comme le 2,4-D et la clopyralide et peut causer des dommages à la culture si on le mélange en cuve. Ne pas utiliser d'additifs comme des huiles, des surfactants ioniques, des agents mouillants, des adhésifs, etc. Ne pas appliquer quand il risque d'y avoir une baisse de température importante durant la nuit. Ne pas pulvériser quand on s'attend à ce que les températures dépassent 27 °C. Ne pas pulvériser en présence d'une forte humidité ou de brouillard. Ne pas appliquer en prélevée sur des sols sableux ou des loams sableux. Attendre au moins 7 jours après le traitement avant de travailler ou de sarcler la zone traitée. Il est recommandé d'ajouter un surfactant non ionique à raison de 0,25 % v/v et un engrais azoté liquide 28-0-0 à raison de 1,25 % si le traitement se fait en postlevée.

DIMÉTHÉNAMIDE-P

Nom commercial : FRONTIER MAX.

Groupe chimique : Chloroacétamide.

Homologations : Maïs (de grande culture, de semence et sucré), haricots secs (rognons, otebo et blancs), arachides, soya, choux repiqués, oignons de garde et vignes non productrices.

Mauvaises herbes sensibles : Sétaires verte et glauque, échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, panic capillaire, digitaires sanguine et astringente, amarante à racine rouge, morelle noire de l'Est et acnide tuberculée. Un traitement par incorporation en présemis est efficace contre le souchet comestible.

Absorption et diffusion : Absorption par les pousses et les racines des dicotylédones et des graminées en germination, mais essentiellement par le coléoptile.

Base de sélectivité : Non établie.

Modes d'application : 1) Incorporation en présemis — incorporer avec vibroculteur, herse ou autre instrument assurant une incorporation superficielle uniforme, soit dans 5 cm de sol dans les 7 jours qui suivent les semis; 2) En prélevée — une averse est nécessaire dans les 10 jours suivant le traitement afin d'activer suffisamment l'herbicide; 3) peu de temps après la levée (maïs seulement) — appliquer lorsque le maïs est entre le stade coléoptile et le stade 3 feuilles et avant que les graminées annuelles ne dépassent le stade 2 feuilles.

Rémanence : Maîtrise les mauvaises herbes pendant toute la saison. La durée de rémanence dépend des facteurs de sol et d'humidité, de la dose et du moment du traitement. De fortes pluies après un traitement incorporé au sol peuvent en réduire l'efficacité.

Particularités : Aucune restriction pour l'établissement de la même culture l'automne ou le printemps suivant un traitement printanier dans du maïs ou du soya. Souplesse de traitement; il existe de nombreuses possibilités de mélange en cuve et de traitement échelonné pour une action à large spectre contre les mauvaises herbes dans les cultures de maïs et de soya quelle que soit la méthode de travail du sol : du semis direct au labour traditionnel. Se mélange bien avec des fertilisants secs et liquides en vrac.

DIQUAT

Noms commerciaux : DÉFANANT REGLONE.

Groupe chimique : Dipyridyles.

Homologations : Dessiccation du canola (colza), lin, haricots secs, pois secs, moutarde, tournesol, soya, haricots adzuki, légumineuses de semence. Défanage des pommes de terre. Lutte contre la spargoute des champs dans l'avoine. Désherbage entre les rangs et sur sol rassis.

Mauvaises herbes sensibles : Tout feuillage touché par le diquat meurt.

Absorption et diffusion : Absorption rapide par le feuillage, diffusion restreinte.

Base de sélectivité : Aucune.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Essentiellement aucune à cause de l'absorption du produit chimique sur les particules de sol.

Particularités : Il faut préparer la bouillie avec de l'eau très propre (non turbide), car les particules de sol d'une eau vaseuse réduisent fortement l'efficacité du diquat. Les conditions optimales pour un bon traitement par aéronef sont les suivantes : température modérée (inférieure à 25 °C), humidité supérieure à 40 % et vent de 3,6 à 10 km/h. Ne pas traiter quand l'air est immobile ou s'il y a risque d'inversion de la température (par ex. le matin ou le soir quand l'air chaud s'élève de la culture). Pour empêcher le brouillard herbicide de dériver, pulvériser à une pression de 140 à 210 kPa, à l'aide de buses à jet plat

ou à jet en cône creux, tournées vers l'arrière selon un angle de 130 à 180°. Pour en savoir plus sur les traitements aériens, voir l'étiquette du produit.

DIQUAT (AQUATIQUE)

Nom commercial : REWARD.

Groupe chimique : Dipyridyles.

Homologations : Lutte contre les mauvaises herbes aquatiques dans l'eau calme ou l'eau courante, mares, fossés, lacs et canaux.

Mauvaises herbes sensibles : Cornifle nageant, élodée du Canada, potamots, myriophylles et lenticule.

Absorption et diffusion : Dessiccant de contact avec diffusion limitée.

Base de sélectivité : Aucune.

Modes d'application : En postlevée. Traiter lorsque les mauvaises herbes sont visibles et en croissance active, soit à l'aide d'une pompe à écoper qui injectera le produit sous la surface de l'eau; soit en le pulvérisant à la surface de l'eau; ou en le déversant directement du contenant sur la surface de l'eau.

Rémanence : Le diquat est rapidement inactivé par absorption sur les particules du sol.

Particularités : Préparer la bouillie avec de l'eau limpide et appliquer sur une eau également claire car les particules de sol d'une eau vaseuse réduisent fortement l'efficacité du produit. Ne pas consommer l'eau traitée ni la faire boire aux animaux, ni même l'utiliser pour la baignade pendant au moins 24 heures. Ne pas utiliser cette eau pour l'irrigation pendant au moins 5 jours. Pour empêcher les poissons de mourir par manque d'oxygène, ne traiter que le 1/4 à 1/3 de la superficie totale à la fois. Éviter toute application ou dérive sur cultures, pelouses, pâturages, plantes ornementales et toute autre plante que l'on veut conserver.

DITHIOPYR

Nom commercial : DIMENSION.

Groupe chimique : Pyridines.

Homologations : Gazon.

Mauvaises herbes sensibles : Digitaire.

Absorption et diffusion : Absorption par les pousses et les racines. Diffusion limitée.

Base de sélectivité : Différences d'absorption, de diffusion et de métabolisme entre les jeunes plantules sensibles et les plantes établies.

Modes d'application : Avant la levée ou peu après la levée de la digitaire, jusqu'au stade 3 feuilles.

Rémanence : L'effet désherbant peut persister pendant trois mois.

Particularités : Le désherbage effectué peu de temps après la levée permet d'éliminer les plants de digitaire levée et empêche la germination de nouveaux plants.

DIURON

Noms commerciaux : KARMEX, DIUREX 80WDG.

Groupe chimique : Urées substituées.

Homologations : Vignes, asperges, glaïculs, sites industriels, servitudes.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles et vivaces, amarante, herbe à poux, carotte sauvage et pissenlit. Aux doses supérieures, destruction des vivaces dans les endroits non cultivés.

Absorption et diffusion : Absorption rapide par les feuilles, mais surtout par les racines. Diffusion vers le haut dans le xylème.

Base de sélectivité : Le diuron doit être utilisé seulement sur les cultures à racines profondes bien établies.

Modes d'application : En prélevée sur les cultures ou en traitement dirigé peu après la levée, de préférence avant que les mauvaises herbes ne soient trop denses. L'ajout d'un bon surfactant permet de mieux détruire les mauvaises herbes déjà levées. Dans les zones incultes, le diuron peut être pulvérisé à n'importe quel moment, sauf lorsque le sol est gelé.

Rémanence : Aux doses inférieures recommandées sur les cultures, les résidus persistent environ un an. Le désherbage au diuron peut donc être répété annuellement. Aux doses utilisées sur les sols non cultivés, les résidus peuvent persister plus d'une année.

Particularités : Ne pas utiliser dans les endroits où le diuron risque d'être entraîné, par lessivage ou ruissellement, vers les racines des arbres et arbustes qu'on désire conserver.

EPTC

Nom commercial : EPTAM.

Groupe chimique : Thiocarbamates.

Homologations : Luzerne, lotier, lin, pommes de terre, tournesol et fleurs annuelles. EPTAM est homologué pour une utilisation sur un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles; voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles : digitaire, échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, folle avoine, sétaire verte et sétaire glauque; souchet comestible; quelques dicotylédones annuelles : spargoute des champs, chénopode blanc, morelle, amarante et stellaire, lorsque les conditions sont favorables à la germination et à la croissance.

Absorption et diffusion : Absorption par les parties souterraines de la plante (racines, hypocotyle et graine). Transport vers le haut jusqu'au point de croissance.

Base de sélectivité : L'EPTC est métabolisé par les espèces tolérantes, lors de la germination, grâce aux enzymes qui décomposent l'herbicide. Les réserves alimentaires de la graine permettent aussi à la plantule de surmonter l'effet chimique de l'herbicide.

Modes d'application : En présemis ou en postsemis, avec incorporation. Peut être épandu dilué dans l'eau ou des engrais liquides. Pour prévenir les pertes de produit et d'effet désherbant, l'EPTC doit

être uniformément incorporé dans le sol. Régler le matériel d'incorporation (c.-à-d. pulvériseur tandem, cultivateur léger à pattes d'oie ou vibroculteur), jumelé à une lame niveleuse, de manière à travailler le sol sur environ 10 cm de profondeur. On peut aussi irriguer (environ 0,6 cm) pour incorporer le produit. Lorsque l'application et l'incorporation sont faites en deux opérations séparées, l'application devrait se faire sur un sol sec en surface.

Rémanence : Appliqué en présemis printanier, l'EPTC assure le désherbage pour toute la saison sans laisser l'année suivante de résidus susceptibles d'empêcher la rotation des cultures.

Particularités : L'EPTC n'a pas besoin de pluie pour être activé et est peu lessivé par de fortes pluies. En conditions défavorables de germination, on risque parfois d'observer un froissement et un enroulement des feuilles sur certaines cultures, habituellement sans effet sur le rendement. Peut être mélangé en cuve avec la métribuzine pour mieux lutter contre les dicotylédones dans les pommes de terre. Peut être mélangé en cuve avec la trifluraline pour mieux lutter contre les dicotylédones dans les cultures de haricots (blancs, mange-tout, rognons). Voir l'étiquette pour connaître les autres mélanges en cuve possibles et les modes d'application moins conventionnels.

ÉTHAMETSULFURON-MÉTHYL

Nom commercial : MUSTER.

Groupe chimique : Sulfonylurées.

Homologations : Canola de printemps.

Mauvaises herbes sensibles : Moutarde des champs.

Absorption et diffusion : En traitement foliaire, cet herbicide est rapidement absorbé et transporté tant par le xylème que par le phloème.

Base de sélectivité : Chez les plantes sensibles, l'inhibition de l'acétolactate synthase met fin rapidement à la division et à la croissance cellulaire. Les espèces tolérantes transforment rapidement l'éthametsulfuron-méthyl en métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Dégradation rapide par les microbes du sol.

Particularités : Il est nécessaire d'ajouter un surfactant non ionique à la bouillie. Les symptômes typiques de dépérissement (enroulement, crispation des feuilles et chlorose) se manifestent chez les plantes au bout de 5 à 10 jours, suivant les conditions de milieu.

ÉTHOFUMÉSATE

Nom commercial : NORTRON.

Homologation : Betterave à sucre.

Mauvaises herbes sensibles : Stellaire, chénopode blanc, kochia à balais, amarante à racine rouge, soude roulante, renouée liseron, échinochloa pied-de-coq, digitaire sanguine, sétaires et brome des toits.

Absorption et diffusion : Facilement absorbé par les racines et les tiges émergeantes (coléoptile des graminées et hypocotyle des dicotylédones). Se diffuse facilement dans le feuillage. Les traitements de postlevée à l'éthofumésate sont mal absorbés par les feuilles à maturité ayant une cuticule bien développée.

Base de sélectivité : Les espèces tolérantes conjuguent l'herbicide et le rendent inefficace.

Mode d'application : En présemis avec incorporation ou en prélevée.

Rémanence : La demi-vie varie de moins de 5 à plus de 14 semaines, selon la température du sol et les conditions d'humidité. La demi-vie est plus longue dans les sols plus frais et plus secs.

FARINE DE GLUTEN DE MAÏS

Nom commercial : TURFMAIZE.

Groupe chimique : TURFMAIZE n'est pas un produit chimique.

Homologations : Pâturin des prés établi.

Mauvaises herbes sensibles : Inhibe la germination de la digitaire astringente et du pissenlit.

Absorption et diffusion : Donnée non disponible.

Mode d'application : Appliquer, au printemps, à la fin de l'été ou à l'automne, avant la germination de la digitaire astringente et du pissenlit, sur une pelouse de pâturin des prés établie.

FÉNOXAPROP-P-ÉTHYL

Noms commerciaux : EXCEL SUPER, ACCLAIM SUPER.

Groupe chimique : Aryloxyphénoxypropionates.

Homologations : EXCEL SUPER — Asperge, brocoli, chou, chou-fleur, carotte, pois de grande culture et de conserverie, pomme de terre, canola (colza), canola tolérant les triazines, soya, tomate. EXCEL SUPER est homologué pour une utilisation sur un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles; voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués. ACCLAIM SUPER — Gazons et pelouses.

Mauvaises herbes sensibles : Échinochloa pied-de-coq, sétaires verte et glauque, digitaire, panic capillaire, panic millet, panic d'automne, repousses de maïs.

Absorption et diffusion : L'absorption se fait surtout par les feuilles. La diffusion est peu importante.

Base de sélectivité : Différences de métabolisme entre les espèces tolérantes et les espèces sensibles.

Modes d'application : En postlevée, contre les graminées annuelles (EXCEL SUPER — au stade 1–6 feuilles; ACCLAIM SUPER — au stade 1–4 feuilles et 3 talles). Sans effet rémanent. Le traitement donne les meilleurs résultats quand il vise des mauvaises herbes jeunes et en pleine croissance. EXCEL SUPER — Ne pas traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. ACCLAIM SUPER — Ne pas traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 3 heures qui suivent.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : On peut mélanger EXCEL avec BASAGRAN FORTÉ et/ou PINACLE dans la cuve du pulvérisateur pour lutter contre une large gamme de mauvaises herbes annuelles dans le soya et les haricots secs seulement. Quand les graminées annuelles atteignent le stade de sensibilité optimale à EXCEL SUPER, ne pas retarder le traitement même si les dicotylédones n'ont pas encore levé.

FÉNOXAPROP-P-ÉTHYL/PHYTOPROTECTEUR

Nom commercial : PUMA ADVANCE, PUMA[120] SUPER.

Groupe chimique : Aryloxyphénoxypropionates.

Homologations : Blé de printemps.

Mauvaises herbes sensibles : Folle avoine.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée, appliquer sur la folle avoine au stade 1–6 feuilles (plus 3 talles), avant la sortie de la feuille de l'épi du blé de printemps. Pour un maximum de résultats, traiter quand les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : PUMA[120] SUPER peut être mélangé en cuve avec BUCTRIL M pour combattre un vaste éventail de dicotylédones annuelles dans le blé de printemps. Le stade 3–4 feuilles de la culture et des mauvaises herbes est habituellement le moment optimal sur le plan de la tolérance de la culture et de la vulnérabilité des mauvaises herbes. Sous des conditions de stress et/ou sous un couvert de feuillage dense, un traitement plus hâtif procurera une maîtrise accrue des graminées. PUMA[120] SUPER contient un phytoprotecteur qui permet au blé de printemps de métaboliser le fénoxaprop-p-éthyl. Les pulvérisations de produits à base de fénoxaprop-p-éthyl qui (comme EXCEL SUPER) ne contiennent pas ce phytoprotecteur endommagent lourdement le blé de printemps.

FLUAZIFOP-P-BUTYL

Nom commercial : VENTURE L.

Groupe chimique : Aryloxyphénoxypropionates.

Homologations : Lin, canola, soya, betterave à sucre, tournesol, tabac, légumineuses fourragères (luzerne, trèfle rouge, lotier corniculé), chou, brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, oignon, pomme de terre, rutabaga, tomate, bleuetier nain, bleuetier en corymbe, framboisiers, fraisiers; plantes ornementales non herbacées, peupliers, arbustes, arbres; pommiers, abricotiers, cerisiers, canneberges, pêchers, poiriers et pruniers; pépinières de plantes forestières ou ornementales.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles, repousses de maïs, de blé, d'orge et de chiendent commun.

Absorption et diffusion : Absorption principalement foliaire. Diffusion vers les racines et les rhizomes.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée. Appliquer lorsque les graminées sont en pleine croissance, que les graminées annuelles sont au stade 2–5 feuilles et le chiendent commun au stade 3–5 feuilles.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : La préparation du lit de semence fragmente les rhizomes du chiendent commun et améliore sa destruction. Sauf indications contraires sur le mode d'emploi, appliquer les herbicides anti-dicotylédones séparément, au moins 3 jours après le fluazifop-p-butyl. Ne pas travailler le sol durant les 5 jours qui suivent le traitement. Ce dernier est moins efficace si les plantes subissent un stress (manque d'eau, humidité trop élevée, température froide et/ou humidité relative très basse). Une repousse des graminées par tallage est possible si le traitement a lieu dans l'un des cas mentionnés ci-dessus. Puisqu'il n'y a pas de rémanence, une nouvelle vague de mauvaises herbes peut lever après la disparition de la première.

FLUFÉNACET

Nom commercial : DEFINE DF.

Groupe chimique : Oxyacétamides.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Sétaire verte, suppression de la partie aérienne du chénopode blanc et de l'amarante à racine rouge.

Absorption et diffusion : Le flufénacet est absorbé par les pousses (surtout les coléoptiles) et par les racines des graminées et des dicotylédones en germination.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée, du stade coléoptile au stade 3 feuilles du maïs.

Rémanence : Conserve normalement une activité rémanente dans le sol pendant environ 21 jours après le traitement.

Particularités : DEFINE DF est vendu uniquement en emballage combiné avec OPTION 2.25 sous le nom d'OPTION 1.2.3. NE PAS appliquer sur des terres noires ni sur des sols à texture grossière renfermant peu de matière organique.

FLUMETSULAM/S-MÉTOLACHLORE

Noms commerciaux : BROADSTRIKE DUAL MAGNUM.

Groupe chimique : Triazolopyrimidine sulfonanilide/acétanilide.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Chénopode blanc, amarante à racine rouge, morelle noire de l'Est, petite herbe à poux, abutilon, lampourde glouteron, échinochloa pied-de-coq, digitaire (sanguine, astringente), sétaires (verte, glauque, géante), panic d'automne, panic capillaire, souchet.

Absorption et diffusion : Le flumetsulam et le s-métolachlore sont absorbés à la fois par les racines et les pousses des dicotylédones en germination. Le s-métolachlore est absorbé par les graminées en germination surtout au niveau de la pousse juste au-dessus de la graine.

Base de sélectivité : La sélectivité du flumetsulam dans le soya dépend du métabolisme des plantes. La base de sélectivité du s-métolachlore n'est pas établie.

Modes d'application : De surface en présemis, incorporé en présemis ou en prélevée.

Rémanence : Le flumetsulam et le s-métolachlore se dissipent surtout l'effet de la dégradation microbienne. Le traitement tient les graminées et les dicotylédones annuelles en échec pendant toute la saison. Les rotations peuvent comprendre blé d'automne, blé de printemps, orge de printemps, soya, haricots communs (secs, mange-tout), haricots de Lima, pois, maïs de grande culture et maïs de semence.

Particularités : On peut l'appliquer jusqu'à 21 jours avant les semis. Pour que les applications faites à la surface du sol en prélevée aient une efficacité maximale, il faut qu'il pleuve dans les 7 à 10 jours suivant le traitement. Ne pas appliquer sur les sols qui présentent à la fois un pH supérieur à 7,8 et une teneur en matière organique inférieure à 2 %. Ne pas appliquer sur les sols qui renferment plus de 5 % de matière organique. La préparation concentrée en suspension se sépare en deux phases avec le temps. Bien agiter le contenant avant l'emploi.

FLUMIOXAZINE

Noms commerciaux : BROADSTAR, CHATEAU, PAYLOAD, SUREGUARD, VALTERA.

Groupe chimique : Dicarboxamides.

Homologations : Oignon de garde, pomme de terre, cultures de fruits à pépins (pomme et poire), vigne, fraisier, bleuetier en corymbe, cultures de drupes (pêche, cerise, nectarine, prune et abricot), asperge, plantes ligneuses ornementales cultivées en contenants, soya et zones non cultivées.

Mauvaises herbes sensibles : Cardamine hirsute, marchantie polymorphe, amarantes, petite herbe à poux, chénopode blanc, morelle faux-sarracha, morelle noire de l'Est. Supprime la partie aérienne de la sétaire verte, du séneçon vulgaire et de la stellaire moyenne.

Absorption et diffusion : Absorbé principalement par les racines des plants traités à la suite de traitements radiculaires. Le transport dans le phloème est limité en raison de l'assèchement rapide des feuilles causé par l'herbicide.

Modes d'application : Voir l'étiquette pour connaître le moment précis des traitements dans les différentes cultures pour lesquelles le produit est homologué. En général, la flumioxazine doit être appliquée avant la levée des mauvaises herbes.

Rémanence : En général, l'action rémanente contre les dicotylédones dure de 4 à 6 semaines, la durée variant selon la dose, les précipitations et les températures à la suite du traitement.

Particularités : La flumioxazine est un herbicide radiculaire qui a un effet rémanent pour la maîtrise des dicotylédones annuelles et la suppression de la partie aérienne des graminées adventices. Il faut de l'humidité pour une action rémanente efficace. L'efficacité de la flumioxazine peut être réduite si du temps sec suit le traitement. La flumioxazine est sans effet contre les mauvaises herbes déjà levées et risque de ne pas maîtriser celles qui germent après le traitement, mais avant une pluie qui activerait l'herbicide, ou contre les mauvaises herbes qui germent dans les fissures attribuables à la sécheresse du sol. Un travail superficiel du sol risque de nuire à l'efficacité du traitement.

FLUROXYPYR

Nom commercial : TROPHY A.

Groupe chimique : Pyridines.

Homologations : Blé d'automne.

Mauvaises herbes sensibles : Gaillet gratteron, kochia à balais, mauve à feuilles rondes, lin spontané. Suppression de la partie aérienne des stellaire moyenne, ortie royale, érodium cicutaire et renouée liseron.

Modes d'application : En postlevée, entre le stade 3 feuilles et la sortie de la feuille de l'épi du blé d'automne.

Rémanence : La demi-vie est de 11 à 38 jours. Le fluroxypyr n'a qu'une très faible action rémanente.

Particularités : Ce produit a été commercialisé en Ontario dans le but spécifique de combattre le gaillet gratteron dans les cultures de blé d'automne. TROPHY A est un élément de l'emballage combiné vendu sous le nom de TROPHY, l'autre élément étant TROPHY B (MCPA). L'expérience sur le terrain montre que ce produit supprime aussi la partie aérienne de la vesce jargeau, une espèce de plus en plus problématique en Ontario.

FOMÉSAFÈNE

Nom commercial : REFLEX.

Groupe chimique : Éthers diphényliques.

Homologations : Soya et un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles; voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués.

Mauvaises herbes sensibles : Amarante à racine rouge, petite herbe à poux, moutarde des champs, renouée persicaire, morelle noire, lampourde glouteron. Détruit temporairement abutilon, chénopode blanc, acnide tuberculée.

Absorption et diffusion : L'absorption se fait par le feuillage. Diffusion limitée.

Mode d'action : Dislocateur de membrane cellulaire.

Base de sélectivité : Les haricots métabolisent le fomésafène. Les feuilles peuvent bronzer légèrement au départ, mais le plant se remet normalement bien de cette réaction qui n'a aucune répercussion sur la maturité ou le rendement.

Modes d'application : Peu après la levée des mauvaises herbes et de la culture. Appliquer quand les haricots sont au stade 1–2 feuilles trifoliées et les mauvaises herbes au stade 2–4 feuilles. Un bon recouvrement est essentiel si l'on veut un maximum de résultats. Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha à une pression de 245–420 kPa. Toujours ajouter un adjuvant comme AGRAL 90 (0,25 % v./v.) ou

TURBOCHARGE (0,5 % v./v.). PINNACLE ou VENTURE peuvent être mélangés en cuve pour une protection accrue contre les mauvaises herbes.

Rémanence : La persistance dépend des conditions de sol et des conditions météorologiques (persiste plus longtemps quand le temps est sec). L'année suivante, faire la rotation avec du maïs de grande culture, des haricots secs ou du soya. Le blé d'automne peut être semé 90 jours après le traitement. Une épreuve biologique est nécessaire avant toute autre culture.

Particularités : Ne jamais appliquer REFLEX sur un champ plus d'une fois tous les deux ans.

FORAMSULFURON

Noms commerciaux : OPTION 2.25 OD.

Groupe chimique : Sulfonylurée.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Chiendent commun, sétaires verte, glauque et verticillée, panic d'automne, panic millet, échinochloa pied-de-coq, panic capillaire, digitaire sanguine, amarante à racine rouge, chénopode blanc, abutilon, morelle noire de l'Est, stellaire moyenne, moutarde des champs et vélar fausse-giroflée.

Absorption et diffusion : Le foramsulfuron est absorbé rapidement par les feuilles et diffusé rapidement dans tout le plant.

Base de sélectivité : Inhibe l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles. Les espèces tolérantes métabolisent rapidement le foramsulfuron.

Modes d'application : En postlevée, au stade 1 à 8 feuilles du maïs, sur des mauvaises herbes levées de la famille des graminées jusqu'au début du tallage et sur les mauvaises herbes dicotylédones levées.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : L'ajout du phytoprotecteur isoxadifen dans la préparation commerciale maximise la tolérance de la culture, aide la culture à se remettre plus rapidement du traitement sous des conditions environnementales défavorables et permet d'utiliser un système d'adjuvant à base d'huile végétale éthylée ou méthylée.

FORAMSULFURON + FLUFÉNACET

Nom commercial : OPTION 1.2.3. (emballage combiné d'OPTION 2.25 OD + DEFINE DF. Cet emballage combiné doit obligatoirement être mélangé en cuve avec de l'atrazine).

Groupe chimique : Sulfonylurées + oxyacétamides.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles dont chénopode blanc, amarante à racine rouge, petite herbe à poux, abutilon, renouée liseron, renouée persicaire, moutarde des champs, laiteron potager, morelle noire de l'Est, sétaire verte, sétaire glauque, panic capillaire, échinochloa pied-de-coq et panic d'automne. Suppression de la partie aérienne des graminées annuelles dont digitaire sanguine et panic millet.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au foramsulfuron, au flufénacet et à l'atrazine.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Après la levée du maïs (jusqu'au stade 3 feuilles inclusivement), quand les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. Utiliser un minimum de 150 L d'eau/ha et régler la pression à 175–275 kPa.

Rémanence : Le flufénacet conserve normalement sont activité rémanente dans le sol pendant environ 21 jours après le traitement.

Particularités : OPTION 1.2.3. est un emballage combiné d'OPTION 2.25 OD et de l'herbicide DEFINE DF. Bien que vendue séparément, la composante atrazine est un ingrédient nécessaire du mélange en cuve. Ajouter du NAU (28 %) au mélange en cuve, à raison de 1 L/ac (2,5 L/ha). OPTION 1.2.3. procure une excellente maîtrise du panic d'automne pendant toute la saison de croissance.

FOSAMINE D'AMMONIUM

Nom commercial : KRENITE.

Groupe chimique : Carbamoyl phosphonate.

Homologations : Lutte contre les broussailles et les plantes sarmenteuses dans les zones incultes.

Mauvaises herbes sensibles : Ronce, chêne, pin, sumac, érable, sureau, orme, rosier sauvage, noisetier, tremble et hêtre. Le thuya et l'épinette sont assez tolérants.

Absorption et diffusion : Absorption par les jeunes tiges et le feuillage. On a constaté la diffusion, à partir d'une feuille développée traitée, vers toutes les autres parties de la plante, mais la diffusion avec les sucres dans le phloème est prédominante.

Base de sélectivité : Herbicide peu sélectif.

Modes d'application : En postlevée. Traiter à l'aide d'un pulvérisateur à haute pression pour assurer la pénétration de la bouillie qui doit mouiller complètement feuilles, bourgeons, tiges et troncs des espèces visées. L'utilisation de surfactants est recommandée pour permettre une pénétration rapide du produit à l'intérieur des feuilles.

Rémanence : Pratiquement nulle.

Particularités : Les plantes ligneuses traitées avec la fosamine d'ammonium meurent très lentement; les tiges risquent de ne pas être complètement mortes 2 ans après le traitement; cet herbicide ne provoque pas de brunissement inesthétique, contrairement à plusieurs autres herbicides. Une pluie dans les 24 heures suivant l'application peut diminuer l'efficacité.

FUMIGANTS

Voir MÉTAM SODIUM.

GLUFOSINATE AMMONIUM

Noms commerciaux : IGNITE, LIBERTY 200SN.

Groupe chimique : Produit unique.

Homologations : IGNITE — Défanage des haricots secs et des pommes de terre; désherbage (en traitements dirigés) : pommiers, vignes, pêchers, poiriers

et pruniers; (en traitement sur sol rassis) : asperges, carottes, laitues et oignons; (traitement au stade de la percée du sol) : pommes de terre. LIBERTY 200SN – Hybrides de maïs et cultivars de canola spécialement conçus pour tolérer l'herbicide LIBERTY 200SN. Lignées consanguines tolérant le glufosinate ammonium, cultivées pour la production de maïs de semence.

Mauvaises herbes sensibles : Cet herbicide, non sélectif, tue toutes les plantes vertes en pleine croissance; les espèces vivaces survivent parfois.

Absorption et diffusion : L'herbicide est absorbé par le feuillage. La diffusion est minime et dépend de la dose appliquée et de l'espèce visée.

Base de sélectivité : IGNITE — Tous les tissus des végétaux verts sont sensibles, mais l'écorce adulte (non verte) des plantes ligneuses peut subir le traitement sans en souffrir. LIBERTY 200SN — Tous les tissus des végétaux verts sont sensibles, sauf ceux du maïs de grande culture, du maïs de semence et du canola qui sont spécialement conçus pour le tolérer.

Modes d'application : IGNITE — En postlevée; traitement en pleine surface ou traitement dirigé évitant les feuilles ou l'écorce verte des végétaux à sauvegarder. Le défanage ou le désherbage n'est assuré que si la pulvérisation atteint toutes les parties des plantes. LIBERTY 200SN — En postlevée. Peut s'appliquer en pleine surface dans le maïs Liberty Link au stade 1–8 feuilles ou à l'aide de pendillards sur le maïs plus avancé; du stade cotylédon au stade de la floraison dans le soya Liberty Link et du stade cotylédon au début de la montaison dans le canola InVigor.

Rémanence : Nulle; aucune restriction concernant la culture ou la rotation après le traitement.

Particularités : L'effet est plus ou moins rapide selon les conditions; il est moins rapide par temps frais et quand l'humidité ou l'hygrométrie est peu élevée. Une forte rosée au moment de l'application peut réduire l'efficacité du traitement contre certaines espèces de mauvaises herbes.

GLYPHOSATE

Noms commerciaux : CATENA HERBICIDE, CREDIT 45, CREDIT PLUS, EZJECT, FACTOR, FACTOR 540 GLYPHOSATE, FORZA SILVICULTURAL HERBICIDE, GLYFOS, MAVERICK III, RENEGADE, RENEGADE HC, ROUNDUP ULTRA 2, ROUNDUP WEATHERMAX, SHARPSHOOTER, SHARPSHOOTER PLUS, TOUCHDOWN TOTAL, VANTAGE, VANTAGE FORESTRY HERBICIDE, VANTAGE PLUS, VANTAGE PLUS MAX, VANTAGE PLUS MAX II, VISION, VISION MAX.

Groupe chimique : Acides aminés.

Homologations : En présemis ou en postrécolte sans restriction de culture. En pré-récolte sur blé, orge, soya, canola, lin, lentilles, pois et fourrage. Cultures Roundup Ready — voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66. En traitement dirigé sur : ginseng, cerisiers, vignes, pommiers, poiriers, pruniers et pêchers; traitement localisé ou par humectation sur fraisiers. Homologations pour lieux non cultivés : débroussaillement; rénovation de gazon; tonte chimique; traitement dirigé dans les pépinières de végétaux ligneux, sur les bords de route et les brise-vent. E-Z-JECT — lutte sélective contre les broussailles ligneuses et arbustives. CATENA HERBICIDE, FORZA SILVICULTURAL HERBICIDE, VANTAGE FORESTRY HERBICIDE, VISION, VISION MAX — préparation d'une plantation sylvicole, dégagement des plantations de conifères, plantations forestières et pépinières forestières.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles; vivaces (chiendent commun, chardon des champs, laiteron des champs, liseron des champs, asclépiade, quenouilles, souchet, herbe à puce, etc.); broussailles (bouleau, aulne, peuplier, framboisier, saule et érable).

Absorption et diffusion : Absorption foliaire et diffusion dans toute la plante.

Base de sélectivité : Le glyphosate n'épargne pas les cultures agricoles. Les conifères sont tolérants à certains stades, mais la raison n'en a pas été établie.

Modes d'application : En postlevée, habituellement au stade de préfloraison pour la plupart des vivaces. Le chardon des champs devrait se trouver au moins au début du stade bouton floral, l'asclépiade au stade du bouton floral et le liseron au stade pleine floraison. On peut traiter le chiendent commun à l'automne ou au printemps lorsqu'il est en pleine croissance avec au moins 3 ou 4 nouvelles feuilles sur chaque nouvelle pousse levée. À l'automne, ramasser les déchets de culture, mais ne pas labourer avant le traitement; un labour d'automne ou de printemps avant le traitement printanier risque d'en réduire l'effet. Attendre au moins de 3 à 5 jours après le traitement avant de travailler la superficie traitée. Pour obtenir un résultat maximum contre le chiendent commun, il est préférable de labourer avant que celui-ci ne soit complètement bruni. Pour désherber des zones cultivées ou des zones incultes on peut appliquer le glyphosate à l'aide d'un pulvérisateur à rampe, d'un pulvérisateur dorsal ou d'un équipement de grand volume. Les atomiseurs dorsaux peuvent être utilisés seulement pour la préparation d'une plantation sylvicole et le débroussaillement sur le bord des routes. On peut faire des traitements par aéronef seulement pour préparer une plantation sylvicole ou pour dégager autour des conifères. On peut aussi traiter sélectivement à l'aide d'un matériel spécial les endroits non cultivés, les zones arborées, les vignobles et les vergers (voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89 et *Traitement par humectation avec applicateur à corde ou à rouleau*, p. 94). Quelle que soit la méthode employée, éviter que la bouillie entre en contact avec le feuillage vert ou l'écorce verte d'une culture ou de toute autre plante que l'on désire conserver. Avant la pulvérisation,

enlever tous les gourmands des troncs des arbres que l'on désire conserver.

Rémanence : Nulle; on peut mettre en culture les superficies traitées tout de suite après le traitement. D'autres traitements herbicides sont nécessaires contre les mauvaises herbes qui lèveront par la suite.

Particularités : Une pluie dans les 6 heures qui suivent ou une forte gelée dans les 24 heures qui suivent peut réduire l'efficacité des préparations de 356 g/L. Les préparations de 360 g/L résistent à la pluie à partir de 4 heures après le traitement. ROUNDUP ULTRA 2, ROUNDUP WEATHERMAX, FACTOR 540 et TOUCH-DOWN TOTAL résistent à la pluie à partir de seulement 1 heure après le traitement.

GLYPHOSATE/MÉSOTRIONE/ S-MÉTOLACHLORE/BENOXACOR

Nom commercial : HALEX GT.

Groupe chimique : Acides aminés, trikétones et acétanalides.

Homologations : Maïs tolérant le glyphosate (ROUNDUP READY) seulement.

Mauvaises herbes sensibles : Combat les graminées et dicotylédones annuelles levées sensibles au glyphosate et procure une action rémanente contre des graminées et dicotylédones annuelles non encore levées (voir sous Rémanence pour des précisions sur l'action rémanente contre des espèces précises).

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au glyphosate, à la mésotrione et au s-métolachlore/benoxacor respectivement.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au glyphosate, à la mésotrione et au s-métolachlore/benoxacor respectivement.

Modes d'application : En postlevée, entre le stade coléoptile et le stade 6 feuilles du maïs tolérant le glyphosate.

Rémanence : HALEX GT a une action rémanente contre : morelle d'Amérique et morelle noire de l'Est, renouée persicaire, chénopode blanc, amarantes, moutarde des champs, abutilon, échinochloa pied-de-coq, digitaires (astringente et sanguine), panic d'automne, sétaires (verte, glauque et géante) et panic capillaire.

HEXAZINONE

Noms commerciaux : PRONONE, VELPAR.

Groupe chimique : Triazines.

Homologations : Sapins de Noël, reboisement en conifères, sols non cultivés.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des dicotylédones et des graminées herbacées, y compris : framboisier, calamagrostide du Canada, verge d'or et brome; en traitement localisé contre tremble, frêne, érable, cerisier et bouleau.

Absorption et diffusion : Absorption radiculaire et foliaire; diffusion principalement vers le haut par le xylème.

Base de sélectivité : Les espèces tolérantes métabolisent l'hexazinone plus rapidement que les espèces sensibles. En ce qui concerne les conifères, une partie de la sélectivité tient au fait que leurs racines descendent plus profondément dans le sol que les percolats d'hexazinone.

Modes d'application : Pour traiter en pleine surface, épandre en prélevée ou pulvériser sur les feuilles en postlevée lorsque les plantes sont en pleine croissance. En traitement localisé, utiliser un pistolet à cartouche permettant de pulvériser la quantité exacte de VELPAR-L non dilué, le plus près possible du collet des plantes à supprimer; ne pas traiter à moins de 1 mètre des conifères à conserver. Appliquer PROPONE avec un épandeur à granulés approuvé.

Rémanence : On a noté une demi-vie de 2 mois sur un loam limoneux Flanagan en Illinois, une demi-vie de 2 ½ mois sur une argile limoneuse du nord de l'Ontario.

Particularités : Une pluie est nécessaire à l'activation de l'hexazinone dans le sol. Ne pas utiliser sur des sols sableux, graveleux, ou caillouteux ni sur un sol gelé. Ne pas utiliser sur les fortes pentes. Ne pas traiter dans les endroits où les racines des arbres à conserver sont susceptibles de s'étendre. La préparation liquide est inflammable. Il est conseillé d'effectuer un dosage biologique du sol pour déterminer le niveau de résidus lorsqu'on prévoit planter des cultures sensibles après un épandage d'hexazinone.

IMAZAPYR

Nom commercial : ARSENAL.

Groupe chimique : Imidazolinones.

Homologations : Zones sans culture ni pâture telles que zones industrielles, ballast de chemin de fer; traitement localisé des voies ferrées, des autoroutes et des stations de pipelines, ainsi qu'à l'emplacement des puits, des postes d'accumulateurs, des stations de compressions et des postes de robinetterie.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles et vivaces telles que : (annuelles) lupuline, potentille de Norvège, séneçon vulgaire, ortie royale, kochia à balais, chénopode blanc, moutarde sp., amarante sp., matricaire odorante, herbe à poux sp., soude roulante, tabouret des champs, laiteron potager, renouée liseron, pâturin annuel, sétaire sp., panic capillaire; (bisannuelles ou vivaces) silène enflé, chardon vulgaire, bardane, chardon des champs, potentille dressée, trèfle sp., pissenlit, cynanche, liseron des champs, salsifis majeur, verge d'or, euphorbe ésule, asclépiade, céraiste vulgaire, molène sp., marguerite blanche, plantain sp., herbe à puce, petite oseille, linaire, vesce jargeau, carotte sauvage, vigne sauvage, fraisier des champs, brome, pâturin comprimé, fétuque sp., chiendent commun, souchet comestible; (jeunes plantes ligneuses) érable, grand tremble, framboisier et rosier sauvage.

Absorption et diffusion : Absorption radiculaire et foliaire chez les plantes qui y sont sensibles. Transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : Nulle.

Modes d'application : En postlevée sur les mauvaises herbes en croissance active. Pendant l'année qui suit

le traitement, limite aussi la croissance des mauvaises herbes des espèces sensibles non encore levées. À raison de 100 à 550 L d'eau par hectare, appliquer à l'aide de lances ou de dispositifs de pulvérisation dirigée à grand débit et à haute pression ou de pulvérisateurs à rampe ou à buse déportée. Les pulvérisateurs à bas volume de type pulvérisateur dorsal ou autres pulvérisateurs avec dispositif de pompage peuvent aussi servir à traiter directement le feuillage. L'ajout d'un surfactant non ionique à raison de 1 litre par 400 L de bouillie est recommandé pour les volumes supérieurs à 550 L/ha. Au besoin, un adjuvant peut être ajouté à la dose recommandée.

Rémanence : Limite pendant toute la saison la croissance des espèces sensibles.

Particularités : Éviter de contaminer étangs, lacs, cours d'eau, zones humides ou mares vaseuses et ne pas traiter à moins de 15 mètres d'une zone humide ou d'un plan d'eau. Ne pas mélanger ou entreposer dans des contenants ou des réservoirs en acier non protégé (sauf en acier inoxydable). Pour application terrestre seulement. Ne pas utiliser dans les zones où peuvent s'étendre les racines des plantes à conserver (respecter autour des arbres un rayon égal à au moins deux fois la largeur de la ramure à partir du tronc). À utiliser seulement par des entrepreneurs détenteurs de permis.

IMAZÉTHAPYR

Noms commerciaux : CONQUEST B (offert uniquement en emballage combiné de CONQUEST LQ), PURSUIT.

Groupe chimique : Imidazolinones.

Homologations : Soya, un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles (voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués), maïs Clearfield, canola Clearfield, pois de transformation, pois mange-tout et luzerne destinée à la production de semence.

Mauvaises herbes sensibles : En épandage au sol : sétaire verte, sétaire glauque, panic capillaire, échinochloa pied-de-coq, chénopode blanc, amarante à racine rouge, renouée scabre, renouée persicaire, moutarde des champs, abutilon, petite herbe à poux; pour limiter la concurrence de la morelle noire de l'Est et du panic millet. Traitement de postlevée — sétaire verte, sétaire glauque, panic capillaire, échinochloa pied-de-coq, amarante à racine rouge, abutilon, moutarde des champs, lampourde glouteron, morelle noire de l'Est, herbe à poux; pour limiter la concurrence du panic millet, de la digitaire sanguine, du chénopode blanc, de la renouée liseron et du souchet comestible. Traitement de postlevée tardif — sétaires verte et glauque (jusqu'au stade 4 feuilles), échinochloa pied-de-coq (jusqu'au stade 6 feuilles), amarante à racine rouge (jusqu'au stade 12 feuilles), et abutilon (jusqu'au stade 8 feuilles).

Absorption et diffusion : Absorption radiculaire et foliaire. Transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Au plus tard 30 jours avant le semis, en présemis avec incorporation, en prélevée et en postlevée jusqu'au stade 2 feuilles des mauvaises herbes.

Rémanence : La persistance dépend des conditions météorologiques et de l'état du sol (plus longue en conditions de sécheresse). Certaines restrictions visent les cultures de la rotation. Pour plus de renseignements, se référer aux tableaux 4–4 et 4–5, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67 et 70.

Particularités : Peut être appliqué jusqu'à 30 jours avant le semis. Homologué pour utilisation dans un système sans travail du sol ou avec travail minimum. Il est recommandé de pulvériser un mélange en cuve pour lutter contre les infestations sévères d'herbe à poux ou d'échinochloa pied-de-coq. L'application en postlevée nécessite l'addition d'un surfactant tel que AGRAL 90, AG-SURF ou ENHANCE et d'un fertilisant liquide. Une décoloration temporaire du soya et/ou une réduction de la taille peuvent se produire après un traitement de postlevée. Il faut laisser passer 100 jours entre le traitement et le semis du blé d'automne.

IMAZÉTHAPYR + BENTAZONE

Nom commercial : CLEANSWEEP (emballage combiné de PURSUIT + BASAGRAN FORTÉ).

Groupe chimique : Imidazolinone + benzothiadiazine.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Espèces de graminées (échinochloa pied-de-coq, sétaires verte et glauque) et de dicotylédones (lampourde glouteron, ketmie trilobée, renouée persicaire, chénopode blanc, amarante, herbe à poux, bourse-à-pasteur, tabouret des champs, abutilon, moutarde des champs, morelle noire de l'Est) annuelles, y compris les biotypes résistant aux triazines. La concurrence exercée par le souchet comestible, le chardon des champs et le liseron des champs se trouve réduite.

Absorption et diffusion : Herbicide de contact et systémique. Absorption par le feuillage et les racines.

Base de sélectivité : Métabolisé par le soya.

Modes d'application : En postlevée.

Particularités : Ajouter une solution fertilisante liquide à base d'ammonium (du genre NAU) à raison de 2 L/ha. Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation. Voir l'étiquette pour plus de détails. Voir les notes sur l'IMAZÉTHAPYR et le BENTAZONE pour plus d'information sur chacun de ces produits.

IMAZÉTHAPYR + MÉTRIBUZINE

Nom commercial : CONQUEST LQ (emballage combiné de CONQUEST A + CONQUEST B).

Groupe chimique : Imidazolinone + s-triazine.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir l'étiquette pour une liste des espèces maîtrisées.

Modes d'application : En prélevée ou incorporé tôt en présemis.

Particularité : Certaines restrictions s'appliquent aux rotations. Voir l'étiquette pour plus de détails. Voir les notes sur l'imazéthapyr et la métribuzine pour plus d'information sur ces composants.

IMAZÉTHAPYR/PENDIMÉTHALINE

Nom commercial : VALOR.

Groupe chimique : Imidazolinone/dinitroaniline.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles, y compris les biotypes résistant aux triazines. Voir l'étiquette pour une liste des espèces maîtrisées.

Modes d'application : Incorporé en présemis.

Particularités : Certaines restrictions s'appliquent aux rotations. Voir l'étiquette pour plus de détails. Voir les notes sur l'imazéthapyr et la pendiméthaline pour plus d'information sur ces composants.

ISOXAFLUTOLE + ATRAZINE

Nom commercial : CONVERGE XT (emballage combiné de CONVERGE FLEXX + CONVERGE 480), ou mélange en cuve de CONVERGE FLEXX + atrazine 480.

Groupe chimique : Isoxazole + s-triazine.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées et dicotylédones annuelles y compris les biotypes résistant aux triazines et aux inhibiteurs de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) : sétaires verte, glauque et géante, échinochloa pied-de-coq, panic capillaire, digitaires sanguine et astringente, chénopode blanc, amarante, petite herbe à poux, morelle noire de l'Est, abutilon, moutarde des champs, vélar fausse-giroflée, renouée liseron, renouée persicaire, plantules de pissenlit et plantules de plantain.

Absorption et diffusion : Absorption par les racines et les pousses des mauvaises herbes en germination.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes. En prélevée et peu après la levée jusqu'au stade 3 feuilles du maïs. Tient les mauvaises herbes en échec pendant toute la saison. On peut cultiver le blé d'automne 4 mois après le traitement, et le maïs, le soya, les céréales de printemps, la luzerne, le canola de printemps et les pois de transformation, l'année suivante. Les plantules de mauvaises herbes qui émergent avant que l'herbicide ne soit activé par la pluie se trouvent maîtrisées si elles ont moins de 5 cm de hauteur. Ne convient pas aux loams sableux ni aux sols à texture plus fine renfermant au moins 2 % de matière organique.

ISOXABÈNE

Nom commercial : GALLERY.

Groupe chimique : Benzamide.

Homologation : Semis de conifères à racines nue et en contenant.

Mauvaises herbes sensibles : Millepertuis commun, matricaire odorante, chénopode blanc, pourpier potager, bourse-à-pasteur, gnaphale des vases et véronique voyageuse.

Absorption et diffusion : Absorbé par les racines et diffusé vers les pousses des mauvaises herbes en germination.

Base de sélectivité : Sélectivité racinaire.

Modes d'application : Avant la levée des mauvaises herbes dans les conifères, au moins 4 semaines après la germination et la levée de la culture. Il faut une pluie ou une irrigation pour activer l'herbicide.

Rémanence : Efficace pendant toute la saison. Peut nuire à la germination de certaines cultures sensibles la saison suivante.

Particularités : GALLERY est homologué uniquement à des fins d'utilisation par les membres de l'Association canadienne pour le contrôle de la végétation concurrente dans les pépinières forestières.

LINURON

Noms commerciaux : LOROX L.

Groupe chimique : Urées substituées.

Homologations : Maïs, soya, carotte, céleri, aneth, panais, pomme de terre, asperge, blé, avoine, orge, glaïeul, arbres fruitiers.

Mauvaises herbes sensibles : Annuelles : échinochloa pied-de-coq, stellaire, spargoute des champs, digitaire, abutilon, panic d'automne, sétaire, ansérine, éleusine de l'Inde, séneçon vulgaire, renouée, chénopode blanc, amarante à racine rouge, pourpier potager, petite herbe à poux, bourse-à-pasteur, renouée scabre, tabouret des champs, renouée liseron, panic capillaire, vélar fausse-giroflée, mauvaises herbes résistantes aux triazines; au stade plantule, pissenlit, plantain et laiteron potager.

Absorption et diffusion : Le linuron est absorbé aisément par les racines, moins par le feuillage; le transport se fait surtout par le xylème vers le haut.

Base de sélectivité : Différence de métabolisme, souvent associée à une différence d'absorption et de transport.

Modes d'application : En prélevée, en postlevée, application dirigée en postlevée, en pré plus postlevée.

Rémanence : Sans inconvénient pour les cultures suivantes, car les résidus phytotoxiques laissés par les traitements effectués aux doses agricoles disparaissent en moins de 4 mois.

Particularités : Ne pas épandre sur des sols sablonneux ou à texture grossière ayant moins de 2 % de matière organique. Si des pluies anormalement abondantes suivent le traitement, le maïs, le soya, les carottes et les pommes de terre peuvent en souffrir gravement.

MCPA

Noms commerciaux : MCPA ESTER 600, MCPA ESTER 500, MCPA SODIUM 300, MCPA AMINE 500, MCPA AMINE 600, REFINE M (emballage combiné de MCPA + REFINE SG), TROPHY B.

Groupe chimique : Phénoxy.

Homologations : Céréales, pelouse, sols non cultivés.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses dicotylédones, en particulier : renoncule, ortie royale, prêle des champs (partie aérienne seulement), plantules de patience.

Absorption et diffusion : Absorption foliaire ou radiculaire. Migration et accumulation dans les points végétatifs des pousses et des racines.

Base de sélectivité : Des différences d'interception, de pénétration, de transport, de métabolisme et de sensibilité des sites actifs permettent à l'herbicide d'être plus nocif aux dicotylédones qu'aux graminées.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Un traitement au MCPA laisse quelques résidus dans le sol pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois lorsque le sol est humide, et jusqu'à 2 mois lorsqu'il est relativement sec.

Particularités : Le MCPA est vendu sous trois formes chimiques différentes (sel de sodium, amine et ester). Il risque moins de léser l'avoine, le lin et les pois que le 2,4-D. Comme avec le 2,4-D, il y a risque de dérive sur les cultures sensibles avoisinantes comme vigne, navet, tabac et chou.

MCPB/MCPA

Noms commerciaux : CLOVITOX PLUS, TOPSIDE, TROPOTOX PLUS.

Groupe chimique : Phénoxy/phénoxy.

Homologations : Les plantules du trèfle blanc, ladino, alsike ou rouge semé seul ou sous blé, avoine, orge, seigle, pâturages, maïs de grande culture, pois, vigne (pas le TOPSIDE).

Mauvaises herbes sensibles : Au stade plantule, moutardes, tabouret des champs, herbe à poux, chénopode blanc, amarante à racine rouge, bourse-à-pasteur, repousses de colza, radis sauvage, ortie royale, laiteron potager; destruction de la partie aérienne du chardon vulgaire, chardon des champs, patience crépue, plantain, laiteron des champs, liseron des champs, prêle et renoncule.

Absorption et diffusion : Absorption par le feuillage et rapide migration dans la plante, surtout vers les points végétatifs.

Base de sélectivité : Le MCPB n'est pas directement toxique pour les plantes. Les mauvaises herbes sensibles transforment le MCPB en MCPA.

Modes d'application : En postlevée. Dans les céréales, les trèfles et les pois, faire une pulvérisation généralisée. Dans le maïs, traiter à l'aide de pendillards lorsque le maïs a plus de 45 cm, mais avant l'apparition des panicules. Appliquer sur les pâturages après le broutage ou la fenaison.

MÉCOPROP-P

Noms commerciaux : COMPITOX, MECOPROP.

Groupe chimique : Phénoxy.

Homologations : Gazons, céréales.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses dicotylédones dont : stellaire, gaillet gratteron, plantain, trèfle, spargoute des champs, stellaire holostée, lupuline, renouée, bourse-à-pasteur, renoncule, chardon des champs (partie aérienne seulement) et pissenlit. Pour une destruction complète du chardon des champs, du pissenlit et de la lupuline, il faut souvent faire un deuxième traitement.

Absorption et diffusion : Absorption rapide par le feuillage et diffusion dans les racines et les jeunes pousses, surtout vers les points végétatifs.

Base de sélectivité : Des différences d'interception, de pénétration, de transport, de métabolisme et de sensibilité des sites actifs rendent l'herbicide plus nocif pour les dicotylédones que pour les graminées.

Modes d'application : En postlevée. Traiter lorsque les céréales sont entre le stade 3 feuilles et la sortie de la feuille de l'épi. Sur gazons, appliquer lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active.

Rémanence : Peut persister dans le sol jusqu'à 4 semaines. Cependant, il est normalement possible de semer des espèces à gazon 1 à 2 semaines après le traitement.

Particularités : Tue les mauvaises herbes résistantes au 2,4-D : stellaire, trèfles, lupuline et jeune renouée. Ne pas pulvériser sur une céréale contre-ensemencée de légumineuses. Si les céréales subissent un stress au moment du traitement, il peut en résulter des épis déformés et moins garnis. Sans danger pour l'agrostide; des risques de dommages peuvent cependant survenir si la température est supérieure à 27 °C. L'efficacité du traitement est réduite si une pluie survient dans les 4–6 heures qui suivent.

MÉCOPROP-P/2,4-D

Noms commerciaux : IPCO PREMIUM 2–WAY XP TURF HERBICIDE, MECOTURF PLUS 2,4-D, TURF-RITE 2+2.

Groupe chimique : Phénoxy/phénoxy.

Homologations : Gazons.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses dicotylédones dont : stellaire, gaillet gratteron, plantain, trèfle, spargoute des champs, stellaire holostée, lupuline, renouée, bourse-à-pasteur, renoncule, chardon des champs (partie aérienne seulement) et pissenlit.

Absorption et diffusion : Absorption foliaire et radiculaire, diffusion vers les points végétatifs.

Base de sélectivité : Du fait des différences d'interception, de pénétration, de diffusion, de métabolisme, et de sensibilité des sites actifs, les dicotylédones sont plus sensibles au mécoprop/2,4-D que les graminées.

Modes d'application : En postlevée. Traiter quand les mauvaises herbes sont en croissance active.

MÉSOTRIONE

Nom commercial : CALLISTO.

Groupe chimique : Trikétones.

Homologations : Maïs de grande culture, de semence et sucré.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles, y compris les biotypes résistant aux triazines et aux herbicides du groupe 2.

Absorption et diffusion : Facilement absorbée par les pousses, les racines, les tiges et les feuilles, puis diffusée aux autres parties de la plante.

Base de sélectivité : Inhibe l'enzyme HPPD présente dans les cellules photosynthétiques des espèces sensibles. Chez les plantes sensibles, les symptômes se manifestent par le blanchiment, puis la nécrose de la plante. Rapidement métabolisée par les espèces tolérant la mésotrione.

Modes d'application : En prélevée et en postlevée jusqu'au stade 8 feuilles du maïs de grande culture, de semence et sucré. Les traitements de postlevée nécessitent l'ajout d'un surfactant non ionique.

Rémanence : Se dégrade principalement par l'action microbienne du sol. La mésotrione a un effet rémanent contre les dicotylédones annuelles.

Particularités : Le mélange en cuve de mésotrione et d'atrazine produit une synergie qui renforce l'efficacité contre les espèces de dicotylédones. La mésotrione peut être mélangée en cuve avec un anti-graminées radiculaire ou de postlevée pour un traitement en un seul passage. La mésotrione est peu volatile et présente un risque réduit pour les cultures sensibles avoisinantes.

MÉTAM SODIUM

Nom commercial : VAPAM.

Groupe chimique : Thiocarbamates.

Homologations : Planches de semis, plein champ et serre. Terrains destinés à la plantation d'arbres fruitiers, de légumes, de tabac, de plants de pépinière ornementaux et forestiers.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des graines scarifiées de mauvaises herbes et les organes végétatifs charnus, y compris les rhizomes et les plantules en germination.

Base de sélectivité : La plupart des parties de la plante sont sensibles. Attendre pour mettre en culture que tout le gaz fumigant soit éliminé du sol. Au contact de l'humidité, l'isothiocyanate de méthyle se libère et détruit la plupart des graines scarifiées de mauvaises herbes et les organes végétatifs charnus, y compris les rhizomes et les plantules en germination.

Modes d'application : Appliquer uniformément à l'aide d'injecteurs, d'eau ou d'autres outils qui entraînent le produit à la profondeur désirée dans le sol. On peut aussi épandre le fumigant par le système d'irrigation. Il n'est pas nécessaire de poser ensuite une bâche sur le sol à moins que celui-ci ne soit très poreux, mais il est conseillé d'irriguer par aspersion pour rendre la surface du sol plus étanche.

Rémanence : 10 à 40 jours selon la température du sol et la quantité de matière organique présente, plus longtemps lorsque le sol est froid et riche en matière organique. On peut planter 12 à 16 jours après la fumigation si le test de germination de la laitue n'indique aucun dommage.

Particularités : Tue aussi les nématodes, les champignons et les insectes du sol. Ne mettre en culture que lorsque le sol traité ne contient plus aucune trace de gaz toxique, sous peine de léser les plants.

MÉTOLACHLORE

Voir s-métolachlore.

MÉTOLACHLORE/ATRAZINE

Voir s-métolachlore/atrazine.

MÉTRIBUZINE

Noms commerciaux : CONQUEST A (offert uniquement en emballage combiné de CONQUEST LQ), SENCOR 480 F, SENCOR 75 DF.

Groupe chimique : S-triazine.

Homologations : Aspergeraies établies, féveroles, pommes de terre, soya, tomates repiquées, pommiers, abricotiers, pêchers, cerisiers, maïs, avec la trifluraline, le terbacile ou le s-métolachlore/benoxacor sur les pommiers, abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers et poiriers.

Mauvaises herbes sensibles : Chénopode blanc, moutarde des champs, amarante à racine rouge, petite herbe à poux, bourse-à-pasteur, renouée persicaire, abutilon, stramoine commune, amarante fausse-blite, soude roulante, oxalide jaune, sida épineuse, stellaire, lampourde glouteron, mollugine verticillée, plantules de pissenlit, échinochloa pied-de-coq, digitaire, sétaire, panic d'automne, panic capillaire, plantules de sorgho d'Alep et brome des seigles.

Absorption et diffusion : Absorption foliaire mais principalement radiculaire. Diffusion vers le haut par le xylème.

Base de sélectivité : Décomposition par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En présemis/préplantation avec incorporation (pommes de terre, soya, pommiers, abricotiers, pêchers, cerisiers, maïs, tomates et colza canola tolérant les triazines); en prélevée (asperges, pommes de terre, soya et colza tolérant les triazines); en postlevée (pommes de terre, tomates, maïs et canola tolérant les triazines).

Rémanence : Variable selon le climat. Aux doses normales, demi-vie de 1 à 2 mois.

Particularités : Le traitement peut endommager les cultures traitées lorsque de fortes pluies surviennent peu après. Quelques variétés de pommes de terre, soya et tomates sont moins tolérantes que d'autres. Les mauvaises herbes résistantes aux triazines échappent au traitement. Ne pas utiliser sur les terres noires.

MÉTRIBUZINE + S-MÉTOLACHLORE

Nom commercial : BOUNDARY (emballage combiné de SENCOR DF SOJA + DUAL MAGNUM SOJA).

Groupe chimique : S-triazine + acétanilide.

Homologations : Soya.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir l'étiquette pour la liste des espèces combattues.

Modes d'application : En présemis avec incorporation et en prélevée.

Particularités : Voir les notes sur le s-métolachlore et la métribuzine pour plus d'information sur chacun de ces composants.

NAPROPAMIDE

Noms commerciaux : DEVRINOL 50 DF, DEVRINOL 2G, DEVRINOL 10G.

Groupe chimique : Amides.

Homologations : Asperge, crucifères (chou, brocoli, chou-fleur, brocoli de Chine, moutarde à feuille de chou, pé-tsaï, radis chinois) ail, chou-rave, poivron, citrouille et courges, rutabaga, tomate, tabac, framboisier, mûrier, bleuetier nain cultivé, bleuetier en corymbe établi, mûrier de Boysen, canneberge, mûrier de Logan, fraisier nouvellement planté ou établi, pommier, vigne, pêcher et poirier, plantes ornementales récemment transplantées ou établies, plantes ligneuses de pépinière, essences forestières et plantes ornementales en pots (voir l'étiquette du produit pour connaître les espèces. Appliquer avec la simazine ou le terbacile, sur les nouveaux plants de pommiers, d'abricotiers, de cerisiers, de pruniers, de pêchers et de poiriers.

Mauvaises herbes sensibles : Nombreuses mauvaises herbes annuelles : digitaire, échinochloa pied-de-coq, pâturin annuel, sétaires, cenchrus, folle avoine, éleusine de l'Inde, stellaire, séneçon vulgaire, amarante à racine rouge, chénopode blanc, pourpier potager, renouée des oiseaux, matricaire odorante et laitue scariole.

Absorption et diffusion : Absorption par les racines des mauvaises herbes en germination et diffusion vers le haut.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes. Inhibition de la croissance des racines des plantules en germination. Les plantes établies ne sont pas affectées parce que leur système racinaire descend au-dessous de la zone toxique.

Modes d'application : Traitement de préplantation avec incorporation; bouillie à base d'eau. Pour incorporer uniformément l'herbicide dans le sol sur une profondeur de 2,5 à 5 cm, irriguer ou utiliser l'équipement d'incorporation approprié (c.-à-d. pulvériseur tandem ou cultivateur léger à pattes d'oie), suivi d'une lame niveleuse. Pour les cultures établies, épandre sur un sol préalablement sarclé et irriguer s'il ne pleut pas dans les 7 jours suivant l'application de printemps ou d'automne, ou dans les 2 jours suivant une application d'été. Irriguer de manière à saturer le sol jusqu'à une profondeur de 5 à 10 cm (7 mm d'eau). En traitement de postplantation sur le tabac, appliquer en bande de 25 cm de largeur sur les rangs. Après la récolte, travailler le sol perpendiculairement au sens des bandes afin de diluer les résidus présents dans le sol avant de semer une plante couvre-sol.

Rémanence : Le désherbage est assuré pendant toute la saison à condition que l'herbicide ait été bien incorporé. Un labour profond minimise les dommages causés par les résidus.

Particularités : N'élimine pas les mauvaises herbes qui ont déjà germé. Résiste au lessivage. Par précaution, ne pas planter les espèces sur lesquelles le napropamide n'est pas homologué dans les 12 mois qui suivent le dernier traitement.

NICOSULFURON

Nom commercial : ACCENT.

Groupe chimique : Sulfonylurée.

Homologations : Maïs de grande culture, certains cultivars de maïs sucré (voir l'étiquette du produit) et de maïs de semence (communiquer avec le fournisseur de semences pour des détails sur les lignées spécifiques.

Mauvaises herbes sensibles : Chiendent commun, panic millet, sétaires verte et glauque, panic d'automne, échinochloa pied-de-coq, panic capillaire. Le seul moyen de maîtriser la sétaire glauque est d'ajouter soit MERGE soit du NAU 28 % à la dose de 5 L/ha en plus du surfactant non ionique recommandé.

Absorption et diffusion : Après un traitement foliaire, absorption rapide du nicosulfuron par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement le nicosulfuron en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée; lorsque le maïs est au stade 1–8 feuilles.

Rémanence : Aucune activité rémanente dans le sol.

Particularités : Le nicosulfuron maîtrise les graminées déjà levées, mais n'agit pas sur les graminées qui germent par la suite. Ajouter un surfactant non ionique à raison de 0,2 % v/v. Les symptômes types de la mort du plant (chlorose, nécrose) se manifestent entre 5 et 10 jours suivant le traitement, selon les conditions de croissance. Ne pas appliquer sur du maïs préalablement traité avec un insecticide organophosphoré.

NICOSULFURON + DIFLUFENZOPYR/ DICAMBA

Nom commercial : ACCENT TOTAL (emballage combiné de ACCENT + DISTINCT).

Groupe chimique : Sulfonylurée + semicarbazone/acide benzoïque.

Homologations : Maïs.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir l'étiquette pour connaître les espèces précises combattues.

Absorption et diffusion : Voir les notes sur le nicosulfuron et le diflufenzopyr/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Base de sélectivité : Voir les notes sur le nicosulfuron et le diflufenzopyr/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Modes d'application : En postlevée, du stade 2 feuilles au stade 8 feuilles du maïs.

Particularités : Voir les notes sur le nicosulfuron et le diflufenzopyr/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

NICOSULFURON + PROSULFURON/DICAMBA

Nom commercial : ACCENT I-PASS (emballage combiné de ACCENT + PEAKPLUS).

Groupe chimique : Sulfonylurée + sulfonylurée/acide benzoïque.

Homologations : Maïs.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir l'étiquette pour connaître les espèces précises combattues. Pour une meilleure maîtrise de la sétaire glauque, voir les notes relatives au nicosulfuron.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au nicosulfuron et au prosulfuron/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au nicosulfuron et au prosulfuron/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Modes d'application : En postlevée, jusqu'au stade 7 feuilles du maïs.

Particularités : Voir les notes relatives au nicosulfuron et au prosulfuron/dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

NICOSULFURON/RIMSULFURON

Nom commercial : ULTIM.

Groupe chimique : Sulfonylurée/sulfonylurée.

Homologations : Maïs de grande culture. Ne s'utilise pas sur le maïs sucré ni le maïs de semence.

Mauvaises herbes sensibles : Chiendent commun, panic millet, sétaires verte et glauque, panic d'automne, échinochloa pied-de-coq, panic capillaire, amarante à racine rouge (y compris les espèces résistantes aux triazines).

Absorption et diffusion : Après un traitement foliaire, absorption rapide du nicosulfuron/rimsulfuron par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement le nicosulfuron/rimsulfuron en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée; lorsque le maïs est au stade 1–6 feuilles.

Rémanence : Décomposition microbienne rapide du nicosulfuron dans le sol. Voir les notes relatives au rimsulfuron pour des détails sur la rémanence de ce produit dans le sol.

Particularités : ULTIM maîtrise les graminées déjà levées, mais n'agit pas sur les graminées qui germent par la suite. Ajouter un surfactant non ionique à raison de 0,2 % v/v. Les symptômes types de la mort du plant (chlorose, nécrose) se manifestent entre 5 et 10 jours suivant le traitement, selon les conditions de croissance. Ne pas utiliser sur les hybrides de maïs exigeant 2500 unités thermiques (UT) ou moins, ni dans les régions de tout au plus 2500 UT en moyenne pour la saison.

NICOSULFURON/RIMSULFURON + DIFLUFENZOPYR/DICAMBA

Nom commercial : ULTIM TOTAL (emballage combiné de ULTIM + DISTINCT).

Groupe chimique : Sulfonylurée + semicarbazone/acide benzoïque.

Homologations : Maïs.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir les notes relatives au nicosulfuron/rimsulfuron et au diflufenzopyr/dicamba respectivement et l'étiquette de ces produits pour connaître les espèces précises combattues.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au nicosulfuron/rimsulfuron et au diflufenzopyr/dicamba pour plus de détails sur chaque composant.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au nicosulfuron et au diflufenzopyr/dicamba pour plus de détails sur chaque composant.

Modes d'application : En postlevée, jusqu'au stade 6 feuilles du maïs.

Rémanence : Décomposition microbienne rapide du nicosulfuron dans le sol. Voir les notes relatives au rimsulfuron pour des détails sur la rémanence de ce produit dans le sol. La demi-vie du diflufenzopyr/dicamba dans le sol est d'une trentaine de jours. Il n'y a pas lieu de craindre les résidus présents dans le sol la saison suivante si l'on utilise les doses homologuées.

Particularités : Voir les notes relatives au nicosulfuron/rimsulfuron et au diflufenzopyr/dicamba pour plus de détails sur chaque composant.

OXADIAZON

Nom commercial : ROUNDSTAR 2G.

Groupe chimique : Oxadiazole.

Homologations : Espèces ligneuses d'arbustes ornementaux, vignes et arbres cultivés en contenants.

Mauvaises herbes sensibles : Annuelles dont tabouret des champs, cardamine, séneçon vulgaire, chénopode blanc, pourpier potager, morelle noire, amarante, amarante à racine rouge, amarante blanche, bourse-à-pasteur, pâturin annuel, échinochloa pied-de-coq, sétaires verte et glauque et digitaire.

Absorption et diffusion : Surtout absorbé par les nouvelles pousses lorsqu'elles pénètrent dans la couche de sol traitée.

Base de sélectivité : Plus grande tolérance physiologique relative aux espèces sensibles et absence de contact avec les tissus des plantes sensibles.

Modes d'application : S'utilise pour des plantes ornementales nouvellement transplantées ou déjà établies, avant la levée des mauvaises herbes. Pour des résultats satisfaisants, arracher, avant le traitement, les mauvaises herbes déjà levées.

Rémanence : De 60 à 120 jours.

Particularités : Après l'application, le produit est fixé rapidement et fortement par les colloïdes du sol. Vu sa faible hydrosolubilité et ce degré d'absorption, les déplacements vers le bas et les côtés sont limités en dépit de la pluie et de l'irrigation. Un traitement uniforme est donc essentiel pour des résultats satisfaisants. Il faut de l'eau pour activer le produit chimique. Une pluie ou une irrigation par aspersion après l'application assure une lutte plus efficace contre les mauvaises herbes.

OXYFLUORFÈNE

Nom commercial : GOAL.

Groupe chimique : Éther diphényl.

Homologations : Oignons, fraisiers.

Mauvaises herbes sensibles : Pourpier potager, amarante, morelles annuelles, renouée liseron, chénopode blanc, violette des champs, oxalide.

Absorption et diffusion : Absorption essentiellement foliaire, mais aussi radiculaire. Diffusion pratiquement nulle.

Modes d'application : En postlevée. L'effet herbicide est maximal lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active et au stade 2–4 feuilles. On peut faire la première application lorsque les oignons ont 2 feuilles vraies complètement développées. Des traitements répétés peuvent être nécessaires contre les mauvaises herbes à germination tardive. Faire une pulvérisation unique avant le paillage sur des fraisiers dormants. Utiliser au moins 500 L d'eau/ha.

Rémanence : Limitée en prélevée.

Particularités : L'oxyfluorfène n'est homologué que sur les cultures d'oignons jaunes. Ne pas traiter quand les oignons ou les mauvaises herbes subissent un stress. Ne pas appliquer dans les 56 jours qui précèdent la récolte, dans le cas des oignons, ni dans les 150 jours qui précèdent la récolte, dans le cas des fraisiers.

PARAQUAT

Nom commercial : GRAMOXONE.

Groupe chimique : Dipyridyles.

Homologations : Pommiers, abricotiers, cerisiers, groseilliers à maquereau, gadelliers, vignes, bleuetiers en corymbe, pêchers, poiriers et pruniers établis depuis plus d'un an; mûriers, mûriers de Logan et framboisiers à fruits rouges; désherbage des entre-rangs de fraisiers; désherbage des légumes et des plantes de grande culture sur lit de semence rassis; désherbage des entre-rangs des champs de légumes et des pépinières établies; asperges, pommes de terre; luzerne et lotier établis; rénovation de pâturages, maïs semé sans travail du sol, destruction des conifères.

Mauvaises herbes sensibles : Aucune sélectivité. Tous les végétaux verts sont sensibles.

Absorption et diffusion : Absorption par le feuillage et l'écorce verte; diffusion nulle ou presque.

Base de sélectivité : Tout tissu vert et vivant d'une plante est sensible. Efficacité moindre contre les espèces dotées d'une cuticule cireuse épaisse et de feuilles de forme linéaire comme le souchet. Sans danger pour les plantes ligneuses à écorce mature (non verte).

Modes d'application : En postlevée. En pleine surface ou en jets dirigés pour éviter de toucher les feuilles ou l'écorce des plantes que l'on souhaite conserver. Traiter lorsque les mauvaises herbes font moins de 15 cm. Le traitement est plus efficace quand il est fait par temps couvert ou nuageux, ou le soir.

Rémanence : Le paraquat ne persiste pratiquement pas dans le sol, mais comme il persiste dans les matériaux organiques comme les paillis ou les herbes sèches, il ne faut pas ressemer ces superficies dans les 5 jours qui suivent le traitement. Il faut parfois plus d'un traitement par saison, surtout contre les mauvaises herbes vivaces.

Particularités : Inactivé par absorption sur les particules de sol. Non homologué pour les jardiniers amateurs.

PENDIMÉTHALINE

Nom commercial : PROWL 400.

Nom chimique : Dinitroaniline.

Homologations : Oignons et maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Sétaire verte et sétaire glauque, digitaire, échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, stellaire, chénopode blanc et amarante.

Absorption et diffusion : Les mauvaises herbes sont sensibles à la pendiméthaline au moment de la germination. Ce produit diffuse peu à l'intérieur des plantes et n'agit pas contre celles qui sont déjà levées.

Base de sélectivité : Absorption minime par les plantes cultivées et diffusion minime à l'intérieur de celles-ci.

Modes d'application : Oignons : traitements de postlevée, au stade de la crosse et au stade 2 feuilles des oignons. Maïs de grande culture : en prélevée et peu après la levée. En prélevée, la pendiméthaline est appliquée avec un fertilisant liquide ou de l'eau. Un essai de compatibilité du produit avec le fertilisant doit être effectué avec le produit et tout produit de mélange avec lequel il est homologué. Le traitement peu après la levée ne sera effectué qu'avec de l'eau comme support.

Rémanence : Elle dépend des conditions météorologiques (elle est plus longue par temps sec). Dans l'année qui suit le traitement, on ne peut cultiver que des oignons ou du maïs. Dans un champ qui a porté du maïs traité avec la pendiméthaline, on peut semer, l'année d'après, du soya ou du maïs. Délai d'attente avant la récolte : 100 jours.

Particularités : Le produit est fortement absorbé sur les particules de sol. Son efficacité est maximale quand le champ reçoit une pluie ou une irrigation dans les 7 jours qui suivent. Sur les oignons, pour que l'effet

désherbant persiste toute la saison, il faut traiter deux fois, au stade de la crosse et au stade 2 feuilles. Dans le maïs, pour éliminer la majorité des dicotylédones, il faut mélanger le produit avec d'autres herbicides dans la cuve du pulvérisateur ou faire des pulvérisations échelonnées avec d'autres herbicides. Produit homologué sur les oignons jaunes de garde cultivés en sol organique et en sol minéral. NE PAS faire paître le bétail dans des champs traités ou le nourrir de fourrage traité dans les 100 jours qui suivent un traitement au PROWL.

PICLORAME/2,4-D

Nom commercial : TORDON 101.

Groupe chimique : Pyridine/phénoxy.

Homologations : Désherbage et débroussaillement (conifères compris) des lieux non cultivés, des sites industriels et des servitudes.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des dicotylédones herbacées : chardon des champs, trèfle rouge, mélilot, carotte sauvage, petite herbe à poux, pissenlit, verge d'or, patience, plantain, laitue scariole, bardane, vergerette et vesce commune; plantes ligneuses à feuilles caduques et conifères, sauf le frêne blanc.

Absorption et diffusion : L'absorption est rapide par les racines, les tiges et les feuilles. Le transport peut se faire vers le haut ou vers le bas, mais comme pour le 2,4-D, l'accumulation se fait dans les jeunes régions méristématiques en croissance rapide.

Base de sélectivité : Les effets sur le métabolisme de l'acide nucléique et la croissance ne sont pas observés chez les graminées et autres espèces tolérantes.

Modes d'application : Pour détruire les broussailles ligneuses (feuillus et conifères), pulvériser en pleine surface en utilisant une buse fixe (volume constant à l'hectare) ou sélectivement à l'aide d'une lance de pulvérisation (volume variable à l'hectare). La lance de pulvérisation nécessitant l'emploi d'une bouillie plus diluée, celle-ci doit mouiller complètement le feuillage, les tiges et les collets des racines. Les broussailles devraient être traitées quand le feuillage est bien développé, au printemps ou au début de l'été. Pour assurer une couverture complète et une dérive minimale de l'herbicide, traiter les broussailles qui n'ont pas plus de 2,5 m de hauteur. Pour traiter les souches peu après le débroussaillement mécanique, mélanger le produit avec de l'eau ou de l'éthylène-glycol (pour abaisser le point de congélation, si nécessaire) et en appliquer sur le cambium des surfaces fraîchement sectionnées. Contre les dicotylédones herbacées, traiter en pleine surface au printemps ou au début de l'été, après la reprise de la végétation.

Rémanence : Pour minimiser les résidus dans le sol l'année suivant l'application, ne pas dépasser les doses recommandées. La dégradation de cet herbicide est plus rapide si la saison est chaude et humide. Certaines cultures comme le soya, le tabac, les tomates, les pommes de terre, les vignes et de nombreuses plantes ornementales étant très sensibles à une petite quantité de résidu de piclorame, ce dernier ne devrait pas être appliqué sur des terres destinées à la production agricole et horticole.

Particularités : L'achat et l'utilisation du piclorame/2,4-D en Ontario est réservé aux détenteurs d'un permis délivré par le ministère de l'Environnement de l'Ontario. Cet herbicide ne doit pas être appliqué sur ou près des zones où les racines des arbres et plantes que l'on désire conserver risquent de s'étendre. La dérive de pulvérisation ayant un effet phytotoxique sur les plantes sensibles, il est recommandé d'utiliser un dispositif ou un adjuvant antidérive approuvé lorsqu'on traite à bas volume près des arbres ou des cultures à préserver.

PROMÉTRYNE

Nom commercial : GESAGARD.

Groupe chimique : S-triazines.

Homologations : Carottes, pois, poireaux et céleris repiqués.

Mauvaises herbes sensibles : Chénopode blanc, renouée persicaire, spargoute des champs, amarante, moutarde des champs, pourpier potager, morelle noire de l'Est, stellaire, ortie royale et sétaire verte.

Absorption et diffusion : Absorption par le feuillage et les racines. Ascension par le xylème et accumulation dans les méristèmes apicaux.

Base de sélectivité : Métabolisé par les plantes tolérantes et, dans une moindre mesure, par les plantes sensibles, bien que ce ne soit pas le mécanisme sélectif principal.

Modes d'application : En prélevée ou peu après la levée des mauvaises herbes (avant qu'elles atteignent 5 cm de hauteur). Traiter avant la levée des carottes ou des pois. Sur céleri, traiter au cours de la 2e semaine suivant le repiquage.

Rémanence : Environ 6 à 8 semaines. On peut semer, à l'automne, du seigle ou de l'avoine sur une terre traitée à la prométryne.

PROPYZAMIDE

Nom commercial : KERB.

Groupe chimique : Amides.

Homologations : Luzerne, lotier, plantes ligneuses de pépinière, laitue, pommiers, poiriers, bleuetiers nains.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées vivaces notamment chiendent commun, graminées annuelles, repousses de céréales et stellaire.

Absorption et diffusion : Absorption radiculaire, diffusion vers le feuillage. Faible absorption foliaire.

Base de sélectivité : Dégradation plus rapide chez les espèces tolérantes.

Modes d'application : En prélevée pour lutter contre les annuelles. Contre les graminées vivaces, traiter à l'automne en postlevée, de la fin septembre au début novembre, lorsque la température du sol est basse, mais supérieure au point de congélation, et que son humidité est élevée.

Rémanence : Variable (2 à 9 mois) selon le type de sol et les conditions climatiques. La décomposition de

l'herbicide est lente à des températures inférieures à 15 °C, mais s'accélère aux températures supérieures. Rémanence plus longue dans les sols sablonneux pauvres en matière organique.

Particularités : Une pluie ou une irrigation est nécessaire pour entraîner l'herbicide vers la rhizosphère où il sera absorbé par les graminées vivaces et les graminées annuelles en germination.

PROSULFURON/DICAMBA

Nom commercial : PEAKPLUS (emballage combiné de PEAK + BANVEL II).

Groupe chimique : Sulfonylurée + acide benzoïque.

Homologations : Maïs de grande culture.

Mauvaises herbes sensibles : Chénopode blanc (y compris les souches résistantes aux triazines), amarante à racine rouge, lampourde glouteron, renouée persicaire, moutarde des champs, abutilon, petite herbe à poux.

Absorption et diffusion : Après un traitement foliaire et l'absorption, le prosulfuron se diffuse par le phloème jusqu'aux tissus méristématiques. Chez les espèces sensibles, la croissance cesse rapidement, puis les feuilles se décolorent; il faut 1–3 semaines pour que le plant meure.

Base de sélectivité : Inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS). Les espèces tolérantes métabolisent rapidement le prosulfuron.

Modes d'application : En postlevée, lorsque le maïs est au stade 2–7 feuilles.

Rémanence : La dégradation se fait essentiellement par l'action microbienne du sol. Le prosulfuron offre un degré de maîtrise suffisant des dicotylédones qui germent par la suite. Cultures pouvant être incluses dans l'assolement : soya, haricots secs, pois, céréales et maïs. Voir l'étiquette et les tableaux 4–4 et 4–5, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67 et 70, pour connaître les restrictions relatives à la rotation des cultures.

Particularités : Le prosulfruon doit être mélangé en cuve avec un taux réduit de dicamba. Voir la section des recommandations sur le maïs pour connaître les produits et les doses à employer. Ajouter un adjuvant à raison de 0,2 % v./v. Ne pas appliquer sur le maïs traité avec un insecticide organophosphoré.

PYRASULFOTOLE/BROMOXYNIL

Nom commercial : INFINITY.

Groupe chimique : Benzoylpyrazoles et hydroxybenzonitriles.

Homologations : Blé (de printemps, dur d'automne), orge, triticale et phléole des prés (production de semences seulement).

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles y compris les biotypes résistant aux inhibiteurs de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) (groupe 2) : laiteron potager, stellaire moyenne, gaillet grateron, sagesse-des-chirurgiens, ortie royale, kochia à balais, chénopode blanc, persicaire pâle, amarante à racine rouge, soude roulante, bourse-à-pasteur, tabouret des champs, canola spontané (ordinaire et tolérant l'herbicide), renouée liseron et moutarde des champs. Suppression de la partie aérienne des vivaces y compris : chardon des champs, pissenlit, laiteron des champs.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée — Appliquer sur les mauvaises herbes levées quand elles sont jeunes et en croissance active. Si le temps est frais et/ou sec, le traitement peut être moins efficace ou mettre moins de temps à réagir. Le traitement peut aussi être moins efficace s'il est fait quand les mauvaises herbes sont couvertes de poussière ou qu'elles ont été mouillées par une forte rosée, du brouillard, de la bruine ou de la pluie. Appliquer dans un minimum de 46,8 L d'eau/ha à une pression de 275 kPa. Le traitement peut être fait dans des cultures à partir du stade 1 feuille jusqu'au moment où la feuille de l'épi est visible mais encore enroulée.

Rémanence : Essentiellement aucune.

Particularités : Un traitement effectué après la sortie de la feuille de l'épi risque d'endommager la culture. Ne pas appliquer sur une culture soumise à un stress causé par des conditions météorologiques extrêmes, le gel, un sol peu fertile, une sécheresse, un sol saturé d'eau, la maladie ou des infestations, sous peine de l'endommager. Ne pas appliquer sur des cultures contre-ensemencées d'une légumineuse. Ne pas entreposer sous des températures inférieures à –20 °C.

PYRAZONE

Nom commercial : PYRAMIN FL.

Groupe chimique : Pyridazinones.

Homologations : Betteraves à sucre, betteraves potagères. Avec NORTRON sur les betteraves à sucre.

Mauvaises herbes sensibles : Morelles annuelles, stellaire, renouée, renouée persicaire, chénopode blanc, chénopode glauque, amarante fausse-blite, pourpier potager, herbe à poux, amarante à racine rouge, bourse-à-pasteur, renouée scabre, tabouret des champs, renouée liseron, carotte sauvage (plantule), moutarde des champs, vélar fausse-giroflée et barbarée vulgaire (plantule).

Absorption et diffusion : Absorption tant radiculaire que foliaire, mais diffusion du produit vers le haut, en direction des feuilles où il inhibe la photosynthèse.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En présemis avec incorporation, en prélevée ou en postlevée après le stade de la deuxième feuille vraie chez les betteraves.

Rémanence : La persistance est en moyenne d'environ 4 à 8 semaines, selon l'humidité et la température du sol. Les problèmes de résidus sont peu probables.

Particularités : Les traitements de prélevée ne donnent de bons résultats que s'ils sont suivis d'au moins 1,25 cm de pluie. Les mélanges de pyrazone et de TCA sont particulièrement indiqués pour lutter à la fois contre les dicotylédones et les graminées annuelles. Ces traitements peuvent ne pas être

efficaces sur les sols riches en matière organique ou sur les sols secs (c.-à-d. terres noires ou semis tardif de betteraves à un moment où les sols sont plus secs). Dans ces cas, il est préférable d'appliquer en postlevée un mélange pyrazone-TCA en bande sur le rang. Cependant, pour être sélectifs et efficaces, ces produits doivent être appliqués quand les cotylédons des betteraves font au moins 2,5 cm de long et avant que les mauvaises herbes n'atteignent le stade 4 feuilles vraies (10 cm). Le feuillage des betteraves traitées au TCA ne devrait pas être consommé par les animaux. Les résidus de TCA dans le sol peuvent nuire à certaines cultures comme le maïs.

QUIZALOFOP-P-ÉTHYL

Nom commercial : ASSURE II.

Groupe chimique : Aryloxyphénoxypropionates.

Homologations : Canola, lin, un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles (voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués), pois, rutabaga, chanvre industriel, luzerne de semence, soya et betterave à sucre.

Mauvaises herbes sensibles : Sétaire verte, échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, panic capillaire, panic millet, folle avoine et repousses de céréales et de maïs.

Absorption et diffusion : Le produit est rapidement absorbé par les feuilles et véhiculé par le xylème et le phloème jusqu'aux racines et aux points végétatifs des plantes.

Base de sélectivité : Perturbation de la biosynthèse des acides gras, ce qui a pour effet d'augmenter la perméabilité des plantes sensibles et de dérégler le fonctionnement de leurs cellules. Métabolisation rapide de la matière active par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Décomposition rapide par les microbes; pratiquement aucune activité dans le sol.

Particularités : Appliquer avec SURE-MIX à raison de 5 L/1000 L de bouillie.

RIMSULFURON

Noms commerciaux : ELIM EP (offert uniquement en emballage combiné avec BATTALION ou GALAXY), PRISM.

Groupe chimique : Sulfonylurée.

Homologations : ELIM EP — Maïs de grande culture. Ne s'utilise pas sur le maïs sucré ou le maïs de semence. PRISM — Pommes de terre, tomates de transformation repiquées. Ne pas utiliser sur des pommes de terre destinées à produire des semences.

Mauvaises herbes sensibles : Sétaire verte, panic d'automne, échinochloa pied-de-coq, amarante à racine rouge (y compris les espèces résistantes aux triazines), morelle faux-sarracha. Supprime : sétaire glauque, panic capillaire, chénopode blanc.

Absorption et diffusion : Après un traitement foliaire, absorption rapide du rimsulfuron par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement le rimsulfuron en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : Postlevée, entre le stade coléoptile et 3 feuilles du maïs. Avant le début de la floraison dans les pommes de terre.

Rémanence : Assure une maîtrise des mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette pendant toute la saison de croissance jusqu'à la fermeture du couvert de feuillage.

Particularités : Voir nicosulfuron/rimsulfuron.

RIMSULFURON + GLYPHOSATE

Nom commercial : GALAXY (emballage combiné d'ELIM EP + ROUNDUP WEATHERMAX).

Groupe chimique : Sulfonylurées + acides aminés.

Homologations : Maïs tolérant le glyphosate (Roundup Ready) uniquement.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles. Voir l'étiquette pour des précisions sur les espèces combattues.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au rimsulfuron et au glyphosate pour des détails sur chacune des composantes.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au rimsulfuron et au glyphosate pour des détails sur chacune des composantes.

Modes d'application : Appliquer en postlevée, jusqu'au stade 6 feuilles du maïs.

Particularités : Voir les notes relatives au rimsulfuron et au glyphosate pour des détails sur chacune des composantes.

Rémanance : Voir les notes relatives au rimsulfuron et au glyphosate pour des détails sur chacune des composantes.

RIMSULFURON + S-MÉTOLACHLORE + DICAMBA

Nom commercial : BATTALION (emballage combiné d'ELIM EP + DUAL II MAGNUM + BANVEL II).

Groupe chimique : Sulfonylurée + acétanilide + acide benzoïque.

Homologations : Maïs.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles, maîtrise temporaire du chiendent commun. Voir l'étiquette pour connaître les mauvaises herbes précises combattues.

Absorption et diffusion : Voir les notes relatives au rimsulfuron, au s-métolachlore et au dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Base de sélectivité : Voir les notes relatives au rimsulfuron, au s-métolachlore et au dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

Modes d'application : En prélevée et en postlevée jusqu'au stade 3 feuilles du maïs.

Rémanence et particularités : Voir les notes relatives au rimsulfuron, au s-métolachlore et au dicamba pour plus d'information sur chaque composant.

S-MÉTOLACHLORE

Nom commercial : DUAL MAGNUM, DUAL II MAGNUM.

Groupe chimique : Acétanilides.

Homologations : Maïs, soya, un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles (voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués), crucifères repiqués (chou, chou-fleur, brocoli), tomates repiquées, pommes de terre, betteraves à sucre, pois de transformation, rutabagas, lupin blanc doux, pommiers, abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers et pruniers.

Mauvaises herbes sensibles : Digitaire sanguine et astringente, panic capillaire, échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, sétaire géante, verte et glauque, souchet comestible, morelle noire de l'Est et acnide tuberculée.

Absorption et diffusion : Absorption par les graminées en germination principalement par la pousse à peine sortie de la graine. Absorption par les dicotylédones en germination au niveau des racines et des nouvelles pousses.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Tôt en présemis, en présemis avec incorporation et en prélevée. Peu après la levée dans le maïs (entre le stade coléoptile et le stade 2 feuilles du maïs). Régler l'équipement d'incorporation pour travailler sur une profondeur de 10 cm (avec un pulvériseur à disques opérant à 6–10 km/h ou un vibroculteur à 10–13 km/h). Une seule incorporation est suffisante et n'a pas besoin d'être faite immédiatement. Une pluie dans les 10 jours est nécessaire à l'activation maximale d'un traitement de prélevée.

Rémanence : L'effet désherbant dure normalement 10–14 semaines.

Particularités : La dose requise dépend de la densité des mauvaises herbes (dose supérieure contre une densité forte). Un traitement de présemis/ préplantation avec incorporation est nécessaire pour lutter contre le souchet comestible. On peut semer les céréales d'automne 4 à 5 mois après l'application du métolachlore. De nombreux mélanges en cuve sont homologués pour différentes cultures. Ne pas utiliser sur des terres noires ou sur des sols à texture grossière, pauvres en matière organique. DUAL II MAGNUM renferme du benoxacor, un produit chimique qui augmente la capacité du plant de maïs à métaboliser le s-métolachlore, donc à prévenir les blessures causées au maïs sous des conditions environnementales défavorables.

S-MÉTOLACHLORE/ATRAZINE

Nom commercial : PRIMEXTRA II MAGNUM.

Groupe chimique : Acétanilide/s-triazine.

Homologations : Maïs à ensilage, de grande culture, de semence et sucré.

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones et graminées annuelles en germination : morelle noire de l'Est, renouée persicaire, chénopode blanc, moutarde des champs, pourpier potager, amarante fausse-blite, amarante à racine rouge, renouée liseron, renouée scabre, herbe à poux, digitaire, échinochloa pied-de-coq, sétaires verte, glauque et géante, panic capillaire et panic d'automne. On peut détruire le souchet comestible avec un traitement de présemis avec incorporation.

Absorption et diffusion : Chez les graminées en germination, l'absorption se fait principalement par la tige juste au-dessus de la graine. Chez les dicotylédones en germination, l'absorption se fait par les racines et la tige.

Base de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : Tôt en présemis, en présemis avec incorporation et en prélevée. Peu après la levée dans le maïs (entre le stade coléoptile et le stade 2 feuilles du maïs). Régler l'équipement d'incorporation pour travailler sur une profondeur de 10 cm (avec un pulvériseur à disques opérant à 6–10 km/h ou un vibroculteur à 10–13 km/h). Une seule incorporation est suffisante et n'a pas besoin d'être faite immédiatement. Une pluie dans les 10 jours est nécessaire à l'activation maximale d'un traitement de prélevée. Le s-métolachlore/atrazine peut être dilué dans des solutions d'azote ou des fertilisants liquides pour le traitement de présemis avec incorporation ou le traitement de prélevée. On peut imprégner les engrais granulaires en vrac avec du métolachlore/atrazine pour une incorporation en présemis.

Rémanence : L'effet désherbant dure normalement 10–14 semaines. Le panic d'automne qui germe tard échappe au traitement. On pourra semer soya, haricots blancs, avoine, et orge le printemps suivant.

Particularités : La dose requise dépend de la pression exercée par les mauvaises herbes (utiliser une dose plus forte si la pression est plus grande). La lutte contre le souchet comestible nécessite un traitement de présemis avec incorporation. Sans effet contre les espèces résistantes aux triazines. Contient une faible proportion d'atrazine susceptible de persister lors d'une année sèche. Cet herbicide est efficace sur un grand nombre de types de sols et laisse une bonne marge de sécurité pour les cultures. Sans effet contre les vivaces. PRIMEXTRA II MAGNUM renferme du benoxacor, un produit chimique qui augmente la capacité du plant de maïs à métaboliser le s-métolachlore, donc à prévenir les blessures causées au maïs sous des conditions environnementales défavorables.

SCLEROTINIA MINOR (SOUCHE IMI 344141)

Nom commercial : SARRITOR HERBICIDE BIOLOGIQUE GRANULAIRE.

Homologations : Gazons.

Mauvaise herbe sensible : Pissenlit.

Absorption et diffusion : *Sclerotinia minor*, la matière active, est un champignon présent à l'état naturel qui, lorsqu'il est appliqué sur les pissenlits, les infecte et en détruit les tissus jusqu'à faire mourir les plants.

Modes d'application : En postlevée. Appliquer lorsque les températures diurnes atteignent 18–24 °C et que de la pluie est prévue dans les 12 heures qui suivent le traitement.

Rémanence : Essentiellement aucune; inefficace contre les pissenlits non encore levés.

Particularités : SARRITOR met habituellement 5–7 jours à détruire la partie aérienne ou à faire mourir le pissenlit. Ce produit est sans danger pour les espèces de graminées, mais peut endommager gravement les espèces de dicotylédones non ciblées avec lesquelles il entre en contact.

SÉTHOXYDIME

Nom commercial : POAST ULTRA.

Groupe chimique : Cyclohexanédiones.

Homologations : Canola (colza), lin, soya, un certain nombre de catégories commerciales de haricots comestibles (voir le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, pour des détails sur les usages homologués), pois, oignon, tomate, pomme de terre, patate douce, citrouille, courge, concombre, luzerne, sarrasin, ail, fétuque rouge traçante, brocoli, chou, chou-fleur, menthe poivrée, menthe verte, pois mange-tout, pommier, abricotier, cerisier, pêcher, poirier, prunier, bleuetier en corymbe, canneberges, fraisier et maïs résistant au séthoxydime.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées annuelles (folle avoine, sétaires, échinochloa pied-de-coq, digitaire sanguine, panic millet, panic d'automne et panic capillaire), repousses de céréales et de maïs, chiendent commun.

Absorption et diffusion : Le produit est absorbé par les feuilles et diffusé vers les parties supérieures et inférieures de la plante.

Base de sélectivité : Décomposition par les espèces tolérantes (dicotylédones).

Modes d'application : En postlevée, sur des graminées annuelles en pleine croissance, au stade 1–6 feuilles, et sur le chiendent commun du stade 1–3 feuilles. Utiliser des buses avec pastilles à jet plat et ajouter MERGE dans la cuve du pulvérisateur. À la place de MERGE, on peut aussi ajouter à la bouillie le CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST ou du sulfate d'ammonium et le CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST. Si l'on veut appliquer d'autres herbicides de postlevée dont l'association dans la cuve du pulvérisateur n'est pas recommandée sur le mode d'emploi, il faut le faire au moins 4 jours avant ou après le traitement au séthoxydime. Également homologué en traitement aérien.

Rémanence : Pratiquement nulle. Une deuxième application et/ou un binage peut être nécessaire pour lutter contre les graminées qui lèvent après le traitement.

Particularités : Après le traitement, les graminées sensibles cessent immédiatement de croître et virent progressivement au jaune, puis au pourpre, puis au brun sur une période de 7 à 21 jours, selon les conditions de croissance et la concurrence de la culture. Une pluie dans l'heure qui suit peut réduire l'efficacité du traitement. Si les graminées traitées subissent un stress (sécheresse, inondation, froid prolongé), le désherbage est retardé ou perd de son efficacité.

SIMAZINE

Noms commerciaux : PRINCEP NINE-T, SIMADEX, SIMAZINE 480.

Groupe chimique : S-triazines.

Homologations : Maïs, aspergeraie établie, lotier, framboisiers, mûriers de Logan, ronces, bleuetiers en corymbe; luzerne, pommiers, abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers et pruniers établis depuis un an et plus; vignes établies depuis 3 ans et plus; brise-vent établis depuis au moins un an (caragana, frêne vert, orme de Sibérie, orme d'Amérique et érable négondo); nouvelles plantations ou plantations établies de sapins de Noël et d'espèces forestières (pin blanc et sapin baumier de 2 ans ou plus); plantes ligneuses ornementales et plantes de pépinière établies depuis au moins 1 an (thuya, épine-vinette, pommier, pommetier décoratif, buis, cotonéaster, cornouiller, houx, rosier, if, chamaecyparis, pruche, genévrier, rosier multiflore, pivoine, épinette, pin mugho, noyer noir et frêne blanc), plantes de pépinière en pots (thuya, genévrier, if); lutte contre les plantes aquatiques; désherbage des sols non cultivés. Préparations du terrain, avant la plantation de sapins, de pins et d'épinette (PRINCEP NINE-T seulement).

Mauvaises herbes sensibles : Dicotylédones annuelles : amarante, renouée persicaire, chénopode blanc, pourpier potager, herbe à poux, trèfle spontané, renouée liseron, renouée scabre, plantain et séneçon vulgaire; graminées annuelles : échinochloa pied-de-coq, digitaire, folle avoine et sétaire glauque (sans effet contre les biotypes résistant aux triazines de sétaire, chénopode blanc, amarante et séneçon vulgaire); la plupart des espèces vivaces fraîchement germées.

Absorption et diffusion : La simazine est absorbée par les racines, mais non par les feuilles, ou alors très faiblement; elle monte par le xylème et s'accumule dans le méristème apical et les feuilles avec la napropamide, sur les nouvelles plantations de pommiers, d'abricotiers, de cerisiers, de pruniers, de pêchers et de poiriers.

Base de sélectivité : Quelques espèces, comme le maïs, métabolisent la simazine. La sélectivité tient à ce que les racines de la plupart des plantes cultivées descendent plus profond que les percolats de simazine.

Modes d'application : En présemis avec incorporation (à une profondeur de 2,5 cm) ou en prélevée sur le maïs; en prélevée sur les autres cultures. Application en pleine surface ou en bande. Pour les cultures fruitières, appliquer en bande de 1 mètre de large sous les plants; sarcler ou engazonner les entre-rangs. Contre les mauvaises herbes aquatiques, dans les fossés de drainage ou les étangs fermés, traiter après vidage ou en appliquant la simazine dans tout le volume d'eau qu'ils contiennent.

Rémanence : Les résidus peuvent persister dans le sol pour plus d'une saison. Seul le maïs peut être planté sur une superficie traitée à la simazine la même année. L'année suivant un traitement avec des doses excédant 2 kg/ha, ne pas semer ou planter d'autres cultures; faire une analyse de sol si on soupçonne la présence de résidus.

Particularités : La simazine a besoin d'une humidité suffisante pour être activée. Ne traiter qu'une seule fois par saison. Pour éviter la prolifération de mauvaises herbes résistantes, il faut alterner la simazine avec d'autres herbicides rémanents non à base de triazines. La simazine est plus persistante que l'atrazine. Lorsque la pluie est suffisante pour causer de l'érosion, de la terre contenant de la simazine peut être entraînée vers des parcelles en contrebas et endommager les cultures présentes ou à venir.

SULFATE DE CUIVRE

Nom commercial : POLYDEX MC. Communiquer avec le fabricant pour des précisions.

SURFACTANTS

Voir chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75.

TERBACILE

Nom commercial : SINBAR.

Groupe chimique : Uraciles.

Homologations : Fraisiers, bleuetiers en corymbe, pommiers, pêchers, cerisiers, pruniers, menthe verte, menthe poivrée, abricotiers, poiriers; avec la napropamide, sur les nouvelles plantations de pommiers, de poiriers, de cerisiers, d'abricotiers, de pruniers et de pêchers.

Mauvaises herbes sensibles : Échinochloa pied-de-coq, pâturin, digitaire, sétaire, stellaire, brome des seigles, ray-grass vivace, orge sauvage, moutarde, laitue scariole, tabouret des champs, laiteron potager, lamier amplexicaule, chénopode blanc, amarante, pourpier potager et herbe à poux. Destruction partielle : chiendent commun, morelle de Caroline, vesce et souchet comestible.

Absorption et diffusion : L'absorption se fait surtout par les racines, bien qu'elle se fasse aussi en partie par le feuillage et la tige. Le transport se fait vers le haut en direction des feuilles.

Base de sélectivité : Utiliser seulement sur les plantations établies, de façon que les racines de la culture soient situées plus bas que la zone rendue toxique. Il se peut aussi que le terbacile diffuse plus lentement dans les espèces tolérantes et qu'il soit métabolisé plus rapidement.

Modes d'application : Appliquer à la surface du sol à raison de 200–1000 L d'eau/ha. Pour désherber un verger de pommiers, on peut ajouter du paraquat à la bouillie. Les doses pour les fraisiers sont considérablement plus faibles et le traitement peut avoir lieu au printemps, en postrécolte ou à la fin de l'automne. On peut améliorer la lutte contre les graminées vivaces en sarclant avant le traitement.

Rémanence : Peut se prolonger jusqu'à 2 ans. Le risque de résidus est plus important dans les sols lourds, si l'on traite plusieurs fois à doses élevées.

Particularités : Une certaine humidité est nécessaire pour activer le produit dans les 2 semaines suivant le traitement. Ne pas appliquer sur des sols qui ont moins de 1 % de matière organique, ni sur des sols érodés. Utiliser la dose inférieure sur des sols contenant de 1 à 2 % de matière organique. Ne pas appliquer sur des fraisiers affaiblis ou malades.

THIFENSULFURON-MÉTHYL

Nom commercial : PINNACLE.

Groupe chimique : Sulfonylurées.

Homologations : Soya, tomate.

Mauvaises herbes sensibles : Amarante à racine rouge, chénopode blanc, abutilon, renouée persicaire et moutarde des champs.

Absorption et diffusion : Après l'application foliaire, le produit est rapidement absorbé par les feuilles et véhiculé par le xylème et le phloème jusqu'aux points végétatifs des mauvaises herbes sensibles.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement l'herbicide en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Décomposition rapide par les microbes du sol. Demi-vie de 5 jours lorsque la température du sol est de 25 °C.

Particularités : Le thifensulfuron-méthyl tue les espèces indiquées sur le mode d'emploi à condition qu'elles fassent moins de 10 cm de hauteur. L'amarante à racine rouge est très sensible. Les symptômes typiques du dépérissement de la plante (crispation, enroulement et chlorose des feuilles) se manifestent de 5 à 10 jours après le traitement, selon les conditions de croissance. L'ajout d'un engrais renfermant de l'ammonium, par exemple une solution NAU, renforce grandement la lutte contre l'abutilon.

THIFENSULFURON-MÉTHYL/TRIBENURON-MÉTHYL

Nom commercial : REFINE SG. REFINE M (emballage combiné de REFINE SG + MCPA).

Groupe chimique : Sulfonylurées.

Homologations : Blé (de printemps, d'automne, blé dur) orge, avoine non contre-ensemencée de légumineuses ou de graminées. REFINE SG peut être appliqué sur le blé d'automne à l'automne ou au printemps.

Mauvaises herbes sensibles : Chénopode blanc, renouées annuelles (renouée scabre, renouée persicaire), stellaire, ortie royale, renouée liseron, saponaire des vaches, tabouret des champs, chardon des champs, laiteron potager, mauve à feuilles rondes.

Absorption et diffusion : En pulvérisation foliaire, le produit est rapidement absorbé par les feuilles, puis diffuse dans le xylème et le phloème.

Base de sélectivité : Chez les espèces sensibles, l'inhibition de l'acétolactate synthase entraîne rapidement l'arrêt de la division et de la croissance des cellules. Les espèces tolérantes transforment rapidement l'herbicide en métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Dégradation rapide par les microbes du sol.

Particularités : Il faut ajouter à la bouillie un surfactant non ionique. Les symptômes types de dépérissement (enroulement et crispation des feuilles, chlorose) se manifestent de 5 à 10 jours après le traitement, suivant les conditions de milieu. En association avec du MCPA et du 2,4-D, cet herbicide agit contre l'herbe à poux et les moutardes, sisymbres et vélars.

TOPRAMÉZONE

Nom commercial : IMPACT.

Groupe chimique : Pyrazolones.

Homologations : Maïs de grande culture, de semence et sucré.

Mauvaises herbes sensibles : Graminées et dicotylédones annuelles, y compris les biotypes résistant aux triazines et au herbicides du groupe 2.

Base de sélectivité : Inhibe l'enzyme HPPD présente dans les cellules photosynthétiques des espèces sensibles. Les symptômes chez les plantes sensibles se manifeste par le blanchissement suivi d'une nécrose des tissus. Les espèces tolérantes métabolisent rapidement la topramézone.

Modes d'application : En postlevée dans le maïs de grande culture entre les stades 1 et 8 feuilles des dicotylédones et 1 et 4 feuilles des graminées.

Rémanence : Dégradation assurée essentiellement par l'action microbienne du sol. La topramézone a une action rémanente dans le sol contre les dicotylédones.

Particularités : L'atrazine augmente considérablement l'activité de la topramézone. Un mélange en cuve contenant de la topramézone, de l'atrazine et du diméthénamide-P procure en un seul passage une action herbicide en postlevée qui comporte une action rémanente contre les graminées et les dicotylédones adventices.

TRALKOXYDIME

Nom commercial : ACHIEVE LIQUID.

Groupe chimique : Cyclohexanédiones.

Homologations : Blé de printemps, orge de printemps, agropyre à crête, fétuque rouge traçante, brome des prés, brome inerme, agropyre du Nord, agropyre à chaumes rudes, agropyre de l'Ouest.

Mauvaises herbes sensibles : Folle avoine.

Absorption et diffusion : Absorption foliaire et diffusion vers les points végétatifs des racines, des pousses et des feuilles.

Bases de sélectivité : Métabolisé par les espèces tolérantes.

Modes d'application : En postlevée sur la folle avoine au stade de 1–5 feuilles, en pleine croissance. Résiste perdant 1 h au délavage par la pluie.

Rémanence : Nulle.

Particularités : Sûr pour tous les cultivars d'orge et de blé de printemps. Peut être appliqué sur les cultures céréalières contre-ensemencées de légumineuses telles que le trèfle, luzerne, sainfoin commun ou lotier corniculé. Le fourrage ne doit pas être brouté, ni servi aux animaux dans l'année du traitement.

TRICLOPYR

Noms commerciaux : GARLON 4, RELEASE.

Groupe chimique : Pyridines.

Homologations pour lieux non cultivés : GARLON 4 sert à préparer le terrain dans les cultures de bleuetier nain, et à lutter contre les végétaux ligneux indésirables, ainsi que les dicotylédones annuelles et vivaces, dans les terrains non cultivés, notamment servitudes, couloirs des lignes électriques, voies de communication, pipelines, bords de routes, abords d'usine et d'entrepôt. L'herbicide sylvicole RELEASE est recommandé pour éliminer les végétaux ligneux indésirables ainsi que les dicotylédones annuelles et vivaces dans les massifs boisés entretenus.

Mauvaises herbes sensibles : Espèces ligneuses : aulne, frêne, peuplier faux-tremble, tilleul, hêtre, bouleau, ronces, framboisier, nerprun, peuplier deltoïde, cornouiller, sureau, aubépine, caryer, ostryer de Virginie, robinier, érables, mûrier, sumac à feuilles de chêne, peuplier, sumac, saule, févier épineux, cerisier de Virginie, orme, érable rouge, chênes et pins. Mauvaises herbes annuelles et dicotylédones : bardane, chicorée sauvage, patience crépue, pissenlit, liseron des champs, chénopode blanc, herbe à poux, renouée, gaillet mollugine, vesce et laitue sauvage.

Absorption et diffusion : Le triclopyr est absorbé par les feuilles et par les racines. Il se diffuse rapidement dans toute la plante. Il s'accumule en général dans les tissus méristématiques et n'est pas facilement métabolisé par les plantes sensibles.

Base de sélectivité : Les espèces tolérantes telles que les graminées métabolisent rapidement le triclopyr.

Modes d'application : Pour les espèces caduques et certaines espèces de conifères, faire une pulvérisation foliaire quand les broussailles sont en pleine croissance. Faire soit un traitement généralisé à l'aide d'une buse fixe (volume constant à l'hectare), soit un traitement localisé à l'aide d'une lance de

pulvérisation (volume variable à l'hectare); comme ce dernier type de traitement se fait avec une bouillie diluée, il faut mouiller complètement le feuillage, les tiges et le collet. Il est bon de traiter les broussailles quand leurs feuilles sont bien développées et en pleine croissance. Pour dégager autour des conifères dans les massifs boisés, faire une pulvérisation foliaire à la fin de l'été quand les conifères ont aoûté et que les arbres à feuilles caduques n'ont pas commencé à prendre les couleurs d'automne. On parvient aussi parfois à détruire les végétaux ligneux par des applications sur l'écorce du pied, les tiges dormantes et les plaies de coupe.

Rémanence : La demi-vie du triclopyr dans le sol est d'environ 30 jours quand les conditions sont favorables à la décomposition microbienne.

Particularités : Ne traiter que lorsque le risque de dérive du brouillard herbicide est négligeable ou nul. De petites quantités de brouillard peuvent léser les dicotylédones sensibles.

TRIFLURALINE

Noms commerciaux : BONANZA 400, RIVAL, TREFLAN EC.

Groupe chimique : Dinitroanilines.

Homologations : Soya, haricots noir, rognon, de Lima, mange-tout et blanc, féverole, canola (colza), tournesol, navet, pois de grande culture et de conserverie, luzerne semée sans plante-abri; plants repiqués de tomates, de poivrons, de choux de Bruxelles, de brocolis, de choux et de choux-fleurs; carottes, crambes, choux et choux-fleurs semés, fleurs annuelles, plantes ligneuses ornementales et matériel de pépinière, vivaces, brise-vent établis, fraisiers.

Mauvaises herbes sensibles : La plupart des graminées annuelles, ainsi que l'amarante et le chénopode blanc, y compris les biotypes qui tolèrent les triazines.

Absorption et diffusion : Les cultures qui poussent dans une terre traitée à la trifluraline absorbent très peu cet herbicide qui, en revanche, tue les mauvaises herbes sensibles dès qu'elles germent. Les mauvaises herbes déjà établies échappent au traitement.

Base de sélectivité : Phénomènes de croissance physiologique associés à la germination.

Modes d'application : En présemis avec incorporation. Appliquer à raison de 100–300 L d'eau à l'hectare. Épandre la dose inférieure sur un sol sablonneux, l'augmenter sur un loam et à nouveau sur un sol argileux. Ne pas utiliser sur des sols fortement organiques (terre noire, tourbe ou sables noirs contenant plus de 15 % de matière organique). Incorporer par 2 passages croisés de pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou de cultivateur à dents (10–13 km/h) réglé de manière à travailler le sol sur une profondeur de 8 à 10 cm. La première incorporation doit être faite dès que possible après l'application, mais elle peut être retardée de 8 à 24 heures selon les recommandations du fabricant. La seconde incorporation peut avoir lieu n'importe quand avant le semis. La trifluraline est activée par l'incorporation; aucune pluie n'est nécessaire.

Rémanence : Aux doses recommandées, le désherbage est assuré pour toute la saison. Les cultures suivantes, même les céréales d'automne semées dans un sol traité à la trifluraline le printemps précédent, ne sont pas endommagées sous des conditions normales.

Particularités : Forte adsorption sur les particules de sol; lessivage négligeable. La dose à épandre dépend de la richesse du sol en matière organique et en argile. Sans effet contre l'herbe à poux, la morelle annuelle ni les moutardes, sisymbres et vélars; la renouée persicaire peut échapper au traitement.

TRIFLUSULFURON-MÉTHYL

Nom commercial : UPBEET.

Groupe chimique : Sulfonylurée.

Homologation : Betteraves à sucre. En association avec BETAMIX sur les betteraves à sucre.

Mauvaises herbes sensibles : Amarante à racine rouge, amarante de Powell et abutilon.

Absorption et diffusion : Après l'application foliaire, le produit est rapidement absorbé par les feuilles et véhiculé par le xylème et le phloème jusqu'aux points végétatifs des mauvaises herbes sensibles.

Base de sélectivité : L'inhibition de l'enzyme acétolactate synthase (ALS) chez les plantes sensibles stoppe rapidement la division cellulaire et la croissance. Les espèces tolérantes convertissent rapidement l'herbicide en des métabolites non phytotoxiques.

Modes d'application : En postlevée.

Rémanence : Aucune.

Particularités : Doit être appliqué avec un système adjuvant approuvé comprenant un surfactant non ionique à raison de 0,2 % v./v. L'ajout de nitrate d'ammonium et d'urée (NAU) en solution 28 %, selon une dose de 2 L/ha, renforce l'action contre les mauvaises herbes. Les symptômes types de la mort du plant se manifestent entre 1 et 3 semaines suivant le traitement. Les symptômes apparaissent plus rapidement si les conditions de croissance sont favorables.

TABLEAU 4–3. Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate

		CULTURES TOLÉRANT LE GLYPHOSATE				DOSES DES PRODUITS À BASE DE GLYPHOSATE À UTILISER CONTRE DIFFÉRENTES MAUVAISES HERBES (L/ac)* DANS LES CULTURES DE MAÏS, DE SOYA ET DE BETTERAVE À SUCRE TOLÉRANT LE GLYPHOSATE									
Nom commercial	**Concentration garantie de matière active**	**Canola**	**Maïs de grande culture**	**Soya**	**Betterave à sucre**	**Mauvaises herbes annuelles**	**Luzerne spontanée**	**Pissenlit (>15 cm)**	**Chardon des champs**	**Liseron des champs**	**Morelle de Caroline**	**Souchet comestible**	**Laiteron des champs**	**Muhlenbergie feuillée**	**Chiendent commun (3–4 feuilles)**
CREDIT 45	450 g/L	✓	✓	✓		0,8	2,24	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	0,8	0,8	0,8
CREDIT PLUS	360 g/L	✓	✓	✓		1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
FACTOR	356 g/L	✓	✓	✓		1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
FACTOR 540	540 g/L	✓	✓	✓		0,67	1,87	1,34	0,67	1,34	1,34	1,34	0,67	0,67	0,67
GLYFOS	356 g/L	✓		✓		1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
ROUNDUP ULTRA2	540 g/L	✓	✓	✓	✓	0,67	1,87	1,34	0,67	1,34	1,34	1,34	0,67	0,67	0,67
ROUNDUP WEATHERMAX	540 g/L	✓	✓	✓	✓	0,67	1,87	1,34	0,67	1,34	1,34	1,34	0,67	0,67	0,67
SHARPSHOOTER	356 g/L					1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
SHARPSHOOTER PLUS	360 g/L	✓	✓	✓		1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
TOUCHDOWN TOTAL	500 g/L	✓	✓	✓		0,72	2	1,44	0,72	1,44	1,44	1,44	0,72	0,72	0,72
VANTAGE PLUS	360 g/L	✓	✓	✓		1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1
VANTAGE PLUS MAX II	480 g/L	✓	✓	✓		0,75	2,1	1,5	0,75	1,5	1,5	1,5	0,75	0,75	0,75
WISEUP	356 g/L					1	2,8	2	1	2	2	2	1	1	1

* Pour connaître les doses applicables au canola tolérant le glyphosate, voir en regard des différents produits, sous *Canola — Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée (uniquement pour cultivars de canola tolérant les herbicides)* au chapitre 12, p. 221.

✓= Produit homologué pour une utilisation sur cette culture.

TABLEAU 4–4. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)

Pour autres cultures, voir l'étiquette.	Grandes cultures																						
Nom commercial	**Luzerne**	**Orge**	**Orge contre-ensemencée**	**Haricots rognons**	**Haricots blancs**	**Canola**	**Canola tolérant PURSUIT**	**Trèfle rouge**	**Maïs de grande culture**	**Maïs de semence**	**Lin**	**Avoine**	**Avoine contre-ensemencée**	**Arachides**	**Seigle d'automne**	**Seigle d'automne contre-ensemencé**	**Soya**	**Tournesol**	**Tabac**	**Blé de printemps**	**Blé de printemps contre-ensemencé**	**Blé d'automne**	**Blé d'automne (avec trèfle rouge)**
	Nombre de mois entre le traitement et les plantations																						
ACCENT	**10**	**10**	**10**	eb	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	**10**
ACCENT 1-PASS[1]	**22**	**10**	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb
ACCENT TOTAL[1]	**10**	**10**	**10**	eb	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	eb
ATRAZINE <1,0 kg m.a./ha	10	10	10	10	10	22	22	10	✓	✓	10	10	10	22	10	10	10	22	22	10	10	4	10
ATRAZINE > 1,0–1,5 kg m.a./ha	22	10	22	22	22	22	22	22	✓	✓	10	22	22	22	10	22	10	22	22	10	22	10	22
BATTALION[1]	eb	**10**	eb	eb	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	**10**
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM (pH du sol > 7,8 et MO < 2 %)	10	**10**	eb	**10**	**10**	26	26	10	**10**	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	**10**	eb	**4**	eb
CALLISTO	**11**	10	eb	eb	**11**	eb	eb	22	✓	✓	eb	10	eb	eb	4	eb	**11**	eb	eb	**10**	eb	**4**	eb
CHATEAU	**11**	**11**	**11**	**9**	**9**	**9**	**9**	eb	**9**	**9**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	**9**	eb	**8**	**11**	**4**	eb
CLASSIC (pH du sol de 7,4 et moins)	**10**	**10**	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	**3**	eb
CLASSIC (pH du sol : 7,4–7,8)	22	22	eb	eb	22	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	**4**	eb
CLASSIC (pH du sol : 7,8–8,0)	22	22	eb	eb	22	eb	eb	eb	**22**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	**4**	eb
CLEAN SWEEP[1]	22	10	22	**10**	**10**	22	10	22	**10**	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	10	22	**3,3**	22
COMMAND 360 ME	**16**	**16**	**16**	**10**	**10**	**10**	**10**	**16**	**10**	**10**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	✓	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
CONQUEST LQ[1]	22	10	22	22	22	22	22	22	10	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	**10**	22	**4**	22
CONVERGE FLEXX[1]	**10**	**10**	eb	eb	eb	**10**	**10**	eb	✓	**10**	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	**10**	eb	**4**	eb

✓ = Homologué pour cette utilisation.

eb = Essai biologique en conditions réelles; l'utilisateur assume la responsabilité de toutes les cultures ne figurant pas sur l'étiquette.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

[4] Destiné uniquement aux hybrides de maïs de grande culture tolérant le glyphosate (ROUNDUP READY).

Les nombres **en GRAS** indiquent que la restriction (en mois) relative aux cultures est prévue sur l'étiquette du produit. Les nombres qui ne sont pas en gras indiquent que la restriction (en mois) repose sur les données existantes les plus fiables et qu'il faut communiquer avec le fabricant du produit pour plus d'information.

TABLEAU 4–4. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol) (suite)

Pour autres cultures, voir l'étiquette.	Grandes cultures																					
Nom commercial	**Luzerne**	**Orge**	**Orge contre-ensemencée**	**Haricots rognons**	**Haricots blancs**	**Canola**	**Canola tolérant PURSUIT**	**Trèfle rouge**	**Maïs de grande culture**	**Maïs de semence**	**Lin**	**Avoine**	**Avoine contre-ensemencée**	**Arachides**	**Seigle d'automne**	**Seigle d'automne contre-ensemencé**	**Soya**	**Tournesol**	**Tabac**	**Blé de printemps**	**Blé de printemps contre-ensemencé**	**Blé d'automne**	**Blé d'automne (avec trèfle rouge)**
	Nombre de mois entre le traitement et les plantations																						
FIRSTRATE	**9**	eb	eb	**9**	**9**	**26**	**26**	eb	**9**	eb	eb	eb	eb	**9**	eb	eb	✓	**30**	**30**	eb	eb	**4**	eb
GALAXY[1]	eb	**10**	eb	eb	**10**	**10**	eb	**10**	✓[4]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	eb
INFINITY	**10**	✓	eb	eb	eb	**10**	**10**	eb	**10**	eb	**10**	**10**	**10**	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	✓	eb	✓	eb
IMPACT	eb	eb	eb	**eb**	**10**	eb	eb	eb	✓	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**10**	**eb**	**eb**	**10**	**eb**	**4**	eb
LONTREL	22	**10**	22	22	22	✓	✓	22	10	22	**10**	**10**	22	22	10	22	22	22	22	**10**	22	**10**	22
MILESTONE	48	10	10	48	48	10	10	48	10	10	10	10	10	10	eb	10	48	48	48	10	10	10	10
MUSTER	**22**	**10**	eb	eb	**22**	✓	✓	**22**	eb	eb	**10**	**10**	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	**10**	eb	4	eb
OPTION 1.2.3.	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	22	22	22	✓	eb	eb	**10**	10	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	10	10	**4**	**10**
OPTION 2.25 OD	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	**10**	10	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	**10**	10	**4**	**10**
PEAK PLUS[1]	**22**	**10**	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	✓	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb
PURSUIT	✓	10	22	✓	✓	22	✓	22	**10**	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	10	22	**3,3**	22
PRISM	eb	**10**	eb	eb	**10**	10	10	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	**10**
REFLEX	eb	eb	eb	✓	✓	**18**	**18**	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	**10**	eb	**4**	eb
SENCOR (pH du sol > 7,5)	**10**	10	10	10	10	22	22	10	✓	10	10	10	10	10	10	10	✓	10	22	10	10	3,3	10
SIMAZINE/PRINCEP <2 kg m.a./ha	✓	10	10	22	22	22	22	22	✓	10	22	10	10	10	10	10	22	22	22	10	10	10	10
SIMAZINE/PRINCEP >2 kg m.a./ha	✓	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ULTIM	eb	10	eb	eb	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	eb

✓ = Homologué pour cette utilisation.
eb = Essai biologique en conditions réelles; l'utilisateur assume la responsabilité de toutes les cultures ne figurant pas sur l'étiquette.
[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.
[4] Destiné uniquement aux hybrides de maïs de grande culture tolérant le glyphosate (ROUNDUP READY).

Les nombres **en GRAS** indiquent que la restriction (en mois) relative aux cultures est prévue sur l'étiquette du produit. Les nombres qui ne sont pas en gras indiquent que la restriction (en mois) repose sur les données existantes les plus fiables et qu'il faut communiquer avec le fabricant du produit pour plus d'information.

TABLEAU 4–4. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol) (suite)

Pour autres cultures, voir l'étiquette.	Grandes cultures																					
Nom commercial	**Luzerne**	**Orge**	**Orge contre-ensemencée**	**Haricots rognons**	**Haricots blancs**	**Canola**	**Canola tolérant PURSUIT**	**Trèfle rouge**	**Maïs de grande culture**	**Maïs de semence**	**Lin**	**Avoine**	**Avoine contre-ensemencée**	**Arachides**	**Seigle d'automne**	**Seigle d'automne contre-ensemencé**	**Soya**	**Tournesol**	**Tabac**	**Blé de printemps**	**Blé de printemps contre-ensemencé**	**Blé d'automne**	**Blé d'automne (avec trèfle rouge)**
	Nombre de mois entre le traitement et les plantations																						
ULTIM TOTAL[1]	eb	**10**	eb	eb	**10**	**10**	**10**	**10**	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**4**	eb
VALTERA	**11**	**11**	**11**	**9**	**9**	**9**	**9**	eb	**9**	**9**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	**9**	eb	**8**	**11**	**4**	eb

✓ = Homologué pour cette utilisation.

eb = Essai biologique en conditions réelles; l'utilisateur assume la responsabilité de toutes les cultures ne figurant pas sur l'étiquette.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

[4] Destiné uniquement aux hybrides de maïs de grande culture tolérant le glyphosate (ROUNDUP READY).

Les nombres **en GRAS** indiquent que la restriction (en mois) relative aux cultures est prévue sur l'étiquette du produit. Les nombres qui ne sont pas en gras indiquent que la restriction (en mois) repose sur les données existantes les plus fiables et qu'il faut communiquer avec le fabricant du produit pour plus d'information.

TABLEAU 4–5. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)

Pour autres cultures, voir l'étiquette.	Cultures horticoles																											
Nom commercial	**Asperge**	**Haricot de Lima**	**Haricot mange-tout**	**Betterave rouge**	**Betterave à sucre**	**Brocoli**	**Choux de Bruxelles**	**Chou**	**Carotte**	**Chou-fleur**	**Céleri**	**Maïs sucré**	**Concombre**	**Ail**	**Fines herbes**	**Laitue**	**Melon brodé**	**Oignon**	**Panais**	**Pois**	**Poivron**	**Pomme de terre**	**Citrouille**	**Rutabaga**	**Épinard**	**Courge**	**Tomate repiquée**	**Melon d'eau**
	Nombre de mois entre le traitement et les plantations																											
ACCENT	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	10	eb
ACCENT 1-PASS[1]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
ACCENT TOTAL[1]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	10	eb
ATRAZINE <1,0 kg m.a./ha	22	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	10	22	10	22	22	22	22	10	22
ATRAZINE >1,0–1,5 kg m.a./ha	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
BATTALION[1]	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	10	eb
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM (pH du sol > 7,8 et MO < 2 %)	eb	**10**	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	22	22	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	22	22	eb	eb	eb	eb	26	eb
CALLISTO	eb	22	22	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb		eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	22	eb	11	eb	eb	eb	eb	11	eb
CHATEAU	✓	**9**	**9**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	eb	eb
CLASSIC (pH du sol de 7,0 et moins)	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	11	eb	eb	eb	11	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	11	eb	eb	eb	eb	eb	eb	12	eb
CLASSIC (pH du sol de 7,0 à 8,0)	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	12	eb
CLEAN SWEEP[1]	22	22	22	eb	eb	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	22
COMMAND 360 ME	16	16	10	16	16	10	16	16	16	16	16	10	10	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	16	16	10	16	16
CONQUEST LQ[1]	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
CONVERGE FLEXX[1]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
FIRSTRATE	eb	eb	9	9	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	18	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	9	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
GALAXY[1]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	**10**	eb
INFINITY	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
IMPACT	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**	**eb**
LONTREL	22	22	22	22	eb	✓	22	✓	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22
MILESTONE	eb	48	48	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	48	48	eb	eb	eb	eb	eb	48	eb

✓= Homologué pour cette utilisation.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

eb = Essai biologique en conditions réelles; l'utilisateur assume la responsabilité de toutes les cultures ne figurant pas sur l'étiquette.

Les nombres **en GRAS** indiquent que la restriction (en mois) relative aux cultures est prévue sur l'étiquette du produit. Les nombres qui ne sont pas en gras indiquent que la restriction (en mois) repose sur les données existantes les plus fiables et qu'il faut communiquer avec le fabricant du produit pour plus d'information.

TABLEAU 4–5. Restrictions (rotation des cultures et pH du sol) (suite)

Pour autres cultures, voir l'étiquette.	Cultures horticoles																											
Nom commercial	**Asperge**	**Haricot de Lima**	**Haricot mange-tout**	**Betterave rouge**	**Betterave à sucre**	**Brocoli**	**Choux de Bruxelles**	**Chou**	**Carotte**	**Chou-fleur**	**Céleri**	**Maïs sucré**	**Concombre**	**Ail**	**Fines herbes**	**Laitue**	**Melon brodé**	**Oignon**	**Panais**	**Pois**	**Poivron**	**Pomme de terre**	**Citrouille**	**Rutabaga**	**Épinard**	**Courge**	**Tomate repiquée**	**Melon d'eau**
	Nombre de mois entre le traitement et les plantations																											
MUSTER	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
OPTION 1.2.3.	eb	eb	eb	eb	**22**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
OPTION 2.25 OD	eb	eb	eb	eb	10	eb	10	10	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb
PEAK PLUS[1]	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	**10**	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb
PRISM	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	✓	eb	eb	eb	eb	✓	eb
PURSUIT	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	✓	22	22	22	22	22	22	22	22
REFLEX	eb	eb	✓	18	18	18	18	18	eb	18	eb	18	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	18	eb	eb	eb	eb
SENCOR (pH du sol > 7,5)	✓	10	10	22	22	22	22	22	10	22	22	10	22	10	10	22	22	22	10	10	22	✓	22	22	22	22		22
SIMAZINE/PRINCEP <2 kg m.a./ha	22	22	22	10	22	22	22	22	22	22	22	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
SIMAZINE/PRINCEP >2 kg m.a./ha	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ULTIM	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb
ULTIM TOTAL[1]	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb	eb	eb	eb	eb	10	eb
VALTERA	12	9	9	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	eb	12	eb	eb	eb	12	eb	eb	eb	eb	eb	eb

✓= Homologué pour cette utilisation.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

eb = Essai biologique en conditions réelles; l'utilisateur assume la responsabilité de toutes les cultures ne figurant pas sur l'étiquette.

Les nombres **en GRAS** indiquent que la restriction (en mois) relative aux cultures est prévue sur l'étiquette du produit. Les nombres qui ne sont pas en gras indiquent que la restriction (en mois) repose sur les données existantes les plus fiables et qu'il faut communiquer avec le fabricant du produit pour plus d'information.

SERVICE D'ESSAI BIOLOGIQUE EN CONDITIONS RÉELLES :

A&L Laboratories offre un service d'essai biologique pour aider les producteurs dans le choix des cultures à inclure dans leurs rotations.

Pour plus d'information, communiquer avec :

A & L Laboratories Canada Ltd., 2136, ch. Jet Stream,
London (Ontario), N5V 3P5
www.alcanada.com

TABLEAU 4–6. Classement des herbicides utilisés en Ontario

Gr[1]	Site d'action	Produits à mode d'action unique (par ordre alphabétique)	Mauvaises herbes résistantes confirmées en Ontario en décembre 2009
1	Inhibiteurs de la carboxylase acétyl-CoA (ACCase)	ACCLAIM SUPER, ACHIEVE, ASSURE II, EXCEL SUPER, POAST, PUMA ADVANCE, PUMA[120] SUPER, SELECT, ULTRA, VENTURE	Aucune confirmée actuellement
2	Inhibiteurs de l'acétolactate synthase (ALS) aussi appelée acétohydroxyacide synthase (AHAS)	ACCENT, ARSENAL, CLASSIC, ELIM EP, FIRSTRATE, MUSTER, OPTION 2.25 OD, PINNACLE, PRISM, PURSUIT, REFINE SG, TELAR, ULTIM, UPBEET	Lampourde, petite herbe à poux, morelle noire de l'Est, sétaire géante, sétaire verte, amarante de Powell, chénopode blanc, amarante à racine rouge, *Amaranthus rudis*
3	Inhibiteurs de l'assemblage des microtubules	BONANZA, DACTHAL W-75, DIMENSION, PROWL, RIVAL, TREFLAN	Aucune confirmée actuellement
4	Auxines synthétiques	2,4-D, BANVEL II, CALIBER, COBUTOX, COMPITOX, COVITOX PLUS, DESORMONE, DIPHENOPROP, DYCLEER, DYVEL, EMBUTOX, ESTAPROP PLUS, GARLON, IPCO DICHLORPROP-D, IPCO PREMIUM 2-WAY XP TURF HERBICIDE, KILLEX, LONTREL, MCPA, MECOPROP, MECOCROP 2,4-D, MECO-D, PAR III, IPCO PREMIUM 3-WAY XP TURF HERBICIDE, RELEASE, SWORD, TARGET, TOPSIDE, TORDON 101, TROPHY, TURF-RITE 2+2, TURBOPROP, VANQUISH	Carotte sauvage
5	Inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, Site A	AATREX LIQUID 480, ATRAZINE, GESAGARD, HYVAR X, PRINCEP, PRONONE, PYRAMIN FL, SENCOR, SIMADEX, SIMAZINE, SINBAR, VELPAR	Échinochloa pied-de-coq, séneçon vulgaire, chénopode blanc, petite herbe à poux, ansérine, amarante à racine rouge, *Amaranthus rudis*, moutarde des champs, panic capillaire, sétaire glauque
6	Inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, Site B	BASAGRAN, BASAGRAN FORTÉ, KORIL, PARDNER, BROTOX	Amarante de Powell
7	Inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, Site B (autre site de liaison)	DIUREX 80W, KARMEX, LOROX	Amarante de Powell, amarante hybride
8	Conjugaison de la coenzyme acétyle A	BETASAN, ERADICANE, EPTAM, RO-NEET	Aucune confirmée actuellement
9	Inhibiteurs de 5-enolpyruvylshikimimate-3-phosphate synthase (EPSP)	CREDIT, CREDIT PLUS, EZJECT, FACTOR, FACTOR 540, GLYFOS, MAVERICK III, ROUNDUP ULTRA II, ROUNDUP WEATHERMAX, SHARPSHOOTER, SHARPSHOOTER PLUS, TOUCHDOWN TOTAL, VANTAGE, VANTAGE PLUS, VANTAGE PLUS MAX, VANTAGE PLUS MAX II, VISION, VISION MAX	Aucune confirmée actuellement
10	Inhibiteurs de la glutamine synthétase	IGNITE, LIBERTY	Aucune confirmée actuellement
11	Inhibiteurs de la biosynthèse des caroténoïdes	AMITROL	Aucune confirmée actuellement
13	Inhibiteurs de la synthèse des diterpènes	COMMAND 360	Aucune confirmée actuellement
14	Inhibiteurs de la protoporphyrinogène oxydase (Protox)	AIM EC, BLAZER, GOAL, REFLEX, VALTERA	Aucune confirmée actuellement
15	Conjugaison de la coenzyme acétyle A	DEVRINOL, DUAL MAGNUM, DUAL II MAGNUM, FRONTIER MAX	Aucune confirmée actuellement
19	Inhibiteurs du mode de transport de l'auxine	ALANAP	Aucune confirmée actuellement

TABLEAU 4–6. Classement des herbicides utilisés en Ontario (suite)

Gr[1]	Site d'action	Produits à mode d'action unique (par ordre alphabétique)	Mauvaises herbes résistantes confirmées en Ontario en décembre 2009
20	Inhibiteurs de la synthèse des parois cellulaires, Site A	CASORON	Aucune confirmée actuellement
22	Photosystème I — diffraction des électrons	GRAMOXONE, REGLONE, REWARD	Vergerette du Canada, lépidie des champs
27	Inhibiteurs de la dioxygénase du pyruvate de p-hydroxyphényle (HPPD)	CALLISTO, CONVERGE FLEXX, IMPACT	Aucune confirmée actuellement

Classement des herbicides destinés à être prémélangés et des produits vendus en emballages combinés

Nom commercial du prémélange ou de l'emballage combiné	Composante 1 (classement de la WSSA)	Composante 2 (classement de la WSSA)	Composante 3 (classement de la WSSA)
ACCENT 1-PASS[3]	ACCENT (2)	PEAK (2)	BANVEL II (4)
ACCENT TOTAL[3]	ACCENT (2)	DISTINCT (4)	
BATTALION[3]	ELIM EP (2)	BANVEL II (4)	DUAL II MAGNUM (15)
BOUNDARY[3]	SENCOR (5)	DUAL II MAGNUM (15)	
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM	flumetsulam (2)	métolachlore (15)	
BUCTRIL M, BADGE, LOGIC M OU MEXTROL	MCPA (4)	bromoxynil (6)	
CLEANSWEEP[3]	PURSUIT (2)	BASAGRAN FORTÉ (6)	
CONQUEST LQ[3]	PURSUIT (2)	SENCOR (5)	
CONVERGE XT[3]	CONVERGE 480 (5)	CONVERGE FLEXX (27)	
DISTINCT	dicamba (4)	diflufenzopyr (19)	
GALAXY[3]	ELIM EP (2)	ROUNDUP WEATHERMAX (9)	
GARDIEN[3]	CLASSIC (2)	TOUCHDOWN TOTAL (9)	
HALEX GT	glyphosate (9)	mésorione (27)	s-métolachlore/benoxacor (15)
INFINITY	bromoxynil (6)	Pyrasulfotole (27)	
KROVAR	bromacil (5)	diuron (7)	
LADDOK	atrazine (5)	bentazone (6)	
MARKSMAN, PROPERO	dicamba (4)	atrazine (5)	
PEAKPLUS[3]	PEAK (2)	BANVEL II (4)	
PRIMEXTRA II MAGNUM	atrazine (5)	s-métolachlore/benoxacor (15)	
SHOTGUN	2,4-D (4)	atrazine (5)	
TROPHY	TROPHY A (4)	TROPHY B (4)	
ULTIM TOTAL[3]	ULTIM (2)	DISTINCT (4)	

[1] Le classement des herbicides utilisés en Ontario reprend le classement accepté à l'échelle nationale de la Weed Science Society of America. Les groupes 12, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 25 et 26 ne sont pas offerts en Ontario.

[2] Les noms des composantes des produits ayant plus d'un site d'action sont suivis d'un nombre représentant le groupe auquel elles appartiennent.

[3] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

TABLEAU 4–7. Intervalle entre traitement et pluie (postlevée)

Un traitement herbicide de postlevée risque de perdre de son efficacité s'il est suivi d'une pluie. Cet effet varie selon l'herbicide, la préparation, le laps de temps et les conditions d'assèchement avant la pluie ainsi que la quantité, l'intensité et la durée de la pluie. Les renseignements ci-dessous sont fondés sur l'information portée par l'étiquette des différents produits ainsi que sur les précisions communiquées par les fabricants. Pour en savoir plus, s'adresser au fabricant. Dans le cas d'un mélange en cuve de plusieurs spécialités, c'est l'intervalle le plus long qu'il faut considérer.

0 à 15 minutes	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures	4 heures (suite)	6 heures
DIMENSION	ACHIEVE	2,4-D Ester	ACCLAIM SUPER	2,4-D amine	PEAKPLUS[1]	AMITROL 240
GRAMOXONE	ASSURE II	ACCENT	CALLISTO	ACCENT 1-PASS[1]	PINNACLE	BASAGRAN
DÉFANANT REGLONE	BADGE	AIM EC ou CLEANSTART PLUS	GOAL 2XL	ACCENT-TOTAL[1]	PROPERO	BASAGRAN FORTÉ
REWARD	BROTEX	atrazine	SWORD	BANVEL II	REFINE M	BLAZER
	BUCTRIL M	CLASSIC	TARGET	BATTALION[1]	REFLEX	CLEANSWEEP[1]
	CALIBER	DICHLORPROP D		CLOVITOX PLUS	SAVAGE	CREDIT
	COBUTOX	ESTAPROP PLUS		CREDIT PLUS	TORDON 101	FACTOR 540
	ECOCLEAR	FIRSTRATE		DISTINCT	TRANSLINE	GLYFOS
	EMBUTOX	GALAXY[1]		DYCLEER	TROPOTOX PLUS	LADDOK
	EXCEL SUPER	IMPACT		DYVEL	TOPSIDE	MCPA sodium
	HALEX GT	MCPA ester		IGNITE	TROPHY[1]	PYRAMIN FL
	INFINITY	OPTION 2.25 OD et OPTION 1.2.3.		LIBERTY 200 SN	UPBEET	ROUNDUP
	KORIL	PRISM		LONTREL	VANQUISH	SENCOR
	MEXTROL	PURSUIT		MARKSMAN	VANTAGE PLUS	VANTAGE
	PARDNER	SHOTGUN		MCPA amine		
	POAST ULTRA	TORDON 101		MUSTER		
	PUMA120 SUPER	TURBOPROP				
	REFINE SG	ULTIM				
	ROUNDUP ULTRA2 et WEATHERMAX	VENTURE L				
	SELECT					
	TOUCHDOWN TOTAL					
8 heures	**24 heures**					
LOROX	MECOTURF plus 2,4-D					

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous ce nom commercial.

5. NOTES SUR LES ADJUVANTS

Introduction

On entend par « adjuvant » toute substance qu'on ajoute à la bouillie pour modifier et améliorer l'efficacité de l'herbicide.

Les adjuvants sont des constituants importants des solutions à pulvériser et leur absence peut compromettre l'efficacité d'un traitement. Dans certains cas, l'adjuvant est compris dans la préparation du produit. Dans d'autres cas, il appartient à l'utilisateur de l'ajouter. Le choix de l'adjuvant est un facteur clé dans l'atteinte d'un équilibre entre une lutte optimale contre les mauvaises herbes et la préservation de la culture. Dans certains cas, la dose de l'adjuvant varie selon les conditions météorologiques, le stade de croissance, l'espèce de mauvaises herbes, la qualité de l'eau, etc. Certaines étiquettes d'herbicide recommandent des types particuliers d'adjuvants. Toujours utiliser les adjuvants conformément au mode d'emploi indiqué sur l'étiquette.

La plupart des recommandations relatives aux adjuvants, qui sont données dans la présente publication, expriment la quantité (en litres) ajoutée à 1000 L de bouillie (L/1000 L). Pour obtenir un pourcentage en volume/volume (v/v), utiliser le facteur de conversion suivant :

10 L/1000 L = 1 % v/v

Il y a deux grandes catégories d'adjuvants :

- les activateurs et les modificateurs de bouillie; et
- les modificateurs d'utilité.

Activateurs et modificateurs de bouillie

- Les **surfactants** (aussi désignés « agents de surface ») forment la plus grande catégorie d'adjuvants. Les surfactants peuvent être non ioniques, anioniques, cationiques ou amphotériques. La plupart des surfactants sont non ioniques (SNI), c.-à-d. qu'ils ne s'ionisent pas. Un SNI sert à améliorer la pénétration de l'herbicide à l'intérieur d'une cuticule cireuse. Les agents mouillants et les détergents sont essentiellement anioniques et lorsqu'ils sont ionisés dans la solution, la portion soluble dans l'eau se trouve chargée négativement. Les surfactants cationiques affichent une charge positive nette dans la solution. Les surfactants amphotériques peuvent être tantôt anioniques, tantôt cationiques. Les surfactants cationiques et amphotériques ne sont pas beaucoup utilisés dans les produits chimiques agricoles.

- Les **huiles** dissolvent la couche cuticulaire cireuse de la surface foliaire d'une mauvaise herbe afin de faciliter sa pénétration par la bouillie. Les huiles sont des huiles minérales raffinées (à base de pétrole) ou des huiles végétales. On classe les huiles végétales en triglycérides, en huiles végétales méthylées (HVM) ou en concentrés d'huile (CH). Les concentrés d'huile sont une combinaison d'huiles végétales et de surfactants.

- Les **mouillants** sont des agents qui réduisent la tension superficielle afin d'assurer un contact plus étroit entre la bouillie et la surface traitée (feuille, etc.) Le mouillant augmente l'adhésion de l'herbicide à la surface de la feuille.

Modificateurs d'utilité

- Les **agents de compatibilité** améliorent le mélange, surtout lorsqu'on utilise un engrais liquide comme support.
- Les **agents anti-dérive** augmentent la taille des gouttelettes afin de réduire la dérive.
- Les **agents antimoussants/démoussants** diminuent et préviennent la formation de mousse dans la cuve du pulvérisateur.
- Les **agents moussants** sont utilisés avec du matériel spécialisé pour produire et appliquer une mousse.
- Les **agents tampons** peuvent servir à accroître la solubilité ou à régler le pH d'une solution.
- Les **teintures** sont utilisées pour rendre plus visibles les solutions moussantes pulvérisées.

Remarque

Les notes ci-dessous complètent les recommandations données plus loin dans la présente publication au sujet de l'utilisation et de la toxicité des herbicides, et des précautions à prendre. À part quelques exceptions, les adjuvants sont inscrits sous leur nom commercial. Voir le tableau 5–1, *Adjuvants utilisés en Ontario*, p. 82, pour la liste des adjuvants énumérés dans ce guide.

On trouve de l'information complète relative à chaque adjuvant sur l'étiquette apposée sur le contenant du produit. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (un organisme fédéral) présente sur son site Web les étiquettes des pesticides sur son site Web à www.pmra-arla.gc.ca.

De nombreux fabricants reproduisent également les étiquettes et/ou les fiches signalétiques des produits

sur leurs sites Web dont les adresses se trouvent à la dernière page de cette publication.

ADOUCISSEURS D'EAU
Voir AQUASOFT, CHOICE.

AGENTS ANTI-DÉRIVE
Voir ON TARGET, VALID.

AGENTS DE COMPATIBILITÉ
Voir ALLIANCE 400, UNITE.

AGENTS TAMPONS
Voir AQUA-STABLE.

AGRAL 90
Type d'adjuvant : Surfactant non ionique.
Composition chimique : Nonoxinol (90 %).
Usages homologués : Avec REGLONE, le glyphosate*, PURSUIT, ACCENT, ULTIM et d'autres produits indiqués sur l'étiquette. Aussi utilisé pour nettoyer les réservoirs et l'équipement du pulvérisateur.
Propriété : Renforce l'action chimique.
Mode d'action : C'est un agent mouillant qui permet à la bouillie de mieux s'étaler sur les plantes.
Mélange : Utiliser 200–2500 mL par 1000 L d'eau, comme l'étiquette le spécifie. Se mélange avec toutes les sortes d'eau. Ajouter AGRAL 90 à la bouillie et agiter à fond. Avec le glyphosate, utiliser 350 mL/50–100 L d'eau contre le chiendent commun dans un système de culture sans travail du sol ou avec travail réduit du sol, ou dans des jachères. Utiliser 500 mL/100 L contre le chiendent commun si l'on utilise des volumes d'eau élevés (c.-à-d. de 150 à 300 L/ha).
Particularités : Ne pas dépasser les doses recommandées d'AGRAL 90, car une trop grande quantité d'agent mouillant peut causer une perte de bouillie à cause d'un ruissellement excessif.

AG-SURF
Type d'adjuvant : Surfactant non ionique.
Composition chimique : Nonoxinol (92 %).
Usages homologués : Avec le glyphosate, PURSUIT et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.
Propriété : Renforce l'action chimique.
Mode d'action : C'est un agent mouillant qui améliore l'étalement des mélanges pulvérisés.
Mélange : Avec ROUNDUP : pour une application de 2,5 L d'eau/ha, ajouter AG-SURF à raison de 0,5 % (0,50 L/100 L d'eau) pour maintenir la bonne concentration de surfactant. Avec ROUNDUP pour maîtriser les dicotylédones et graminées annuelles dans un système de culture sans travail du sol ou avec travail réduit du sol : utiliser 350 mL d'AG-SURF/ha et 1,1 L de ROUNDUP/ha dans 50–100 L d'eau propre/ha.
Particularités : Ne pas dépasser les doses recommandées d'AG-SURF, sous peine de réduire l'efficacité de l'herbicide, à cause d'un ruissellement excessif. Voir l'étiquette du produit pour plus de détails.

ALLIANCE 400
Type d'adjuvant : Agent de compatibilité.
Composition chimique : Ester phosphorique aliphatique, isopropanol et éthers glycoliques 69 %.
Propriété : Émulsifie et disperse les engrais liquides et les pesticides émulsionnables dans la solution pour produire des mélanges en cuve uniformes.
Mélange : Mélanger 60–375 mL de ALLIANCE/100 L de solution selon l'engrais et le nombre de pesticides. Ajouter ALLIANCE à la solution fertilisante avant d'ajouter le pesticide.

AMIGO
Type d'adjuvant : Surfactant.
Composition chimique : Ester phosphorique tensioactif (30 %).
Usages homologués : En association avec SELECT et dans les mélanges en cuve à base de SELECT.
Propriété : Améliore l'efficacité chimique de l'herbicide dans diverses conditions de milieu.
Mode d'action : Améliore l'étalement des microgouttelettes de bouillie à la surface des feuilles et augmente la surface de contact. Favorise la pénétration de l'herbicide à travers la cuticule des feuilles.
Mélange : Remplir la cuve à moitié d'eau et démarrer l'agitateur. Ajouter la dose voulue d'herbicide, agiter, puis ajouter la dose exacte d'AMIGO en finissant de remplir la cuve d'eau. Agiter sans cesse.

ANTIMOUSSANTS-DÉMOUSSANTS
Voir BREAKER, FIGHTER F, FLAT-OUT, HALT, VALID, ZAP.

AQUASOFT
Type d'adjuvant : Adoucisseur d'eau.
Composition chimique : Mélange exclusif d'acide hydroxycarboxylique, d'acides phosphoriques et d'acide polyacrylique de sulfate d'ammonium 63 %.
Propriété : Élimine « l'antagonisme de l'eau dure » et l'instabilité due à un pH élevé.
Mode d'action : Conditionne l'eau en séquestrant et en chélatant les ions d'eau dure et en réduisant le pH.
Mélange : 100–750 mL/100 L de bouillie, selon la dureté de l'eau. Toujours vérifier la compatibilité par un test dans un bocal.

AQUA-STABLE
Type d'adjuvant : Agent tampon.
Composition chimique : Polycarboxylate aliphatique et chlorure de calcium 28 %.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

Propriété : Abaisse le pH de la bouillie et réduit la dégradation des pesticides due aux solutions alcalines.

Mode d'action : Acidifie la bouillie et agit comme tampon.

Mélange : 60–250 mL/100 L de bouillie, selon l'alcalinité en PPM.

BREAKER

Type d'adjuvant : Antimoussant-démoussant.

Usages homologués : Pour réduire la formation de mousse pendant la préparation des mélanges en cuve.

Propriété : De petites quantités BREAKER ajoutées avant l'ajout des herbicides empêchent la mousse de se former.

Mélange : Ajouter 7 mL par 500 L de bouillie.

Particularités : Peut être ajouté une fois que de la mousse s'est formée, mais il faut alors plus de temps pour que la mousse disparaisse.

CHOICE

Type d'adjuvant : Adoucisseur d'eau.

Composition chimique : Mélange d'acides polyacrylique, hydroxycarboxylique, propionique, d'ester phosphorique et de sulfate d'ammonium.

Propriété : Élimine « l'antagonisme de l'eau dure » et l'instabilité due à un pH élevé.

Mode d'action : Conditionne l'eau en séquestrant ou en chélatant les ions d'eau dure et en réduisant le pH.

Mélange : À raison de 2,5 à 7,5 L/1000 mL d'eau.

COLORANTS

Voir IN-SIGHT.

COLORANTS HYDROSOLUBLES

Voir AQUASHADE.

COMPANION

Type d'adjuvant : Surfactant non ionique.

Composition chimique : Octylphénoxy-polyéthoxy-(9)-éthanol (70 %).

Usages homologués : En association avec le glyphosate, TELAR, MUSTER et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Renforce l'action de l'herbicide.

Mode d'action : C'est un agent mouillant qui améliore l'étalement des gouttelettes d'herbicide sur les feuilles.

Mélange : Pour lutter contre les graminées et les dicotylédones annuelles, en association avec le glyphosate, verser 450 mL de COMPANION dans 50 à 100 L d'eau/ha. Pour lutter contre les dicotylédones, en association avec TELAR, verser 100 mL de COMPANION dans 100 L d'eau. Agiter constamment la bouillie.

Particularités : Ne pas dépasser les doses recommandées de COMPANION sous peine de réduire l'efficacité de l'herbicide à cause d'un ruissellement excessif.

CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST

Type d'adjuvant : Huile minérale/surfactant (non-herbicide).

Composition chimique : Huile minérale à base de paraffine (83 %) plus mélange surfactant (17 %).

Usages homologués : Le CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST est homologué pour utilisation avec BASAGRAN, IMPACT, LADDOK et l'atrazine.

Propriété : ASSIST améliore l'activité de l'herbicide en postlevée et la régularité des résultats dans des conditions environnementales variées. Il accélère aussi le dépérissement des mauvaises herbes.

Mode d'action : Réduit l'évaporation des gouttelettes vaporisées sur la surface des feuilles, ce qui prolonge la période de pénétration de l'herbicide. Améliore la pénétration à travers la cuticule de la feuille. ASSIST permet aussi à la gouttelette vaporisée de s'étendre sur la surface de la feuille de sorte qu'une plus grande surface est couverte.

Mélange : Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié avec de l'eau et commencer l'agitation. Ajouter la quantité désirée d'herbicide et continuer le remplissage. Ajouter ASSIST en dernier lieu. Après le remplissage, continuer l'agitation. Agiter à fond après chaque arrêt au cours de la pulvérisation.

Particularités : Risque accru de brûlures topiques temporaires aux cultures par temps chaud et humide.

CONCENTRÉ D'HUILE XA

Type d'adjuvant : Huile minérale/surfactant (non-herbicide).

Composition chimique : Huile minérale à base de paraffine (83 %) plus mélange surfactant (17 %).

Usages homologués : Pour utilisation avec l'atrazine, ASSURE, BASAGRAN, LADDOCK et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Peut améliorer l'activité de l'herbicide en postlevée.

Mode d'action : Réduit l'évaporation des gouttelettes vaporisées sur la surface des feuilles et réduit la tension de surface des gouttelettes vaporisées, ce qui améliore la pénétration à travers la cuticule de la feuille.

ENHANCE, ADJUVANT NON IONIQUE POUR BOUILLIE

Type d'adjuvant : Adjuvant non ionique à usages multiples.

Composition chimique : Éthoxylate de triglycéride (80 %).

Usages homologués : En association avec le glyphosate*, REGLONE, PURSUIT, ACCENT, ULTIM, REFINE et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Améliore l'efficacité du produit.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

Mode d'action : C'est un adjuvant dont les différents modes d'action améliorent le pouvoir mouillant, d'étalement et de pénétration du produit.

Mélange : Utiliser 200–2500 mL/1000 L d'eau comme l'indique l'étiquette. Bien mélanger avec toutes les sortes d'eau. Ajouter AGRAL 90 à la bouillie et bien agiter. Avec ROUNDUP et d'autres glyphosates, utiliser 350 mL/50–100 L d'eau contre le chiendent commun dans un système de culture sans travail du sol ou avec travail réduit du sol, ou dans des jachères. Utiliser 500 mL/100 L contre le chiendent commun pour des volumes d'eau de 150 à 300 L/ha).

Particularités : ENHANCE ne contient pas d'éthoxylate de nonylphénol (ENP). Ne pas dépasser les doses recommandées d'ENHANCE, car son utilisation en trop grande quantité peut provoquer un ruissellement.

FIGHTER F

Type d'adjuvant : Antimoussant-démoussant.

Composition chimique : Diméthylpolysiloxane (10 %).

Usages homologués : Limiter la formation de mousse dans les bouillies à base d'eau, d'huile, de fertilisants et de pesticides.

Propriété : Limite la formation de mousse pendant la préparation des bouillies, élimine la perte de matériel, permet un dosage plus précis et prévient les débordements de mousse sur les lieux de remplissage.

Mélange : Pendant la préparation de la bouillie, ajouter le démoussant juste avant ou pendant l'addition de tout autre adjuvant. Pour dissiper la mousse, ajouter l'agent antimoussant dans le réservoir et faire circuler la bouillie jusqu'à ce que la mousse se dissipe.

FLAT-OUT

Type d'adjuvant : Antimoussant-démoussant.

Composition chimique : Diméthylpolysiloxane (20 %). Base de silicone neutre.

Usages homologués : Pour limiter la formation de mousse ou dissiper la mousse, utiliser en prémélange ou ajouter pendant le remplissage de la cuve.

Propriété : En limitant la formation de mousse, assure un remplissage plus rapide et l'utilisation des bons volumes et prévient les débordements de produits chimiques, ce qui concourt à une application plus précise. Facilite aussi le nettoyage.

Mélange : Ajouter 5–10 mL/100 L de solution. Régler la quantité nécessaire au cas par cas. Peut être utilisé avant de mélanger la bouillie pour prévenir la formation de mousse ou après pour dissiper la mousse. Peut être utilisé avec tout herbicide, à moins de contre-indication sur l'étiquette.

HALT

Type d'adjuvant : Démoussant.

Composition chimique : Base de silicone, neutre.

Usages homologués : Pour réduire la formation de mousse pendant la préparation des mélanges en cuve.

Propriété : La réduction de la mousse permet de remplir la cuve du volume exact de bouillie plus rapidement, de diminuer le risque de débordement et d'assurer une application plus exacte d'herbicide.

Mélange : À raison de 7 mL par 500 L de bouillie. HALT peut être ajouté dans le réservoir pendant le remplissage pour éviter la formation de mousse ou après pour dissiper la mousse.

Particularités : Cet agent antimoussant peut être utilisé avec n'importe quel herbicide à moins d'indications contraires sur l'étiquette.

HASTEN NT

Type d'adjuvant : Huile végétale estérifiée non-ionique.

Composition chimique : Oléates de méthyle et d'éthyle (71,44 %).

Usages homologués : En association avec REFINE SG.

Propriété : Améliore l'assimilation de l'herbicide.

Mélange : Utiliser 5 L/1000 L de bouillie.

IN-SIGHT

Type d'adjuvant : Colorant marqueur de mousse.

Matière active : Colorant, surfactants et agents de couplage.

Usages : Comme colorant pour les marqueurs de mousse et comme colorant marqueur pour les traitements des pelouses.

Propriété : Permet aux systèmes de marquage de mousse d'être plus visibles dans des conditions de mauvaise visibilité dues à une faible intensité lumineuse, à l'abondance des débris, au semis direct, à la neige ou au brouillard.

Mélange : Utiliser 15–30 mL/100 L de bouillie.

HUILE

Voir HUILE MINÉRALE.

HUILE MINÉRALE/ SURFACTANT (NON HERBICIDE)

Voir CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST, KORNOIL, KORNOIL CONCENTRÉ, CONCENTRÉ D'HUILE XA.

KORNOIL

Type d'adjuvant : Huile minérale (non herbicide).

Composition chimique : Huile minérale (98,5 %), émulsifiant (1,5 %).

Usages homologués : (Culture/herbicide) Maïs/atrazine.

Propriété : Améliore l'activité de l'atrazine en postlevée.

Mode d'action : Dissout partiellement la cuticule cireuse des mauvaises herbes, permettant à l'atrazine de pénétrer plus aisément.

Mélange : Remplir d'eau le réservoir en laissant de la place pour ajouter ensuite l'atrazine et l'huile; commencer l'agitation et verser la bouillie d'atrazine déjà préparée; ajouter le KORNOIL en dernier. Éviter une agitation excessive du mélange, qui risquerait de coaguler.

Particularités : Pour prévenir l'accumulation d'huile dans le pulvérisateur, vider le réservoir aussi complètement que possible avant de le remplir à nouveau. La culture peut manifester des signes de dommages lorsqu'elle subit un stress (froid ou temps chaud et sec).

KORNOIL CONCENTRÉ

Type d'adjuvant : Huile minérale/surfactant (non herbicide).

Composition chimique : Huile minérale à base de paraffine (85 %) et mélange de surfactant (15 %).

Usages homologués : Ajouter à des bouillies atrazine/eau et appliquer en postlevée sur le maïs.

Propriété : Améliore l'activité de l'atrazine en postlevée.

Mode d'action : Dissout partiellement la cuticule cireuse des mauvaises herbes, permettant à l'atrazine de pénétrer plus aisément. Réduit aussi l'évaporation et améliore l'étalement des gouttelettes de pulvérisation sur la surface de la feuille, allongeant ainsi la période de pénétration.

Mélange : Éviter une agitation violente; remplir partiellement le pulvérisateur, ajouter la bouillie d'atrazine, ajouter KORNOIL CONCENTRÉ en dernier.

Particularités : Risque de dommages à la culture par temps froid et pluvieux.

LI700

Type d'adjuvant : Surfactant non ionique et agent d'équilibration du pH ou acidifiant.

Composition chimique : Phosphatidylcholine, acide méthylacétique et éther de polyoxyéthylène-alkyle (80 %).

Usages homologués : Comme surfactant pénétrant; comme agent d'équilibration du pH et acidifiant; avec des produits à base de glyphosate, LI700 neutralise ou acidifie légèrement la bouillie et empêche que ne se produise dans le réservoir du pulvérisateur la dégradation par hydrolyse des produits réagissant au pH. Ajouter LI700 avant le pesticide.

Propriété : Renforce l'action chimique.

Mélange : Comme surfactant pénétrant : utiliser 5 L/1000 L de bouillie ou 500 mL/100 L de bouillie. Comme agent d'équilibration du pH ou acidifiant : pour l'eau très alcaline (pH d'au moins 8), utiliser de 625 mL à 1,25 L/1000 L de bouillie.

MARQUEURS DE MOUSSE

Voir TRAMLINE, TREKKER TRAX.

MERGE

Type d'adjuvant : Surfactant/solvant.

Composition chimique : Mélange surfactant (50 %) plus solvant (hydrocarbures) (50 %).

Usages homologués : En association avec POAST ULTRA.

Propriété : Améliore l'efficacité chimique et permet des résultats plus constants dans des conditions environnementales variées.

Mode d'action : Améliore l'étalement des gouttelettes de bouillie à la surface des feuilles et accroit la surface des zones de contact. Améliore la pénétration de l'herbicide à travers la cuticule des feuilles. Fait écran à la photodégradation du POAST ULTRA par les rayons UV.

Mélange : Remplir d'eau, à moitié, la cuve du pulvérisateur, mettre en marche l'agitateur. Ajouter la quantité requise d'herbicide et continuer l'agitation. En dernier, verser MERGE dans la cuve, et finir de remplir la cuve avec de l'eau. Agiter vigoureusement après chaque arrêt de la pulvérisation.

Particularités : Par temps chaud et humide, risque de brûlure topique passagère sur les plantes cultivées.

ON TARGET

Type d'adjuvant : Aide à la mise en place/agent anti-dérive.

Composition chimique : Polymère de polyvinyle (polyacrylamide) (30 %).

Usages homologués : En association avec la plupart des dessiccants et des pesticides sous forme de poudre mouillable hydrosoluble, dont le glyphosate, lorsqu'ils sont appliqués par aéronef ou par du matériel terrestre ordinaire.

Propriété : Améliore la mise en place et ralentit la dérive, dans le but d'atténuer les dommages aux cultures ou aux plantes adjacentes.

Mode d'action : Lorsqu'il est mélangé en cuve avec un pesticide, ON TARGET diminue la dérive en réduisant considérablement la formation de gouttelettes minuscules résultant du cisaillement.

Mélange : Verser l'eau, le pesticide et les additifs dans le réservoir et commencer l'agitation. Choisir la bonne dose. Bien agiter la bouteille avant l'usage. Injecter le liquide ON TARGET dans la conduite d'aspiration du doseur ou de la pompe de recirculation ou ajouter lentement le liquide ON TARGET en un filet très fin pendant que la bouillie est en pleine agitation, dans la zone de plus forte turbulence. On obtient ainsi une dispersion optimale du polymère dans toute la solution. Continuer l'agitation pendant au moins 2 minutes avant de pulvériser.

PRO-SURF II

Type d'adjuvant : Mouillant liquide/activateur non ionique.

Composition chimique : Alkylarylpolyoxyéthylène-glycols, acides gras libres et alcool isopropylique; 900 g/L.

Usages homologués : S'utilise avec PURSUIT, ACCENT, ASSURE II, ULTIM et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Améliore l'efficacité du produit chimique pulvérisé.

Mode d'action : Comme agent mouillant, il améliore le recouvrement.

Mélange : Bien nettoyer la cuve avant le mélange. Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter la quantité d'herbicide exigée sur l'étiquette tout en laissant l'agitateur fonctionner. S'assurer que l'herbicide est

complètement mélangé avant de passer à l'étape suivante. Ajouter lentement PRO-SURF II, tout en agitant. Finir de remplir la cuve d'eau tout en continuant l'agitation, puis agiter avant et pendant chaque application pour assurer une pulvérisation uniforme.

Particularités : Ne pas dépasser les doses recommandées de PRO-SURF II, sous peine de nuire à l'efficacité du traitement à cause d'un ruissellement excessif. Consulter l'étiquette du produit pour le mode d'emploi complet.

SIDEKICK II

Type d'adjuvant : Dispersant/activateur liquide non ionique.

Composition chimique : Alkylarylpolyoxyéthylèneglycols, acides gras libres et alcool isopropylique; 900 g/L.

Usages homologués : S'utilise avec PURSUIT, ACCENT, ASSURE II, ULTIM et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Améliore l'efficacité du produit chimique pulvérisé.

Mode d'action : Agent dispersant et mouillant qui améliore le recouvrement.

Mélange : Bien nettoyer la cuve avant le mélange. Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter la quantité d'herbicide exigée sur l'étiquette tout en laissant l'agitateur fonctionner. S'assurer que l'herbicide est complètement mélangé avant de passer à l'étape suivante. Ajouter lentement SIDEKICK II, tout en agitant. Finir de remplir la cuve d'eau tout en continuant l'agitation, puis agiter avant et pendant chaque application pour assurer une pulvérisation uniforme.

Particularités : Ne pas dépasser les doses recommandées de SIDEKICK II, sous peine de nuire à l'efficacité du traitement à cause d'un ruissellement excessif. Consulter l'étiquette du produit pour le mode d'emploi complet.

SUPER SPREADER

Type d'adjuvant : Surfactant non ionique à base de mouillant-adhésif.

Composition chimique : Éthanol octylphénoxypolyéthoxy (50 %).

Usages homologués: En association avec ACCENT, l'atrazine, BASAGRAN, MUSTER, PINNACLE, TELAR, PRISM, PYRAMIN FL, REFINE EXTRA, REFLEX, ULTIM et d'autres produits indiqués sur l'étiquette.

Propriété : Améliore la destruction des mauvaises herbes ayant atteint leur stade limite de sensibilité.

Mode d'action : Permet à la bouillie pulvérisée de former un film continu sur la surface des feuilles; rend l'herbicide plus résistant à la pluie.

Mélange : À raison de 1–2,5 L/ha. Remplir le réservoir à moitié avec de l'eau; ajouter l'herbicide en agitant continuellement; compléter le remplissage du réservoir avec de l'eau; ajouter SUPER SPREADER STICKER en maintenant une agitation continue.

Particularités : Utiliser la dose supérieure si la bouillie est à base d'eau dure.

SURE-MIX

Type d'adjuvant : Pétrole paraffinique/surfactant (non herbicide).

Composition chimique : Pétrole paraffinique (60 %) plus mélange surfactant (35,6 %).

Usages homologués : SURE-MIX est homologué pour une utilisation avec ASSURE II et CLASSIC plus PINNACLE lorsque mélangé en cuve avec ASSURE II.

Propriété : L'utilisation de SURE-MIX renforce l'activité de ASSURE II et donne des résultats plus constants sous différentes conditions environnementales.

Mode d'action : Réduit l'évaporation des gouttelettes à la surface des feuilles et réduit la tension superficielle des gouttelettes, ce qui améliore la pénétration du produit à travers la cuticule de la feuille.

Mélange : Ajouter la quantité nécessaire de bouillie en faisant fonctionner l'agitateur. Ajouter ASSURE II et après avoir bien mélangé, ajouter 5 L de SURE-MIX par tranche de 1000 L de bouillie.

Particularités : Peut, par temps chaud et humide, causer l'apparition de légères mouchetures sur les feuilles.

SURFACTANTS

Voir AGRAL 90, AG-SURF, COMPANION, ENHANCE, HASTEN NT, LI700, MERGE, PRO-SURF II, SIDEKICK II, SUPER SPREADER, SYLGARD 309, CONCENTRÉ D'HUILE XA.

SYLGARD 309

Type d'adjuvant : Surfactant non ionique.

Composition chimique : Polyéther siloxylaté (76 %) et mélange de surfactants (24 %),

Usages homologués : Avec PURSUIT sur le soya contre les graminées et dicotylédones annuelles; avec le glyphosate contre le chiendent commun et les dicotylédones annuelles sur les terres en jachère; et avec TORDON 101 pour une destruction plus rapide des conifères le long des routes, BASAGRAN sur le soya, RETAIN PLANT GROWTH REGULATOR, VISION SILVICULTURE et VISION MAX SILVICULTURE, VANTAGE FORESTRY, RANMAN 400 SC, FULFILL 50 WG.

Propriété : Renforce l'action chimique en favorisant et en accélérant l'absorption par la plante des herbicides hydrosolubles.

Mélange : Utiliser 2,5 L/1000 L de bouillie pour la plupart des traitements. Ajouter ce produit en dernier une fois que l'herbicide est bien mélangé. Utiliser la bouillie le plus tôt possible après avoir préparé le mélange.

Particularités : Cette préparation à base d'organosilicone possède la tension superficielle la plus faible de tous les adjuvants offerts sur le marché.

TRAMLINE

Type d'adjuvant : Marqueur de mousse.

Composition chimique : Surfactants non ioniques et anioniques (35 %) plus alcool et autres constituants (65 %).

Propriété : Améliore le recouvrement en indiquant les zones déjà pulvérisées, en prévenant les chevauchements et les manques.

Mélange : Selon la dureté de l'eau et la teneur en minéraux, mélanger 0,63–1 L/100 L d'eau.

TREKKER TRAX

Type d'adjuvant : Marqueur de mousse.

Composition chimique : Alcools (24 %) et surfactants anioniques et non ioniques mélangés (30 %).

Propriété : Améliore la mise en place des herbicides en permettant de repérer les zones déjà pulvérisées.

Mélange : Selon la dureté de l'eau, utiliser 1–2 L/100–150 L d'eau.

TURBOCHARGE

Type adjuvant : Surfactant/solvant.

Composition chimique : Mélange surfactant (39,5 %) plus solvant (huile minérale) (50 %).

Usages homologués : S'ajoute à l'herbicide ACHIEVE 40 DG.

Propriété : Renforce l'action chimique et assure un résultat plus constant sous diverses conditions environnementales.

Mode d'action : Améliore l'étalement, à la surface des feuilles, des gouttelettes produites lors de la pulvérisation, d'où le recouvrement d'une plus grande surface. Améliore la pénétration de l'herbicide à travers la cuticule de la feuille.

Mélange : Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié d'eau et commencer l'agitation. Ajouter la quantité requise d'herbicide et poursuivre l'agitation. Ajouter TURBOCHARGE en dernier lieu avec le reste de l'eau. Agiter à fond après chaque interruption de la pulvérisation. Employer TURBOCHARGE à raison de 0,5 L par 100 L de bouillie. Lors des mélanges en cuve avec des herbicides, toujours verser TURBOCHARGE en dernier.

UNITE

Type d'adjuvant : Agent de compatibilité.

Composition chimique : Acides polyglycols et alcool méthylique (83,7 %).

Propriété : Améliore la compatibilité des mélanges liquides engrais-pesticides.

Mélange : À raison de 240–1420 mL/378,5 L. Il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité physique des différents mélanges de pesticides et d'engrais sur une petite quantité pour déterminer la quantité exacte de UNITE et la méthode à utiliser pour le mélange.

VALID

Type d'adjuvant : Agent anti-déposition et anti-dérive, antimoussant-démoussant.

Composition chimique : Lécithine, émulsifiants, glycols, démoussant diméthylpolysiloxane.

Propriété : Ajouté en petites quantités avant les pesticides, VALID empêche la mousse de se former. L'ajout de VALID au mélange en cuve réduit également la production de fines gouttelettes susceptibles de dériver.

Mélange : Mélanger 125 mL/100 L de bouillie.

ZAP

Type d'adjuvant : Antimoussant-démoussant.

Composition chimique : Mélange exclusif d'ingrédients.

Usages homologués : Pour limiter la formation de mousse ou dissiper la mousse, utiliser en prémélange ou ajouter pendant le remplissage de la cuve. Pour usages agricoles/industriels.

Propriété : En limitant la formation de mousse, assure un remplissage plus rapide et l'utilisation des bons volumes et prévient les débordements de produits chimiques. Facilite aussi le nettoyage.

Mélange : Ajouter 2–5 mL/100 L de solution. Régler la quantité nécessaire au cas par cas. Peut être utilisé avant de mélanger la bouillie pour prévenir la formation de mousse ou après pour dissiper la mousse. Peut être utilisé avec tout herbicide, à moins de contre-indication sur l'étiquette. Est particulièrement efficace avec les produits à base de glyphosate, qui produisent souvent de la mousse lorsqu'ils sont dans une solution.

TABLEAU 5–1. Adjuvants utilisés en Ontario

Nom commercial*	Type d'adjuvant	Composition chimique	Concentration garantie de matière active	Tableau d'homologation de l'Ontario	Entreposage durant l'hiver	Code du fabricant
AGRAL 90	surfactant non ionique	nonoxinol	90 %	3	C	NOR
AG-SURF	surfactant non ionique	nonoxinol	92 %	3	C	INT
ALLIANCE	agent de compatibilité	ester phosphorique aliphatique, isopropanol et éthers glycoliques	69 %	s.o.	A	NOR
AMIGO	surfactant	ester phosphorique	30 %	2	C	BCZ
AQUASOFT	adoucisseur d'eau	acide hydroxy carboxylique, acides phosphoriques et acide polyacrylique de sulfate d'ammonium	63 %	s.o.	A	NOR
AQUA-STABLE	agent tampon	polycarboxylate aliphatique et chlorure de calcium	28 %	s.o.	A	NOR
BREAKER	antimoussant-démoussant			s.o.	A	UAG
CHOICE	adoucisseur d'eau	mélange d'acides polyacrylique, hydroxycarboxylique, propionique, d'ester phosphorique et de sulfate d'ammonium	50 %	s.o.	A	UAG
COMPANION	surfactant non ionique	octylphénoxy-polyéthoxy-(9)-éthanol	70 %	4	C	DWE
CONCENTRÉ D'HUILE ASSIST	huile minérale/ surfactant (non herbicide)	huile minérale à base de paraffine + mélange surfactant	83 % + 17 %	s.o.	C	BAZ
CONCENTRÉ D'HUILE SUPERIOR 70	huile minérale (non herbicide)	huile minérale à base de paraffine + mélange surfactant	83 % + 17 %	4	A	UAG
CONCENTRÉ D'HUILE XA	huile minérale/surfactant (non herbicide)	huile minérale à base de paraffine + mélange de surfactant	83 % + 17 %	4	A	UAG
ENHANCE	adjuvant non ionique	éthoxylate de triglycéride	80 %	4	B	NOR
FIGHTER F	antimoussant-démoussant	diméthylpolysiloxane	10 %	s.o.	A	UAG
FLAT-OUT	antimoussant-démoussant	diméthylpolysiloxane	20 %	s.o.	A	NOR
HALT	démoussant	base de silicone, neutre	30 %	s.o.	A	DWE
HASTEN NT	huile végétale estérifiée non ionique	oléates de méthyle et d'éthyle	71,4 %	4	B	NOR
IN-SIGHT	colorant pour marqueur de mousse	colorant, surfactants et agents de couplage	100 %	s.o.	A	NOR
KORNOIL	huile minérale (non herbicide)	huile minérale + émulsifiant	98,5 % + 1,5 %	s.o.	C	TEX
KORNOIL CONCENTRÉ	huile minérale /surfactant (non herbicide)	huile minérale à base de paraffine + mélange de surfactant	85 % + 15 %	s.o.	C	TEX

* La mention d'une marque ou d'un nom commercial dans le tableau qui précède ne signifie pas que le Comité ontarien de lutte contre les mauvaises herbes cautionne ce produit ni qu'il en recommande l'utilisation à l'exclusion des autres produits comparables. Les noms commerciaux apparaissent tous en majuscules.

TABLEAU 5–1. Adjuvants utilisés en Ontario (suite)

Nom commercial*	Type d'adjuvant	Composition chimique	Concentration garantie de matière active	Tableau d'homologation de l'Ontario	Entreposage durant l'hiver	Code du fabricant
LI700	surfactant non ionique et agent d'équilibration du pH ou acidifiant	phosphatidylcholine, acide méthylacétique, éther de polyoxyéthylène-alkyle	80 %	4	C	NUA
MERGE	surfactant/solvant	mélange surfactant + solvant (hydrocarbures)	50 % + 50 %	4	B	BAZ
SIDEKICK II	mouillant/activateur liquide non ionique	alkylarylpolyoxyéthylène glycols, acides gras libres et alcool isopropylique	900 g/L	4	C	NOR
SUPER SPREADER	surfactant non ionique à base de mouillant-adhésif	éthanol octylphénoxy-polyéthoxy	50 %	3	A	UAP
SURE-MIX	huile à base d'hydrocarbures/ surfactant (non herbicide)	huile à base d'hydrocarbures paraffiniques + mélange surfactant	60 % + 35,6 %	4	A	DUQ
SYLGARD 309	organosilicone non ionique	polyéther de silicone et mélange surfactant	76 % + 24 %	4	B	NOR
TRAMLINE	marqueur de mousse	surfactants non ioniques et anioniques	35 % + 65 %	s.o.	A	NOR
TREKKER TRAX	marqueur de mousse	alcools et surfactants anioniques et non ioniques mélangés	54 %	s.o.	A	UAG
TURBOCHARGE	huile minérale/surfactant (non herbicide)	huile minérale à base de paraffine + mélange surfactant	50 % + 39,5 %	4	C	SYN
UNITE	agent de compatibilité	acides polyglycols et alcool méthylique	83,70 %	s.o	A	UAG
VALID	retardateur de dérive/démoussant	lécithine, émulsifiants, glycols et démoussant diméthylpolysiloxane	100 %	s.o.	A	UAG
ZAP	antimoussant-démoussant	mélange exclusif	100 %	s.o.	A	NOR

* La mention d'une marque ou d'un nom commercial dans le tableau qui précède ne signifie pas que le Comité ontarien de lutte contre les mauvaises herbes cautionne ce produit ni qu'il en recommande l'utilisation à l'exclusion des autres produits comparables. Les noms commerciaux apparaissent tous en majuscules.

TABLEAU 5–2. Doses d'adjuvant en fonction du volume dans la cuve du pulvérisateur

% de l'adjuvant / eau	0,1 % v/v	0,2 % v/v	0,25 % v/v	0,5 % v/v	1,25 % v/v
L d'adjuvant/L d'eau	1 L/1000 L	2 L/1000 L	2,5 L/1000 L	5 L/1000 L	12,5 L/1000 L
L d'adjuvant/100 gal US d'eau	0,38 L/100 gal US	0,76 L/100 gal US	0,95 L/100 gal US	1,9 L/100 gal US	4,75 L/100 gal US

6. LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES EN PRÉSEMIS ET EN POSTRÉCOLTE

TABLEAU 6–1. Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis

CULTURE	AIM EC	AMITROL 240	BASAMID	CLEANSTART PLUS[1]	GRAMOXONE	GUARDIAN[1]	IGNITE	REGLONE	GLYPHOSATE*	VAPAM
Grandes cultures										
grandes cultures – sol rassis	✓			✓	✓				✓	
haricot blanc	✓	✓		✓					✓	
maïs	✓	✓		✓	✓			✓	✓	
soya	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
tabac									✓	✓
Légumes										
asperge							✓		✓	
aubergine	✓		✓	✓					✓	
betterave	✓			✓			✓	✓	✓	
carotte	✓			✓			✓	✓	✓	
céleri	✓			✓					✓	
choux	✓			✓				✓	✓	
concombre	✓			✓				✓	✓	
courge	✓			✓					✓	
ginseng									✓	
haricot	✓			✓				✓	✓	
laitue	✓		✓	✓			✓		✓	
maïs sucré	✓			✓				✓	✓	
melons	✓			✓					✓	
oignon	✓			✓			✓	✓	✓	
planches de semis – légumes de plein champ	✓		✓	✓					✓	✓
pois	✓			✓				✓	✓	

✓= Homologué comme traitement de présemis avant cette culture.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

TABLEAU 6–1. Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis (suite)

CULTURE	AIM EC	AMITROL 240	BASAMID	CLEANSTART PLUS[1]	GRAMOXONE	GUARDIAN[1]	IGNITE	REGLONE	GLYPHOSATE*	VAPAM
poivron	✓		✓	✓					✓	
pomme de terre	✓			✓				✓	✓	
rutabaga	✓			✓				✓	✓	
sol rassis	✓			✓	✓				✓	
tomate	✓		✓	✓					✓	
Cultures fruitières										
fruits	✓			✓					✓	✓
petits fruits	✓			✓					✓	
Plantes de pépinière										
plantes ligneuses			✓						✓	✓
plantes ornementales herbacées (lits de semence et de plantation)			✓						✓	
Gazon										
établissement gazon			✓						✓	
remise en état du gazon					✓				✓	

✓= Homologué comme traitement de présemis avant cette culture.
* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.
[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. En conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes en caractères gras indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 6–2. Évaluation des herbicides de présemis

	Annuelles		Vivaces														
Nom commercial	**dicotylédones annuelles**	**graminées annuelles**	**asclépiade**	**céraiste vulgaire**	**chardon des champs**	**chiendent commun**	**herbe à puce**	**laiteron des champs**	**lierre terrestre**	**liseron des champs**	**mauve**	**pissenlit**	**plantains**	**prêle**	**souchet**	**verge d'or**	**vesces**
Herbicides de présemis																	
AIM EC	**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**	-	-	-	-	-	-
AMITROL 240	**	**	[a]	-	7	7	8	[a]	-	[a]	-	9	8	7	[a]	[a]	-
CLEANSTART PLUS[1]	**	**	[a]	9	[a]	8/9	8	[a]	5	7[a]	8	7/8[d]	9	0	7	-	5
glyphosate*	**	**	[a]	9	[a]	8/9	8	[a]	5	7[a]	5	7/8[d]	9	0	7	-	5
GRAMOXONE	**	**	[b]	[b]	0	5	[b]	[b]	[b]	[b]	[b]	[b]	[b]	[b]	0	-	[b]
GUARDIAN[1]	**	**	[a]	9	7[a]	8/9	8	[a]	5	7[a]	5	7/8[d]	9	0	**8**	-	5
IGNITE	**	**	6[c]	-	8[c]	8[c]	-	8[c]	-	8[c]	-	8	-	7[c]	7[c]	-	-

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

** Indique que la plupart des mauvaises herbes annuelles seront détruites si elles sont déjà levées.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[a] Il est peu probable que les stades phénologiques optimaux pour la maîtrise de ces mauvaises herbes soient atteints avant les semis effectués entre le début et le milieu du printemps.

[b] Détruit la partie aérienne de la plante seulement; une repousse est à prévoir.

[c] Des traitements répétés peuvent être nécessaires.

[d] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

TABLEAU 6–2. Évaluation des herbicides de présemis (suite)

Remarques particulières sur les mauvaises herbes combattues et les doses associées à diverses concentrations de glyphosate		
Concentration de glyphosate*	**Dose du produit/ac**	**Mauvaises herbes combattues et remarques**
360 g/L 450 g/L 480 g/L 500 g/L 540 g/L	0,3–1,4 L/ac 0,24–1,12 L/ac 0,22–1,05 L/ac 0,22–1 L/ac 0,2–0,93 L/ac	• Contre **les mauvaises herbes annuelles**. • Utiliser 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) pour la dose inférieure, ou utiliser un surfactant avec des volumes d'eau plus importants. • Utiliser la dose supérieure si les mauvaises herbes ont plus de 15 cm de hauteur. • Si les mauvaises herbes ont moins de 15 cm de hauteur, voir sur l'étiquette les doses applicables en fonction des espèces combattues. • Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps, avant la levée de la culture. • Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes. • Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement.
360 g/L 450 g/L 480 g/L 500 g/L 540 g/L	1–2,8 L/ac 0,8–2,25 L/ac 0,75–2,1 L/ac 0,72–2 L/ac 0,67–1,87 L/ac	• Contre **le pissenlit et le chiendent commun**. • Traiter quand le chiendent commun comporte 3–4 nouvelles feuilles. • La maîtrise du chiendent commun est assurée pendant au moins une saison de croissance avec la dose la plus faible et à plus long terme avec une dose plus forte. • Contre le pissenlit, appliquer la dose la plus faible ou une dose plus forte selon que le diamètre des pissenlits est inférieur ou supérieur à 15 cm respectivement.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

**Indique que la plupart des mauvaises herbes annuelles seront détruites si elles sont déjà levées.

‡ Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[a] Il est peu probable que les stades phénologiques optimaux pour la maîtrise de ces mauvaises herbes soient atteints avant les semis effectués entre le début et le milieu du printemps.

[b] Détruit la partie aérienne de la plante seulement; une repousse est à prévoir.

[c] Des traitements répétés peuvent être nécessaires.

[d] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES EN PRÉSEMIS			
Présemis — Préparation du terrain avant toute culture			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* plus *surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	37–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,9–28 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	5–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5–1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. · Le recouvrement des mauvaises herbes est indispensable à l'efficacité du traitement. · Le mélange en cuve de présemis d'AIM EC + glyphosate (CLEANSTART PLUS[1]) permet de maîtriser un plus large éventail de mauvaises herbes.
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	4,2–8,4 L/ha *1–2 kg/ha*	1,68–3,36 L/ac	· Contre le pissenlit et les mauvaises herbes annuelles. · Dans le maïs, le soya, les haricots blancs, le blé, l'orge, le canola et les pois de grande culture. · Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac) 10–14 jours avant les semis. · Attendre 10–14 jours avant de travailler le champ et de faire les semis (**seul** le soya peut être semé 6 jours après le traitement pourvu qu'on ait utilisé la dose la plus faible). · Recourir à d'autres traitements herbicides pour maîtriser les espèces de mauvaises herbes qui lèvent après le traitement. · Peut être mélangé en cuve avec ROUNDUP ou PURSUIT lorsque ces produits sont homologués pour la culture.
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	12,5–16,5 L/ha *3–4 kg/ha*	5–6,6 L/ac	· Contre le chiendent commun, le chardon des champs, le laiteron des champs (traitement automnal) et les mauvaises herbes annuelles. · Utiliser **uniquement** avant les haricots blancs, le maïs et le soya. · Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha (40–180 L/ac). · Appliquer à l'automne (avant la première gelée meurtrière) ou au printemps sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 10 cm de haut. · Labourer ou pulvériser le sol à fond 10–14 jours après le traitement. · Il peut être nécessaire de sarcler après la levée de la culture pour de meilleurs résultats.
CLEANSTART PLUS[1] (CREDIT PLUS [360 g/L] + AIM EC [240 g/L]) *glyphosate* *+ carfentrazone-éthyle*	2,5 L/ha + 73 mL/ha *0,9* *+ 0,0175 kg/ha*	1,0 L/ac + 30 mL/ac	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. · Le recouvrement des mauvaises herbes est indispensable à l'efficacité du traitement. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. · CLEANSTART PLUS[1] n'a aucun effet rémanent contre les mauvaises herbes. · CLEANSTART PLUS[1] est un emballage combiné de CREDIT PLUS et d'AIM EC.
glyphosate* *glyphosate*	**Voir tableau 6–2** *0,27–4,32 kg/ha*	**Voir tableau 6–2**	· Pour des détails sur les doses et les notes relatives à la maîtrise des mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 6–2, *Évaluation des herbicides de présemis*, p. 87.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	2,75–5,5 L/ha *0,55–1,1 kg/ha*	1,1–2,2 L/ac	· Appliquer sur la végétation en croissance active au moins 3 jours avant la levée de la culture. · Utiliser la dose supérieure lorsque les mauvaises herbes ont plus de 5 cm de hauteur. · Appliquer dans 300–1100 L d'eau/ha (120–440 L/ac). · Un recouvrement complet est important. Utiliser des volumes d'eau plus grands lorsque la végétation est dense. · Ce traitement ne fait que supprimer la partie aérienne des mauvaises herbes vivaces. · Ce traitement n'est efficace que contre les mauvaises herbes déjà levées.
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	2,5 L/ha *0,5 kg/ha*	1 L/ac	· Appliquer en présemis pour la destruction chimique des mauvaises herbes avant une culture de soya ou de maïs en semis direct. · Appliquer sur la végétation en croissance active au moins 3 jours avant la levée de la culture. · Appliquer dans 200–250 L d'eau/ha (80–100 L/ac). · Un recouvrement complet est important. Utiliser des volumes d'eau plus grands lorsque la végétation est dense. · Ce traitement ne fait que supprimer la partie aérienne des mauvaises herbes vivaces.
GUARDIAN[1] TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L) + CLASSIC (25 DF) *glyphosate* plus *chlorimuron-éthyle*	1,8 L/ha + 36 g/ha 0,9 kg/ha 9 g/ha	0,72 L/ac + 14 g/ac	· Destruction chimique en présemis dans le soya **uniquement**. · Appliquer avant la levée du soya ordinaire. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette de CLASSIC et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67. · GUARDIAN est un emballage combiné de TOUCHDOWN TOTAL + CLASSIC.
Désherbage des entrerangs et techniques de semis sur sol rassis			
La technique du semis sur sol rassis est utile quand le sol peut être travaillé bien avant les semis et que les mauvaises herbes ont plusieurs semaines pour lever. Appliquer l'un des herbicides non sélectifs de postlevée ci-dessous pour détruire les mauvaises herbes levées. Le fait de faire les semis ou les plantations à travers les mauvaises herbes mortes, en dérangeant le sol le moins possible, permet à la culture de s'établir avant la nouvelle vague de mauvaises herbes. Pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite, recourir au sarclage, au binage ou à des traitements de postlevée ou dirigés. Quand ils sont homologués, certains herbicides peuvent être appliqués après les semis, pourvu que ce soit avant la levée de la culture.			
AIM EC (240 g/L) plus surfactant non ionique **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* plus *surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	37–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,9–28 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	5–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS DE RÉDUCTION DE LA DÉRIVE** entre les rangs ou entre le paillis de plastique. · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · Utiliser **SEULEMENT** une fois par saison de croissance. · **AIM EC** peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec les tissus verts de la tige, les feuilles, les fleurs ou les fruits. · Le délai d'attente avant récolte varie de 1 à 15 jours selon la culture. Consulter l'étiquette du produit pour connaître le délai d'attente à respecter relativement à une culture en particulier. · Se reporter à l'étiquette du produit ou au chapitre 4, *Notes sur les herbicides*, p. 33, pour la liste des usages homologués.

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
glyphosate*	**Voir tableau 6–2**	**Voir tableau 6–2**	• Travailler et fertiliser le sol au début du printemps. • Laisser les mauvaises herbes pousser. Pulvériser sur les mauvaises herbes juste avant les semis. • Utiliser la dose inférieure pour les petites mauvaises herbes (8 cm), une dose moyenne pour les mauvaises herbes de 8–15 cm de hauteur et la dose supérieure pour les mauvaises herbes hautes de plus de 15 cm.
glyphosate	*0,27–4,32 kg/ha*		
GRAMOXONE (200 g/L)	3–5,5 L/ha	1,2–2,2 L/ac	• Contre les mauvaises herbes levées, après les semis, mais avant la levée de la culture. • Utiliser **uniquement** dans haricots (tous types), betteraves, carottes, crucifères, maïs, oignons, pois, concombres, pommes de terre, soya et navets. • Pour le désherbage entre les rangs, on utilise un pulvérisateur spécial fonctionnant à basse pression qui permet de n'arroser que les mauvaises herbes, sans atteindre les plantes cultivées. • Pour de petites surfaces, utiliser 30 mL de produit dans 10 L d'eau par 100 m^2.
REGLONE (200 g/L)	3–5,5 L/ha	1,2–2,2 L/ac	
paraquat	*0,6–1,1 kg/ha*		
ou *diquat*	*0,6–1,1 kg/ha*		
IGNITE (150 g/L)	2,7–5 L/ha	1,08–2 L/ac	• Utiliser **uniquement** dans carottes, laitue et oignons. • Utiliser au moins 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac). • Appliquer après les semis, mais avant la levée de la culture.
glufosinate ammonium	*0,405–0,75 kg/ha*		

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

TABLEAU 6–3. Évaluation des herbicides de postrécolte

Chaume	Traitement	Graminées		Dicotylédones vivaces									
		chiendent commun	muhlenbergie feuillée	apocyn chanvrin	asclépiade	céraiste vulgaire	cerise de terre	chardon des champs	laiteron des champs	liseron des champs	pissenlit	trèfle rouge	tussilage
Herbicides de postrécolte													
glyphosate	glyphosate*	9	9	8	8	9	-	9	9	9	8/9[a]	8	8
dicamba	BANVEL II, ORACLE	0	0	8	7	9	6	8	9	8	8	9	7
2,4-D	2,4-D*	0	0	-	0	2	-	6	7	7	7	5	-

Remarques particulières sur les mauvaises herbes combattues et les doses associées à diverses concentrations de glyphosate

Concentration de glyphosate*	Dose du produit/ac	Mauvaises herbes combattues et remarques
360 g/L 450 g/L 480 g/L 500 g/L 540 g/L	0,3–1,4 L/ac 0,24–1,12 L/ac 0,22–1,05 L/ac 0,22–1 L/ac 0,2–0,93 L/ac	· Contre **les mauvaises herbes annuelles**. · Utiliser 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) pour la dose inférieure, ou utiliser un surfactant avec des volumes d'eau plus importants. · Utiliser la dose supérieure si les mauvaises herbes ont plus de 15 cm de hauteur. · Si les mauvaises herbes ont moins de 15 cm de hauteur, voir sur l'étiquette les doses applicables en fonction des espèces combattues. · Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps, avant la levée de la culture. · Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement.
360 g/L 450 g/L 480 g/L 500 g/L 540 g/L	1–2,8 L/ac 0,8–2,25 L/ac 0,75–2,1 L/ac 0,72–2 L/ac 0,67–1,87 L/ac	· Contre **le pissenlit et le chiendent commun.** · Appliquer quand le **chiendent commun** possède 3–4 nouvelles feuilles. · La maîtrise du chiendent commun est assurée pendant au moins une saison de croissance avec la dose la plus faible et à plus long terme avec une dose plus forte. · Contre le pissenlit, appliquer la dose la plus faible ou une dose plus forte selon que le diamètre des pissenlits est inférieur ou supérieur à 15 cm respectivement.
360 g/L 450 g/L 480 g/L 500 g/L 540 g/L	2,8–4,8 L/ac 2,25–3,85 L/ac 2,1–3,6 L/ac 2–3,5 L/ac 1,87–3,2 L/ac	· Contre **les dicotylédones vivaces**. · **Pour une efficacité optimale, le chardon des champs et le laiteron des champs doivent être au moins au début du stade du bouton, l'asclépiade, au stade du bouton, le liseron, au stade de la pleine floraison, et l'apocyn, passé le stade de la pleine floraison.** · Contre les vivaces qui ne seront pas dérangées (comme dans les gazons ou les zones non cultivées), utiliser la dose supérieure et répéter le traitement lorsque les repousses ont atteint le stade optimal mentionné ci-dessus.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes. * Il existe différents produits; voir le tableau 4-1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.
[a] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TRAITEMENTS LOCALISÉS ET TRAITEMENTS DE POSTRÉCOLTE			
Postrécolte (anti-dicotylédones)			
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L)	2,5 L/ha	1 L/ac	• Appliquer à l'automne pendant que les mauvaises herbes sont en croissance active, au moins 2 semaines avant une gelée meurtrière. • **NE PAS** appliquer avant les semis d'automne.
dicamba	*1,2 kg/ha*		• L'année qui suit le traitement, cultiver **uniquement** des céréales, du soya, du maïs de grande culture, du maïs sucré ou des haricots blancs.
2,4-D ESTER 600* (564 g/L) **ou** 2,4-D ESTER 700* (660 g/L)	1,5–2,9 L/ha 1,29–2,5 L/ha	0,6–1,16 L/ac 0,52–1,0 L/ac	• Traiter à l'automne sur des plantes en pleine croissance. • Pulvériser la dose supérieure pour détruire les légumineuses et les mauvaises herbes vivaces.
2,4-D	*0,85-1,655 kg/ha*		• Le traitement donne les meilleurs résultats quand il est fait au moins 2 semaines avant une gelée meurtrière, sur une végétation en pleine croissance. • Après ce traitement, **NE PAS** semer de blé ni d'orge d'automne.
Postrécolte (anti-graminées et anti-dicotylédones)			
AMITROL 240 (231 g/L)	12,5–16,5 L/ha	5–6,6 L/ac	• Appliquer après la récolte lorsque la repousse du chardon des champs et du laiteron des champs atteint 10–15 cm.
amitrole	*3–4 kg/ha*		• **Attendre** 2 semaines avant de travailler le sol. • **NE PAS** appliquer après une forte gelée, soit généralement après le 1er octobre. • **NE** semer **AUCUNE** culture pendant les 8 mois qui suivent le traitement.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus glyphosate* plus surfactant non ionique	1,25 L/ha Voir précautions 0,35 L/ha	0,5 L/ac Voir précautions 0,14 L/ac	• Appliquer sur la végétation en croissance active au moins 2 semaines avant une gelée meurtrière. • **Contre le trèfle rouge, les repousses de céréales et les dicotylédones annuelles.** • **NE PAS** appliquer avant les semis d'automne. **Doses des produits à base de glyphosate équivalant à 0,6 kg de matière active/ha :**
dicamba *plus glyphosate* *plus surfactant non ionique*	*0,6 kg/ha* *0,6 kg/ha* *0,35 L/ha*		• Glyphosate (360 g/L) : 1,7 L/ha (0,68 L/ac) • Glyphosate (450 g/L) : 1,33 L/ha (0,53 L/ac) • Glyphosate (480 g/L) : 1,25 L/ha (0,5 L/ac) • Glyphosate (500 g/L) : 1,2 L/ha (0,48 L/ac) • Glyphosate (540 g/L) : 1,11 L/ha (0,44 L/ac)
glyphosate*	**Voir tableau 6–2**	**Voir tableau 6–2**	• Pour des précisions sur les doses de produit et des remarques sur la lutte contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 6–2, *Évaluation des herbicides de présemis*, p. 87.
glyphosate	*0,27-4,32 kg/ha*		

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir la liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Désherbage localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel			
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	12,5–16,5 L/ha *3–4 kg/ha*	5–6,6 L/ac	• Homologué **uniquement** pour les pâturages et endroits non cultivés. • Bien mouiller les tiges et les feuilles des mauvaises herbes. Répéter le traitement à chaque repousse. • Pulvériser sur le chardon des champs et le laiteron des champs au début du stade du bouton jusqu'à la floraison, le chiendent commun et la prêle ayant atteint 10–15 cm, le pissenlit encore jeune, la linaire et le cranson dravier au stade de la rosette avancée, l'asclépiade au début de l'été, et l'herbe à puce une fois le feuillage entièrement déployé. • **NE PAS** laisser d'animaux consommer de la végétation traitée. Garder le bétail hors de la zone traitée jusqu'à ce que les mauvaises herbes soient mortes et qu'une nouvelle pousse ait levé.
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	1–2 L/100 L 0,8–1,6 L/100 L 0,75–1,5 L/100 L 0,72–1,44 L/100 L 0,67–1,34 L/100 L *0,36–0,72 kg/100 L*		• Contre les mauvaises herbes en croissance active. Diriger le jet de manière à éviter la végétation à conserver. • Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de faucher ou de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes. • Pour une efficacité optimale, le chardon des champs et le laiteron des champs doivent être au moins au début du stade du bouton, l'asclépiade, au stade du bouton, le liseron, au stade de la pleine floraison, l'apocyn, passé le stade de la pleine floraison, et le chiendent commun doit avoir 3–4 nouvelles feuilles.
Traitement par humectation avec applicateur à corde ou à rouleau			
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	1 L/2 L d'eau 0,8 L/2 L d'eau 0,75 L/2 L d'eau 0,72 L/2 L d'eau 0,67 L/2 L d'eau *0,36 kg/2 L d'eau*		• Le traitement par humectation avec applicateur à corde s'utilise sur le soya, les haricots blancs, les pommiers, cerisiers, pêchers, poiriers, pruniers, vignes, fraisiers et canneberges. • Appliquer sur les mauvaises herbes dont la hauteur dépasse suffisamment celle de la culture pour permettre un bon contact avec l'applicateur. • **Éviter** tout contact de l'applicateur avec la culture et éviter que la solution ne dégoutte sur celle-ci. • Un mélange d'herbicide 33 % (1 L pour 2 L d'eau) assure une bonne maîtrise de la plupart des mauvaises herbes.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir la liste complète.

Haricots

7. HARICOTS ADZUKI, SECS, DE LIMA ET MANGE-TOUT

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. En conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes en **caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 7–1. Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout

	Culture visée par l'homologation												**Graminées annuelles**							**Dicotylédones annuelles**												**Vivaces**							
Nom commercial	**haricot adzuki**	**haricot noir**	**haricot brun hollandais**	**haricot canneberge**	**haricot rognon**	**haricot de Lima**	**haricot otebo**	**haricot pinto**	**haricots rouges petits (mexicains rouges)**	**haricot mange-tout**	**haricot à œil jaune**	**haricot blanc**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**Tolérance de la culture**
Anti-graminées incorporés en présemis																																					
DUAL II MAGNUM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	0	2	7	2	**8**[c]	**7**	4	3	2	0	0	0	**8**[b]	0	0	0	B
EPTAM		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	4	0	7	7	5	7	7	5	3	5	-	-	-	**8**	**5**	-	-	E
FRONTIER MAX		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	0	2	7	2	**8**[c]	**7**	4	3	2	0	0	0	**8**[b]	0	0	0	B

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

Les cotes en **caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] POAST ULTRA (dose de 1,1 L/ha contre le chiendent commun) n'est pas homologué pour une utilisation sur les haricots mange-tout.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour une efficacité optimale, faire le traitement par incorporation en présemis.

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

✓ Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

TABLEAU 7–1. Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout (suite)

	Culture visée par l'homologation												Graminées annuelles								Dicotylédones annuelles											Vivaces							
Nom commercial	**haricot adzuki**	**haricot noir**	**haricot brun hollandais**	**haricot canneberge**	**haricot rognon**	**haricot de Lima**	**haricot otebo**	**haricot pinto**	**haricots rouges petits (mexicains rouges)**	**haricot mange-tout**	**haricot à œil jaune**	**haricot blanc**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**Tolérance de la culture**
RIVAL, TREFLAN ou BONANZA		✓			✓	✓				✓		✓	**9**	**9**	9	9	9	9	9	7	**5**	0	2	**8**	2	2	**8**	2	1	2	2	2	2	**8**	2	2	2	E
Anti-graminées et anti-dicotylédones incorporés en présemis																																						
PURSUIT	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	7	7	9	**9**	**9**	8	**7**	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
Mélanges en cuve d'herbicides incorporés en présemis																																						
DUAL II MAGNUM + PURSUIT		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**9**	**9**	**9**	**9**	7	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	-	-	-	**8**	7	-	-	E
EPTAM + RIVAL, TREFLAN ou BONANZA					✓							✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	5	5	7	**8**	5	8	**8**	5	3	5	-	-	-	**8**	7	-	-	E
FRONTIER MAX + PURSUIT		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**9**	**9**	**9**	**9**	7	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	-	-	-	**8**	7	-	-	E
RIVAL, TREFLAN ou BONANZA + PURSUIT												✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	8	5	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
Anti-graminées de prélevée																																						
DUAL II MAGNUM		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	0	2	7	2	**8**[c]	**7**	4	3	2	0	0	0	**7**	0	0	0	B
FRONTIER MAX		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	0	2	7	2	**8**[c]	**7**	4	3	2	0	0	0	**7**	0	0	0	B

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

Les cotes en **caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] POAST ULTRA (dose de 1,1 L/ha contre le chiendent commun) n'est pas homologué pour une utilisation sur les haricots mange-tout.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour une efficacité optimale, faire le traitement par incorporation en présemis.

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

✓ Peut être utilisé sur cette culture.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

TABLEAU 7–1. Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout (suite)

	Culture visée par l'homologation												Graminées annuelles								Dicotylédones annuelles											Vivaces							
Nom commercial	haricot adzuki	haricot noir	haricot brun hollandais	haricot canneberge	haricot rognon	haricot de Lima	haricot otebo	haricot pinto	haricots rouges petits (mexicains rouges)	haricot mange-tout	haricot à œil jaune	haricot blanc	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	Tolérance de la culture
Anti-gaminées et anti-dicotylédones de prélevée																																						
PURSUIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	7	7	9	**9**	**9**	8	**7**	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
Mélanges en cuve d'herbicides de prélevée																																						
DUAL II MAGNUM + PURSUIT				✓	✓								**9**	**9**	**8**[a]	**9**	**9**	**9**	**9**	**7**	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	-	-	-	**8**	7	-	-	E
FRONTIER MAX + PURSUIT		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**8**[a]	**9**	**9**	**9**	**9**	**7**	8	2	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	-	-	-	**8**	7	-	-	E
Anti-graminées de postlevée																																						
ASSURE II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	8	**9**	9	**9**	**8**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0	E
EXCEL SUPER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	E
POAST ULTRA[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓	✓	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0	E
SELECT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0	E
Anti-dicotylédones de postlevée																																						
BASAGRAN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	9	**6**	2	2	**8**	0	5	7	B
BASAGRAN FORTÉ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	9	**6**	2	2	**8**	0	5	7	B

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

Les cotes en **caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] POAST ULTRA (dose de 1,1 L/ha contre le chiendent commun) n'est pas homologué pour une utilisation sur les haricots mange-tout.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour une efficacité optimale, faire le traitement par incorporation en présemis.

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

✓ Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

TABLEAU 7–1. Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout (suite)

	Culture visée par l'homologation												Graminées annuelles								Dicotylédones annuelles										Vivaces							
Nom commercial	**haricot adzuki**	**haricot noir**	**haricot brun hollandais**	**haricot canneberge**	**haricot rognon**	**haricot de Lima**	**haricot otebo**	**haricot pinto**	**haricots rouges petits (mexicains rouges)**	**haricot mange-tout**	**haricot à œil jaune**	**haricot blanc**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**Tolérance de la culture**
REFLEX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	**8**	**6**	**9**	**8**	**9**	**9**	**7**	**6**	3	6	2	-	0	5	3	P
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée																																						
EXCEL SUPER + BASAGRAN					✓			✓				✓	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	7	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	9	**5**	2	2	**8**	1	5	**7**	B
BASAGRAN + REFLEX					✓							✓	0	0	0	0	0	0	0	0	8	**5**	**9**	**7**	9	8	**9**	**9**	**7**	9	**5**	2	2	**8**	1	5	**7**	P

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

Les cotes en **caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] POAST ULTRA (dose de 1,1 L/ha contre le chiendent commun) n'est pas homologué pour une utilisation sur les haricots mange-tout.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour une efficacité optimale, faire le traitement par incorporation en présemis.

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout

Les haricots secs comprennent les catégories commerciales d'ambériques et de haricots adzuki, noir, canneberge, brun hollandais, rognon, rouge petit (mexicain rouge), otebo, pinto, blanc et à œil jaune.

Appliquer tous les traitements dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac), sauf indication contraire.

En plus des traitements herbicides, le sarclage, la rotation et d'autres pratiques culturales sont des méthodes efficaces dont il faut tenir compte lorsqu'on met sur pied un programme de lutte contre les mauvaises herbes. L'emploi d'une seule méthode ou l'application continuelle du même produit chimique peut entraîner une augmentation des mauvaises herbes résistantes ou tolérantes à cette méthode ou à ce produit. La rotation avec d'autres cultures et/ou d'autres méthodes de désherbage réduiront les risques d'une nouvelle infestation ou du développement d'une souche particulière résistante.

Un travail du sol rapide (10–20 km/h) et peu profond (2,5–3 cm) avec une houe rotative, quand les plants sont au stade 1 ou 2 vraies feuilles, aide à supprimer les plantules de mauvaises herbes. Cette technique ne réduit pas l'action de l'herbicide et peut, certaines années, renforcer la lutte chimique tout en épargnant les plantes cultivées.

Le sarclage entre les rangs peut être nécessaire si les mauvaises herbes échappent au traitement chimique. On considère que les mauvaises herbes ont échappé au traitement quand elles ont 5–7 cm de hauteur. Le sarclage doit être superficiel pour éviter de remonter en surface du sol non traité où germeront de nouvelles mauvaises herbes.

L'application de l'herbicide en bande sur le rang réduit le coût de 1/2 ou 2/3, selon l'espace entre les rangs et la largeur de la bande. Pour détruire les mauvaises herbes entre les bandes, il est nécessaire de sarcler superficiellement.

Le travail du sol détruit une partie des mauvaises herbes vivaces établies, mais peut aussi en favoriser la propagation aux surfaces non infestées. Veiller à la propreté des machines avant de passer à un autre champ.

On peut aussi imprégner les engrais en granulés avec certains produits chimiques. Voir l'étiquette du produit considéré pour connaître les fertilisants recommandés. Le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, indique les catégories commerciales de haricots comestibles pour lesquelles les différents traitements herbicides sont homologués.

Les doses et les techniques d'application varient pour les produits à base de trifluraline. Pour plus d'information, lire l'étiquette du produit utilisé ainsi que la section *Notes sur les herbicides*, p. 33.

Moments des traitements herbicides

- **Présemis (PP)** — Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis, Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.
- **Incorporation en présemis (IPS)** — Sauf indication contraire, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.
- **Prélevée (PRÉ)** — De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas.
- **Postlevée (POST)** — Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,15–1,75 L/ha *1,05–1,6 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ sur toutes les espèces de haricots secs (*Phaseolus vulgaris*), sauf sur le haricot de Lima quand l'application se fait en PRÉ. · Appliquer par IPS afin de minimiser les risques de dommages aux cultures. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki. · **NE PAS** utiliser sur les terres noires, les sols tourbeux, ni les sols riches en matière organique. · Utiliser la dose inférieure sur les sols à texture grossière qui sont pauvres en matière organique. · De la pluie est nécessaire pour activer le traitement. Travailler à la houe rotative s'il ne pleut pas dans les 7 jours. · DUAL MAGNUM assure une meilleure maîtrise du souchet comestible s'il est appliqué par IPS. · Utiliser la dose supérieure pour lutter contre la morelle.
EPTAM (800 g/L) *EPTC*	4,25–5,5 L/ha *3,4–4,4 kg/ha*	1,7–2,2 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer immédiatement. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki, de Lima, otebo, ni rouges petits (mexicains rouges). · Si une sécheresse a précédé l'application d'EPTC, retarder le semis de 7–10 jours. · La culture peut souffrir temporairement du traitement à sa sortie de terre. · Utiliser la dose supérieure contre le souchet.
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide*	763–963 mL/ha *544–693 g/ha*	302–385 mL/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · Appliquer par IPS afin de minimiser les risques de dommages aux cultures. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki, mange-tout ni de Lima. · **NE PAS** utiliser sur les terres noires, les sols tourbeux, ni les sols riches en matière organique. · Utiliser la dose inférieure sur les sols à texture grossière qui sont pauvres en matière organique. · La dose minimale pour l'IPS est de 860 mL/ha (344 mL/ac). · FRONTIER MAX assure une meilleure maîtrise du souchet comestible s'il est appliqué par IPS. · Utiliser la dose maximale de FRONTIER MAX pour lutter contre la morelle et l'amarante. · De la pluie est nécessaire pour activer le traitement. Travailler à la houe rotative s'il ne pleut pas dans les 7 jours. · Si l'on utilise FRONTIER (900 g/L), utiliser des doses de 1,1–1,4 L/ha (0,44–0,56 L/ac) en PRÉ et de 1,4 L/ha (0,56 L/ac) par IPS.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer le plus tôt possible dans les 24 heures qui suivent. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki, bruns, canneberge, otebo, pinto, rouges petits (mexicains rouges) et à œil jaune. · Dans les haricots de Lima, **NE PAS** dépasser 1,2 L de TREFLAN/ha (0,48 L/ac) si le sol est à texture moyenne, ni 1,7 L/ha (0,68 L/ac) si le sol est à texture grossière.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
PURSUIT (240 g/L) *imazéthapyr*	0,312 L/ha *0,075 kg/ha*	0,125 L/ac	· Appliquer par IPS sur les haricots adzuki, canneberge, rognons et blancs. · Appliquer en PRÉ sur les haricots adzuki, noirs, bruns, canneberge, rognons, de Lima, otebo, rouges petits (mexicains rouges), à œil jaune et blancs. · **NE PAS** appliquer sur les haricots pinto. · Un retard de maturité ou un rabougrissement peut survenir si le temps est froid et/ou pluvieux dans la première semaine qui suit le traitement. · De la pluie est nécessaire pour activer le traitement. Travailler à la houe rotative s'il ne pleut pas dans les 7 jours. · Un traitement au PURSUIT peut amener un retard de maturité. · **NE PAS** récolter dans les 100 jours qui suivent le traitement. · **Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation;** voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
Mélanges en cuve d'herbicides radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 EC) plus PURSUIT (240 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* plus *imazéthapyr*	1,15–1,75 L/ha 0,312 L/ha *1,05–1,60 kg/ha* *0,075 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac 0,125 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ; utiliser **uniquement** sur les haricots canneberge ou rognons. · Appliquer par IPS afin de minimiser les risques de dommages aux cultures. · **NE PAS** utiliser sur les terres noires, les sols tourbeux ni les sols riches en matière organique. · Utiliser la dose inférieure sur les sols à texture grossière qui sont pauvres en matière organique. · De la pluie est nécessaire pour activer le traitement. Travailler à la houe rotative s'il ne pleut pas dans les 7 jours. · **NE PAS** récolter dans les 100 jours qui suivent le traitement. · **Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation;** voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
EPTAM (800 g/L) plus TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *EPTC* plus *trifluraline*	3 L/ha 1,25 L/ha 1,2 L/ha 1,5 L/ha *2,4 kg/ha* *0,6 kg/ha*	1,2 L/ac 0,5 L/ac 0,48 L/ac 0,6 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer immédiatement. · Utiliser **uniquement** sur les haricots blancs et les haricots rognons. · Si une sécheresse a précédé l'application d'EPTC, retarder le semis de 7–10 jours.
FRONTIER MAX (720 g/L) plus PURSUIT (240 g/L) *diméthénamide-P* *plus imazéthapyr*	0,756–0,963 L/ha 0,312 L/ha *0,544–0,693 kg/ha* *0,075 kg/ha*	0,302–0,385 L/ac 0,125 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · Appliquer par IPS afin de minimiser les risques de dommages aux cultures. · La dose minimale pour l'IPS est de 860 mL/ha (344 mL/ac). · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki, mange-tout ni de Lima. · Utiliser la dose inférieure sur les sols à texture grossière qui sont pauvres en matière organique. · **NE PAS** récolter dans les 100 jours qui suivent le traitement.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
PURSUIT (240 g/L) plus TREFLAN EC (480 g/L) ou RIVAL (500 g/L) ou BONANZA 400 (400 g/L) *imazéthapyr* plus *trifluraline*	0,312 L/ha 1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,075 kg/ha* *0,6–1,15 kg/ha*	0,125 L/ac 0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	• Appliquer par IPS et incorporer le plus tôt possible, dans les 24 heures qui suivent. • Utiliser **seulement** sur les haricots blancs. • **Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation;** voir le tableau 4-4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
Anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* plus *concentré d'huile*	0,38–0,75 L/ha 5 L/1000 L *0,036–0,07 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	• Appliquer sur les céréales spontanées et les graminées annuelles entre le stade 2 feuilles et le tallage et sur le maïs spontané et le chiendent commun au stade 2–6 feuilles. • S'utilise sur toutes les catégories commerciales de haricots comestibles énumérées dans le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95, ainsi que sur les ambériques. • Utiliser la dose de 0,38 L de ASSURE II/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales et la sétaire verte. • La dose de 0,5 L de ASSURE II/ha (0,2 L/ac) supprime la partie aérienne du chiendent commun et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. • Utiliser la dose de 0,75 L de ASSURE II/ha (0,3 L/ac) pour détruire le chiendent commun.
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	• Appliquer en POST quand les graminées annuelles sont au stade 2–5 feuilles. • Appliquer en POST sur toutes les espèces de haricots secs (*Phaseolus vulgaris*) énumérées dans le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95. • **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki. • **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* plus *surfactant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer en POST quand les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 1–6 feuilles et que le chiendent commun est au stade 1–3 feuilles. • Appliquer en POST sur les haricots adzuki et toutes les espèces de haricots secs (*Phaseolus vulgaris*) énumérées dans le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95. • La dose maximale sur les haricots mange-tout est de 0,65 L/ha (0,26 L/ac). • Utiliser la dose intermédiaire (0,47 L/ha) contre les repousses de céréales de printemps. • Utiliser la dose supérieure (1,1 L/ha) contre le chiendent commun. • Une préparation minutieuse du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. • **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit.
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* plus *surfactant*	0,125–0,19 L/ha 5 L/1000 L *0,03–0,046 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,05–0,076 L/ac	• Appliquer en POST quand les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 1–6 feuilles. • **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. • **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki, bruns hollandais, canneberge, rognons, de Lima, otebo, rouges petits (mexicains rouges), mange-tout et à œil jaune.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
Anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) **ou** BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* plus *concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1,75–2,25 L/ha 2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,7–0,9 L/ac 0,8 L/ac	· Appliquer en POST quand les haricots sont entre le stade unifolié au stade 4 feuilles trifoliées. · Appliquer en POST sur toutes les espèces de haricots secs (*Phaseolus vulgaris*) énumérées dans le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki. · Appliquer sur les mauvaises herbes lorsqu'elles sont petites et en croissance active. · Deux applications de 1,75 L/ha (0,7 L/ac) faites à 10 jours d'intervalle peuvent être nécessaires pour tuer les vivaces. · Avec BASAGRAN FORTÉ, il n'est pas nécessaire d'ajouter un adjuvant. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent.
REFLEX (240 g/L) plus AGRAL 90 *fomésafène* plus *adjuvant*	1 L/ha 2,5 L/1000 L *0,24 kg/ha* *0,25 % v/v*	0,4 L/ac 2,5 L/1000 L	· **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki. · Appliquer en POST au stade 1–2 feuilles trifoliées de la culture. · Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. · Appliquer dans 200–350 L d'eau/ha (80–140 L d'eau/ac). · **NE PAS** appliquer quand on prévoit de la pluie dans les 4 heures qui suivent. · **NE PAS** appliquer REFLEX plus souvent qu'une fois tous les 2 ans. · **NE PAS** traiter les cultures soumises à un stress. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation. · **NE PAS récolter les haricots secs dans les 84 jours qui suivent le traitement.** · **NE PAS** récolter les haricots mange-tout dans les 30 jours qui suivent le traitement.
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée			
BASAGRAN (480 g/L) plus REFLEX (240 g/L) plus ASSIST *bentazone* plus *fomésafène* plus *concentré d'huile*	1,75 L/ha 0,58 L/ha 2 L/ha *0,84 kg/ha* *0,14 kg/ha* *2 L/ha*	0,7 L/ac 0,23 L/ac 0,8 L/ac	· Appliquer en POST quand les haricots sont au stade 1–2 feuilles trifoliées. · Utiliser **seulement** sur les haricots blancs et les haricots rognons. · Voir les étiquettes de BASAGRAN et de REFLEX pour des détails sur le stade de croissance et la hauteur des différentes mauvaises herbes. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
EXCEL SUPER (80,5 g/L) plus BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *fénoxaprop-p-éthyl* plus *bentazone* plus *concentré d'huile*	0,67 L/ha 1,75–2,25 L/ha 2 L/ha *0,054 kg/ha* *0,84–1,08 kg/ha* *2 L /ha*	0,27 L/ac 0,7–0,9 L/ac 0,8 L/ac	· Appliquer en POST quand les haricots sont entre le stade unifolié et le stade 4 feuilles trifoliées et que les graminées annuelles sont au stade 2–5 feuilles. · Appliquer en POST sur toutes les espèces de haricots secs (*Phaseolus vulgaris*) énumérées dans le tableau 7–1, *Évaluation des herbicides pour les haricots adzuki, secs, de Lima et mange-tout*, p. 95. · **NE PAS** utiliser sur les haricots adzuki. · Par temps anormalement chaud et humide, le traitement peut être temporairement nuisible aux plants de haricots. Il est alors conseillé de réduire la dose de concentré d'huile à 1 L/ha (0,4 L/ac). Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. · Voir l'étiquette de BASAGRAN pour des détails sur le stade de croissance et la hauteur des différentes mauvaises herbes. · Si l'on ne peut pas appliquer le mélange en cuve parce que les dicotylédones et les graminées ne sont pas au bon stade, faire un traitement fractionné avec chaque produit quand les mauvaises herbes sont au stade qui leur correspond. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent.
Avant la récolte			
AIM EC (240 g/L) plus surfactant non ionique **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* plus *surfactant non ionique* **ou** *MERGE*	73–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L *0,0175–0,028 kg/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	30–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. · Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes et de la culture pour assurer l'efficacité du traitement. · Respecter un **délai d'attente** de 1 jour avant la récolte.
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	2,5 L/ha 2 L/ha 1,88 L/ha 1,8 L/ha 1,67 L/ha *0,9 kg/ha*	1 L/ac 0,8 L/ac 0,75 L/ac 0,72 L/ac 0,67 L/ac	· Appliquer avant la récolte quand la teneur en eau des haricots s'est abaissée à 30 % ou moins (gousses allant du jaune au brun, chute de 80–90 % des feuilles) et qu'il reste au moins 7 jours avant la récolte. · **NE PAS** utiliser sur les haricots mange-tout. · **NE PAS** appliquer sur les cultures de semence. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · Appliquer dans 50–100 L d'eau/ha. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir les *Notes sur les herbicides*, p. 33).
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,5–3 L/ha *0,37–0,45 kg/ha*	1–1,2 L/ac	· Appliquer avant la récolte quand environ 50–75 % des gousses sont naturellement passées du vert au jaune ou au brun et qu'il reste au moins 9 jours avant la récolte. · **NE PAS** utiliser sur les haricots mange-tout. · **NE PAS** utiliser pour la dessiccation des cultures de semence. · Utiliser la dose supérieure lorsque le feuillage est dense et/ou que l'infestation est forte au moment du traitement. · Appliquer dans un minimum de 110 L d'eau/ha (44 L/ac) à une pression de 275 kPa (40 psi). Lorsque le feuillage est dense et que l'infestation est forte, appliquer dans 170–220 L d'eau/ha (68–88 L/ac). · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 4 heures qui suivent.
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90 ou AG-SURF *diquat* plus *surfactant*	1,25–2,3 L/ha 1 L/1000 L 0,3–0,55 kg/ha 0,1 % v/v	0,5–0,92 L/ac 1 L/1000 L	· Appliquer avant la récolte quand 80 % des feuilles des plants de haricots sont tombées naturellement et qu'au moins 80 % des gousses ont viré au jaune. · **NE PAS** utiliser sur les haricots de Lima ni sur les haricots mange-tout. · Éviter une repousse en effectuant le traitement 7 jours avant la date de maturité du cultivar, et faire la récolte 5–7 jours après le traitement. · Utiliser la dose de 1,25–1,7 L/ha pour une application terrestre et 1,7–2,3 L/ha pour une application par aéronef. · Utiliser un volume minimal de 225 L de bouillie/ha. · Utiliser la dose supérieure si le feuillage est dense ou que l'infestation est forte. · **NE PAS** traiter quand on prévoit de la pluie dans les 15 minutes qui suivent.

Céréales

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. En conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 8–1. Évaluation des anti-graminées et liste des herbicides homologués pouvant s'ajouter dans des mélanges en cuve destinés aux cultures céréalières

	Culture visée par l'homologation										Graminées annuelles et vivaces										Anti-dicotylédones pouvant s'ajouter dans des mélanges en cuve							
Nom commercial	avoine	orge de printemps	blé de printemps	orge d'automne	seigle d'automne	blé d'automne	luzerne contre-ensemencée	trèfle rouge contre-ensemencé	lotier contre-ensemencé	graminées fourragères contre-ensemencées	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	chiendent commun	folle avoine	BUCTRIL M, BADGE	BROTEX	INFINITY	KORIL	LOGIC M	MEXTROL	PARDNER	Tolérance de la culture
Anti-graminées radiculaires																												
TREFLAN, RIVAL **ou** BONANZA					✓	✓					**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	7	2	**8**								P
Anti-graminées de postlevée																												
ACHIEVE LIQUID		✓	✓			✓	✓	✓	✓		**8**	-	-	-	**9**	**9**	-	-	0	**9**	p. 116	p. 117	p. 117	p. 116	p. 116	p. 116	p. 116	B
PUMA[120] SUPER **ou** PUMA ADVANCE			✓								9	-	-	-	9	9	-	-	0	**9**	p. 117				p. 117	p. 117		B

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. En conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 8–2. Évaluation des herbicides pour les cultures céréalières

	Culture visée par l'homologation										Dicotylédones annuelles																													Vivaces											
Nom commercial	avoine	orge de printemps	blé de printemps	oge d'automne	seigle d'automne	blé d'automne	luzerne contre-ensemencée	trèfle rouge contre-ensemencé	lotier contre-ensemencé	graminées fourragères contre-ensemencées	arroche étalée	renouée liseron	canola spontané	lampourde glouteron	matricaire inodore	stellaire moyenne	gaillet gratteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	ortie royale	renouée persicaire	chénopode blanc	laitue scariole	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	bourse-à-pasteur	tabouret des champs	abutilon	violette des champs	liseron des champs	carotte sauvage	céraiste vulgaire	patience crépue	pissenlit	lierre terrestre	prêle	laiteron des champs	chardon des champs	vesces	Tolérance de la culture
Anti-dicotylédones radiculaires																																																	
TREFLAN, RIVAL **ou** BONANZA				✓	✓	✓					-	**5**	0	2	-	-	-	-	0	5	2	**8**	-	2	2	**8**	2	1	-	-	2	-	2	-	-	0	0	-	2	2	2	-	P
Anti-dicotylédones de postlevée																																																
2,4-D*		✓	✓		✓	✓					7	**4**	**8**	**8**	-	**2**	2	2	8	2	**4**	**9**	9	**9**	7	**9**	**8**	-	**9**	**9**	**8**	-	**7**	1	-	**7**	**6**	-	2	5	**8**	0	P
BANVEL II **ou** ORACLE	✓	✓	✓			✓				✓	-	**9**	-	9	-	8	7	**9**	8	7	**9**	9	5	7	9	9	9	-	6	6	9	-	8	1	-	9	6	-	0	8	**8**	5	M
BUCTRIL M, BADGE, MEXTROL **ou** LOGIC M	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	6	**9**	9	**8**	5	2	4	2	7	7	**9**	**9**	8	**9**	**9**	8	**9**	-	**9**	**9**	**9**	5	7	1	-	-	6	-	7	**7**	**7**	-	E
DYVEL	✓	✓	✓	✓		✓					-	**9**	-	-	-	-	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	9	**9**	-	**9**	**9**	-	**9**	**9**	-	-	8		-	-	-	-	-	**8**	**8**	-	M
EMBUTOX, CALIBER **ou** COBUTOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	6	7	9	-	2	-	2	-	2	4	**9**	-	**7**	7	**9**	**8**	-	8	**6**	8	-	-	-	2	6	5	-	2	5	-	2	B
ESTAPROP PLUS, DICHLORPROP-D **ou** TURBOPROP		✓	✓			✓					8	**8**	9	-	6	2	3	2	8	**7**	**8**	**9**	9	**9**	-	**9**	**9**	-	**9**	**9**	-	6	7	3	-	-	9	-	2	8	**8**	6	B

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓ Peut être utilisé sur cette culture.

TABLEAU 8–2. Évaluation des herbicides pour les cultures céréalières (suite)

Nom commercial	Culture visée par l'homologation										Dicotylédones annuelles																											Vivaces											Tolérance de la culture
	avoine	orge de printemps	blé de printemps	oge d'automne	seigle d'automne	blé d'automne	luzerne contre-ensemencée	trèfle rouge contre-ensemencé	lotier contre-ensemencé	graminées fourragères contre-ensemencées	arroche étalée	renouée liseron	canola spontané	lampourde glouteron	matricaire inodore	stellaire moyenne	gaillet gratteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	ortie royale	renouée persicaire	chénopode blanc	laitue scariole	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	bourse-à-pasteur	tabouret des champs	abutilon	violette des champs	liseron des champs	carotte sauvage	céraiste vulgaire	patience crépue	pissenlit	lierre terrestre	prêle	laiteron des champs	chardon des champs	vesces	
INFINITY		✓	✓			✓					**9**	**9**	9	-	-	**9**	**8**	-	8	**9**	-	**9**	8	**9**	-	**9**	9	9	**9**	**9**	-	5	-	2	-	-	**7**	-	-	**8**	7	5	E
LONTREL		✓	✓								3	**8**	0	5	**8**	2	-	-	-	-	5	2	-	2	2	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	**9**	**9**	9	P
MCPA*	✓	✓	✓		✓	✓					-	2	9	**7**	-	**2**	3	**7**	7	**8**	**2**	**9**	9	**9**	-	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**8**	-	7	1	-	-	6	-	8	7	7	5	P
MCPA SODIUM	✓	✓	✓		✓	✓		✓			-	2	9	**7**	-	**2**	-	**7**	7	**8**	**2**	**9**	-	**9**	-	**9**	**8**		**9**	**9**	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
MECOPROP **ou** COMPITOX	✓	✓	✓	✓		✓					-	2	-	-	-	**9**	-	**9**	-	2	2	**9**	-	**9**	-	9	9	-	-	7	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	**7**	5	B
PARDNER, BROTEX **ou** KORIL	✓	✓	✓		✓	✓					-	**8**	7	**8**	-	2	-	2	-	2	**8**	**9**	-	**7**	**9**	**7**	**9**	-	**8**	**8**	**9**	-	5	-	-	-	-	-	0	6	5	-	E
REFINE SG	✓	✓	✓			✓					-	**9**	**9**	-	**7**	**9**	**6**	**9**	4	**9**	9	**9**	8	**8**	-	**9**	2	-	**9**	**9**	8	7	2	8	-	-	5	-	-	**8**	**8**	-	E
TARGET, TRACKER XP **ou** SWORD	✓	✓	✓	✓		✓					-	9	9	-	-	2	8	9	8	8	8	9	9	9	-	9	9	-	9	9	-	-	**8**	5	-	-	6	-	-	**8**	**8**	-	M
TROPHY[1]						✓					8	**7**	**5**	**9**	-	-	**9**	-	-	**8**	7	**9**	**8**	**9**	-	**9**	**9**	-	**9**	**9**	-	8	-	-	-	-	-	9	-	8	8	**7**	B
TROPOTOX PLUS, CLOVITOX PLUS **ou** TOPSIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	-	7	9	-	-	2	-	2	-	**8**	2	**9**		**9**	-	**9**	**8**	-	**9**	**9**	9	-	**8**	-	-	-	-	-	-	**9**	**9**	5	B
Mélanges en cuve d'anti-dicotylédones de postlevée																																												
BUCTRIL M, BADGE, LOGIC M **ou** MEXTROL + MCPA*		✓	✓		✓	✓					6	**9**	9	**8**	7	**2**	4	2	7	7	**9**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	5	**7**	1	-	**7**	**6**	-	7	**7**	**8**	-	P
EMBUTOX, CALIBER **ou** COBUTOX + MCPA	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		-	6	9	9	-	2	-	2	-	2	4	**9**	-	**9**	7	**9**	**8**	-	8	**6**	8	-	-	-	2	6	5	-	2	5	-	2	B

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

TABLEAU 8–2. Évaluation des herbicides pour les cultures céréalières (suite)

	Culture visée par l'homologation										Dicotylédones annuelles																											Vivaces										
Nom commercial	avoine	orge de printemps	blé de printemps	oge d'automne	seigle d'automne	blé d'automne	luzerne contre-ensemencée	trèfle rouge contre-ensemencé	lotier contre-ensemencé	graminées fourragères contre-ensemencées	arroche étalée	renouée liseron	canola spontané	lampourde glouteron	matricaire inodore	stellaire moyenne	gaillet gratteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	ortie royale	renouée persicaire	chénopode blanc	laitue scariole	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	bourse-à-pasteur	tabouret des champs	abutilon	violette des champs	liseron des champs	carotte sauvage	céraiste vulgaire	patience crépue	pissenlit	lierre terrestre	prêle	laiteron des champs	chardon des champs	vesces	Tolérance de la culture
LONTREL + 2,4-D* **ou** MCPA*		✓	✓								7	**8**	8	**8**	**8**	**2**	3	2	-	2	**7**	**9**	9	**9**	7	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**8**	-	**7**	-	-	**7**	**6**	-	2	**9**	**9**	**9**	P
PARDNER **ou** KORIL + 2,4-D* **ou** MCPA*		✓	✓		✓	✓					6	**8**	9	**8**	-	**2**	2	2	-	2	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	-	**7**	1	-	**7**	**6**	-	2	6	**8**	0	P
REFINE SG + 2,4-D*		✓	✓			✓					-	**9**	**9**	**8**	**7**	**9**	6	**9**	7	**9**	**9**	**9**	9	**9**	7	**9**	9	-	**9**	**9**	**8**	7	**7**	8	-	**7**	**6**	-	2	**8**	**8**	-	P
REFINE M[1]	✓	✓	✓			✓					8	**9**	**9**	**8**	**7**	**9**	**6**	**9**	7	**9**	**9**	**9**	9	**9**	7	**9**	9	**8**	**9**	**9**	**8**	7	**7**	8	-	**7**	**6**	-	2	**8**	**8**	-	B

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

Céréales

Appliquer tous ces traitements dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac), sauf indication contraire.

La rotation des cultures est un excellent moyen de prévenir la prolifération des mauvaises herbes qui accompagne la culture des céréales à pailles. Le peuplement de folle avoine peut s'accroître et limiter sérieusement le rendement dans les champs où les céréales à paille sont cultivées continuellement. En revanche, certaines mauvaises herbes, comme le panic millet, résistent mal à la compétition d'une céréale.

Un travail superficiel du sol avec une herse légère, avant la levée des céréales, permet de tuer une partie des mauvaises herbes en germination. On peut aussi passer une herse légère jusqu'au stade 3 feuilles des céréales, ou une herse bineuse à pointes flexibles en équerre au stade 4 feuilles, pour mieux éliminer les petites dicotylédones annuelles. Le moment propice pour effectuer le hersage est critique. Il faut que les mauvaises herbes soient petites et que la surface du sol soit sèche et meuble.

Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre et commencent à peine leur croissance pour qu'elles soient tuées par les doses d'herbicides utilisées sur les céréales. Ce sont les mauvaises herbes qui se développent au tout début de la croissance des céréales (jusqu'au stade 5 feuilles) qui nuisent le plus au rendement de ces dernières.

Le stade de croissance auquel il convient de traiter sans que la céréale en souffre varie selon la céréale et l'herbicide utilisé. Consulter l'étiquette du produit pour connaître le moment propice. Quand on compte les

FIGURE 8–1. Stades de croissance foliaire des céréales



feuilles sur un plant de céréale, on ne tient pas compte des feuilles du tallage. La figure 8–1, ci-dessus, permet de reconnaitre les stades foliaires des céréales qui sont mentionnés dans le présent chapitre.

Les céréales présentent l'avantage de se développer en moins d'une saison de végétation. Ceci est particulièrement vrai pour les céréales d'automne où le travail du sol avant le semis et après la récolte permet de stimuler la germination des graines de mauvaises herbes et de réduire ainsi les peuplements de mauvaises herbes vivaces.

Moments des traitements herbicides

- **Présemis (PP) —** Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis, Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.
- **Incorporation en présemis (IPS)**
- **Prélevée (PRÉ)**

Postlevée (POST) — Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours utiliser les techniques anti-dérive qui s'imposent.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CÉRÉALES			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
TREFLAN (480 g/L) **ou** RIVAL DF (60 DF) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	0,8–1,14 L/ha 0,64–0,91 kg/ha 0,96–1,37 L/ha *0,383–0,546 kg/ha*	0,32–0,46 L/ac 0,26–0,36 kg/ac 0,38–0,55 L/ac	· Utiliser uniquement sur le blé d'automne. · Pour la maîtrise de l'agrostide des champs à l'automne. · Appliquer le plus tôt possible après le semis. · Incorporer peu profondément dans le sol avec des herses traînées. · Semer la céréale à environ 5 cm de profondeur afin d'éviter le contact entre la graine en germination et le produit chimique.
Anti-graminées de postlevée			
ACHIEVE LIQUID (400 g/L) plus TURBOCHARGE *tralkoxydime* plus *adjuvant*	0,5 L/ha 0,5 L/100 L *0,2 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,2 L/ac 0,5 L/100 L	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine cultivée, l'orge d'automne ni le seigle d'automne. · Appliquer au stade 1–6 feuilles de la folle avoine. · Appliquer dans 50–100 L d'eau/ha. · Les herbicides qui ne figurent pas sur l'étiquette peuvent être appliqués séparément 7 jours après l'application d'ACHIEVE LIQUID. · On obtient une moins bonne maîtrise de la folle avoine si l'application de REFINE SG précède celle d'ACHIEVE LIQUID. · **NE PAS** mélanger en cuve REFINE SG et ACHIEVE LIQUID. · Le sous-semis de fourrage **NE** doit **PAS** être brouté, ni servi aux animaux dans l'année du traitement. · La paille à maturité peut être servie aux animaux. Une application par année.
PUMA[120] SUPER (120 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl/ phytoprotecteur*	0,77 L/ha *92,4 g/L*	0,31 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** sur le blé de printemps. · Sert à lutter contre la folle avoine et autres graminées adventices. · Appliquer au stade 1–6 feuilles du blé de printemps. · PUMA[120] SUPER contient un phytoprotecteur qui aide les cultures céréalières à métaboliser le fénoxaprop-p-éthyl. Les produits à base de fénoxaprop-p-éthyl qui ne renferment pas ce phytoprotecteur (comme EXCEL SUPER) causent des dommages inacceptables aux cultures. · Si l'on utilise **PUMA ADVANCE,** utiliser la dose de 1,02 L/ha (0,41 L/ac).
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D*	0,75–1,8 L/ha 0,62–1,4 L/ha 0,53–1,29 L/ha *0,35–0,85 kg/ha*	0,3–0,7 L/ac 0,25–0,56 L/ac 0,21–0,52 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. · Traiter lorsque les céréales de printemps sont au stade 3–5 feuilles. **DANS LES CÉRÉALES D'AUTOMNE :** · **NE PAS** appliquer sur des plantules de céréales d'automne à l'automne. · Contre les annuelles d'automne, traiter tôt, avant l'apparition des boutons floraux des mauvaises herbes.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	0,23–0,29 L/ha *0,11–0,139 kg/ha*	0,09–0,12 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. · L'efficacité est optimale quand les mauvaises herbes sont au stade 2–3 feuilles ou que les rosettes ont moins de 5 cm de diamètre. Utiliser les doses supérieures sur les mauvaises herbes plus avancées. · **NE PAS** appliquer si, avant et après le traitement, il fait moins de **10 °C** la nuit. · Appliquer sur l'orge et le blé de printemps parvenus au stade 2–5 feuilles. · Appliquer sur le blé d'automne au printemps entre le moment où la culture atteint 15–25 cm de hauteur et la sortie de la feuille de l'épi. · Les plantules de graminées contre-ensemencées devraient être au stade 2–4 feuilles.
BUCTRIL M (560 g/L) **ou** BADGE, LOGIC M, MEXTROL (450 g/L) *bromoxynil/MCPA*	1 L/ha 1,25 L/ha *0,56 kg/ha*	0,4 L/ac 0,5 L/ac	· Appliquer quand les mauvaises herbes sont au stade 2–6 feuilles et que les céréales sont entre le stade 2 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. Pour maîtriser les mauvaises herbes annuelles d'automne, traiter avant l'apparition des boutons à fleurs. · Pour un maximum de résultats, faire l'application au stade 2–5 feuilles des céréales étant donné que l'efficacité du traitement nécessite le mouillage complet du feuillage des mauvaises herbes. **SOUS-SEMIS DE TRÈFLE ROUGE (BLÉ D'AUTOMNE SEULEMENT) :** · **NE PAS** appliquer sur le seigle d'automne ni sur les céréales de printemps contre-ensemencés de trèfle rouge. · Pulvériser au printemps quand le trèfle rouge est entre les stades 1re feuille et 3e feuille trifoliée et que la végétation du blé d'automne fournit une couverture protectrice au trèfle. · **NE PAS** appliquer dans moins de 200 L d'eau/ha (80 L/ac). · **NE PAS** épandre si le trèfle souffre d'un stress quelconque et éviter de pulvériser deux fois au même endroit car cela pourrait endommager le trèfle.
DYVEL (420 g/L) *dicamba/MCPA*	1,25 L/ha *0,525 kg/ha*	0,5 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur le seigle d'automne, l'orge d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. · Appliquer quand les céréales de printemps sont au stade 2–5 feuilles. · L'ortie royale, la spargoute des champs et la saponaire des vaches sont mieux maîtrisées lorsque le traitement a lieu alors qu'elles sont encore petites. · Appliquer au printemps sur le blé d'automne quand les mauvaises herbes ont levé, entre le moment où la culture atteint 15–25 cm et la sortie de la feuille de l'épi. · **NE PAS** appliquer si, avant et après le traitement, il fait moins de **10 °C** la nuit.
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	1,75–2,25 L/ha *1,1–1,4 kg/ha*	0,7–0,9 L/ac	· Appliquer le 2,4-DB entre le stade 5 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi des céréales. · Avant le stade 5 feuilles, l'avoine risque d'être endommagée par le traitement. · Appliquer lorsque les légumineuses sont au stade 1–4 feuilles trifoliées. · Faire ce traitement **uniquement** si les céréales sont contre-ensemencées de luzerne, de lotier corniculé, de trèfle alsike ou ladino, ou de graminées. Le 2,4-DB endommage le trèfle rouge. · Traiter avec 150–200 L d'eau/ha (60–80 L/ac). · Traitement inefficace contre la moutarde des champs ayant dépassé le stade 4 feuilles.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	1,75 L/ha *1,017 kg/ha*	0,7 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. · Appliquer sur les mauvaises herbes levées entre le stade 4 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi des céréales de printemps. **DANS LE BLÉ D'AUTOMNE :** · Appliquer au début du printemps sur les mauvaises herbes sorties de terre. · S'utilise jusqu'au stade sortie de la feuille de l'épi.
INFINITY *pyrasulfotole/bromoxynil*	0,83 L/ha *213 g/ha*	0,33 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. · Appliquer en POST avant la sortie de la feuille de l'épi. · Ajouter du sulfate d'ammonium à raison de 1 L/ha (0,4 L/ac) pour maîtriser le gaillet grateron au stade 4–6 verticilles. · **NE PAS** permettre le pâturage dans les cultures traitées ni couper celles-ci comme fourrage ou foin dans les 25 jours suivant l'application. · **NE PAS** récolter de blé ou l'orge pour le grain ou la paille dans les 45 jours suivant l'application.
LONTREL 360 (360 g/L) *clopyralide*	0,42–0,56 L/ha *0,15-0,2 kg/ha*	0,17–0,22 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, les céréales d'automne ni les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. · Appliquer lorsque le blé ou l'orge est entre le stade 3 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. · Détruit le chardon des champs et le laiteron des champs (partie aérienne seulement).
MCPA (500 g/L)* MCPA (600 g/L)* *MCPA*	0,7–1,7 L/ha 0,58–1,4 L/ha *0,35-0,85 kg/ha*	0,28–0,68 L/ac 0,23–0,56 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur des céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. · Traiter quand la céréale est entre les stades 2 et 5 feuilles. · Contre l'ortie royale, utiliser la dose supérieure de MCPA.
MCPA SODIUM 300 (300 g/L)* *MCPA*	1–1,5 L/ha *0,3-0,45 kg/ha*	0,4–0,6 L/ac	· Traitement destiné aux céréales contre-ensemencées de trèfle rouge. · Traiter au début de la croissance du trèfle lorsqu'il est recouvert par du feuillage. · Appliquer au printemps entre le moment où la culture commence à croître et le stade sortie de la feuille de l'épi. · Traiter à raison de 180–240 L d'eau/ha (72–96 L/ac). · La dose inférieure risque de ne pas tuer l'herbe à poux.
MECOPROP (150 g/L) **ou** COMPITOX (150 g/L) *mécoprop-P*	5,5–7 L/ha *0,83-1,05 kg/ha*	2,2–2,8 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur le seigle d'automne ni sur les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. · Faire le traitement entre le stade 3 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi quand les céréales sont hautes de 10–15 cm. · Appliquer lorsque les mauvaises herbes ont de 2 à 4 feuilles. · Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes plus avancées.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PARDNER (280 g/L) **ou** BROTEX (240 g/L) **ou** KORIL (235 g/L) *bromoxynil*	1–1,2 L/ha 1,2–1,4 L/ha 1,2–1,4 L/ha *0,28–0,336 kg/ha*	0,4–0,48 L/ac 0,48–0,56 L/ac 0,48–0,56 L/ac	• Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont au stade 1–4 feuilles et lorsque les céréales sont entre le stade 2 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. Employer la dose supérieure lorsque les mauvaises herbes ont dépassé le stade 4 feuilles. • Céréales de printemps : Le mieux est de traiter au moment où les céréales sont au stade 2–5 feuilles étant donné que l'efficacité du traitement dépend du bon recouvrement du feuillage des mauvaises herbes. • Blé d'automne : Ce traitement est plus efficace contre les annuelles d'automne lorsqu'il est fait à l'automne.
REFINE SG (50 %) plus surfactant non ionique *thifensulfuron-méthyl/ tribenuron-méthyl* plus *surfactant non ionique*	30 g/ha 2 L/1000 L *15 g/ha* *0,2 % v/v*	12 g/ac 2 L/1000 L	• **NE PAS** appliquer sur l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. • Appliquer quand les céréales sont entre le stade 2 feuilles et le stade feuille de l'épi. • Blé d'automne : Appliquer une fois, soit au printemps, soit à l'automne. • Appliquer sur les mauvaises herbes quand elles sont jeunes et en croissance active avant qu'elles atteignent 10 cm de hauteur ou de largeur. • Le traitement détruit la partie aérienne du chardon des champs, du laiteron des champs et de la mauve à feuilles rondes. • SI L'ON UTILISE REFINE EXTRA, utiliser une dose de 20 g/ha ou de 8 g/ac plus un surfactant non ionique à raison de 2 L/1000 L de bouillie.
TARGET (400 g/L) **ou** TRACKER XP (400 g/L) **ou** SWORD (400 g/L) *dicamba/MCPA/mécoprop*	1–1,5 L/ha *0,4–0,6 kg/ha*	0,4–0,6 L/ac	• **NE PAS** appliquer sur du seigle ni sur des céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. • Traiter quand l'avoine ou le blé de printemps est au stade 2–5 feuilles ou que l'orge de printemps est au stade 2–4 feuilles. • Céréales d'automne : Appliquer au printemps avant que la culture atteigne 30 cm (feuille supérieure déployée). • Appliquer quand les mauvaises herbes sont au stade 2–3 feuilles. • Appliquer la dose supérieure si les mauvaises herbes ont dépassé le stade 3 feuilles. • **NE PAS** appliquer si, avant et après le traitement, il fait moins de **10 °C** la nuit.
TROPHY[1] TROPHY A (180 g/L) plus TROPHY B (500 g/L) *fluroxypyr* plus *MCPA*	 0,6 L/ha 1,12 L/ha *108 g/ha* *560 g/ha*	 0,24 L/ac 0,45 L/ac	• Utiliser uniquement sur le blé d'automne. • Appliquer du stade 3 talles jusqu'au stade sortie de la feuille de l'épi du blé d'automne. • **NE PAS** appliquer sur du blé d'automne contre-ensemencé de trèfle rouge. • Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte et se limiter à une seule application par année.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA*	2,75–4,25 L/ha *1,1–1,7 kg/ha*	1,1–1,7 L/ac	· Appliquer MCPB/MCPA entre le stade 2 feuilles et le stade feuille de l'épi des céréales de printemps. · Céréales d'automne : Appliquer au printemps entre le stade 2 feuilles et le stade feuille de l'épi de la culture. · Faire ce traitement **uniquement** si les céréales sont contre-ensemencées de trèfle rouge, alsike, ladino ou rampant, ou de graminées. · Appliquer entre le stade unifolié et le stade 4 feuilles trifoliées des légumineuses. · Traiter avec 150–200 L d'eau/ha (60–80 L/ac).
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée			
ACHIEVE LIQUID (400 g/L) plus BUCTRIL M (560 g/L) **ou** BADGE, MEXTROL, LOGIC M (450 g/L) plus TURBOCHARGE *tralkoxydime* plus *bromoxynil/MCPA* plus *huile minérale/surfactant*	0,5 L/ha 1 L/ha 1,25 L/ha 0,5 L/100 L *0,2 kg/ha* *0,56 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,2 L/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac 0,5 L/100 L	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne ni le seigle d'automne. · Appliquer lorsque la folle avoine est au stade 1–6 feuilles, les dicotylédones au stade 1–4 feuilles et les céréales entre le stade 2 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. · Voir également les précautions relatives aux produits BUCTRIL M, BADGE, MEXTROL et LOGIC M, p. 113.
ACHIEVE LIQUID (400 g/L) plus PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL (235 g/L) plus TURBOCHARGE *tralkoxydime* plus *bromoxynil* plus *huile minérale/surfactant*	0,5 L/ha 1–1,12 L/ha 1,2–1,4 L/ha 0,5 L/100 L *0,2 kg/ha* *0,28–0,336 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,2 L/ac 0,4–0,48 L/ac 0,48–0,56 L/ac 0,5 L/100 L	· **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne ni le seigle d'automne. · Appliquer lorsque la folle avoine est au stade 1–6 feuilles, les dicotylédones au stade 1–4 feuilles et les céréales entre le stade 2 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. · Voir également les précautions relatives aux produits PARDNER, BROTEX et KORIL, p. 115.
BUCTRIL M (560 g/L) **ou** BADGE, MEXTROL, LOGIC M (450 g/L) plus MCPA AMINE (500 g/L) *bromoxynil/MCPA* plus *MCPA*	1 L/ha 1,25 L/ha 0,55 L/ha *0,56 kg/ha* *0,28 kg/ha*	0,4 L/ac 0,5 L/ac 0,22 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur des céréales contre-ensemencées de cultures fourragères (incluant le trèfle rouge). · Ajouter MCPA pour une action renforcée contre l'ortie royale (jusqu'au stade 4 feuilles) et contre le canola spontané (jusqu'au stade 8 feuilles). · Mettre d'abord MCPA dans le cuve, puis ajouter l'un ou l'autre des produits BUCTRIL M, MEXTROL, BADGE ou LOGIC M.
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) plus MCPA AMINE (500 g/L) *2,4-DB* plus *MCPA*	1,25 L/ha 70 mL/ha *0,8 kg/ha* *35 g/ha*	0,5 L/ac 28 mL/ac	· Appliquer lorsque les légumineuses sont au stade 1–4 feuilles. · Faire ce traitement si les céréales sont contre-ensemencées **uniquement** de luzerne, de lotier corniculé, de trèfle alsike ou ladino, ou de graminées. · L'ajout de MCPA permet un traitement plus efficace contre la moutarde que le 2,4-DB seul. · Traiter avec 150–200 L d'eau/ha (60–80 L/ac).

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
INFINITY plus ACHIEVE LIQUID (400 g/L) *pyrasulfotole/bromoxynil* plus *tralkoxydime* plus *huile minérale/surfactant*	0,83 L/ha 0,5 L/ha *213 g/ha* *0,2 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,33 L/ac 0,2 L/ac	• **NE PAS** appliquer sur l'avoine, l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de légumineuses. • Appliquer en POST avant la sortie de la feuille de l'épi. • Ajouter du sulfate d'ammonium à raison de 1 L/ha (0,4 L/ac) pour maîtriser le gaillet grateron au stade 4–6 verticilles. • **NE PAS** permettre le pâturage dans les cultures traitées ni couper celles-ci comme fourrage ou foin dans les 25 jours suivant l'application. • **NE PAS** récolter de blé ou l'orge pour le grain ou la paille dans les 45 jours suivant l'application.
LONTREL 360 (360 g/L plus 2,4-D (470 g/L)* **ou** MCPA AMINE (500 g/L)* *clopyralide* plus *2,4-D* **ou** plus *MCPA*	0,28–0,69 L/ha 0,75–1,81 L/ha 0,7–1,7 L/ha *0,1–0,25 kg/ha* *0,35–0,85 kg/ha* *0,35–0,85 kg/ha*	0,11–0,28 L/ac 0,3–0,72 L/ac 0,28–0,68 L/ac	• Utiliser **uniquement** sur le blé et l'orge de printemps. • LONTREL n'est pas homologué pour une utilisation sur l'avoine dans l'est du Canada. • **NE PAS** pulvériser de produits renfermant du 2,4-D sur de l'avoine, sous peine d'endommager la culture. • En combinaison avec du 2,4-D ou du MCPA, LONTREL 360 tient le chardon des champs en échec pendant 6–8 semaines si l'on utilise la dose inférieure et pendant toute la saison si l'on utilise la dose supérieure.
PARDNER (280 g/L) **ou** BROTEX (240 g/L) **ou** KORIL (235 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)* **ou** MCPA AMINE (500 g/L)* *bromoxynil* plus *2,4-D* **ou** plus *MCPA*	1 L/ha 1,2 L/ha 1,2 L/ha 0,6 L/ha 0,55–1,1 L/ha *0,28 kg/ha* *0,28 kg/ha* *0,28–0,55 kg/ha*	0,4 L/ac 0,48 L/ac 0,48 L/ac 0,24 L/ac 0,22–0,44 L/ac	• **NE PAS** appliquer sur l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. • **NE PAS** appliquer le mélange en cuve de 2,4-D sur de l'avoine. • Appliquer au printemps sur des céréales entre le stade 4 feuilles et le stade sortie de la feuille de l'épi. • Contre les moutardes, sisymbres et vélars, ajouter du 2,4-D ou la dose inférieure de MCPA. • Contre l'ortie royale, utiliser du MCPA à la dose supérieure.
PUMA[120] SUPER (120 g/L) plus BUCTRIL M (560 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl/* *phytoprotecteur*	0,77 L/ha 1 L/ha *92,4 g/L*	0,31 L/ac 0,4 L/ac	• Utiliser **UNIQUEMENT** sur le blé de printemps. • Utiliser pour maîtriser la folle avoine et les graminées et dicotylédones adventices. • Appliquer au stade 1–6 feuilles du blé de printemps. • PUMA[120] SUPER contient un phytoprotecteur qui aide les cultures céréalières à métaboliser le fénoxaprop-p-éthyl. Les produits à base de fénoxaprop-p-éthyl qui ne renferment pas ce phytoprotecteur (comme EXCEL SUPER) causent des dommages inacceptables aux cultures.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
REFINE SG (50 %)	30 g/ha	12 g/ac	• **NE PAS** appliquer sur l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. • **NE PAS** pulvériser le mélange à base de 2,4-D sur de l'avoine. • Appliquer les mélanges en cuve quand la culture est entre le stade 3 feuilles déployées et le stade feuille de l'épi. • Appliquer les mélanges en cuve quand la culture est entre le stade 3 feuilles déployées et le stade 5 feuilles. • SI L'ON UTILISE REFINE EXTRA, utiliser une dose de 20 g/ha ou de 8 g/ac plus un surfactant non ionique à raison de 2 L/1000 L de bouillie.
2,4-D (470 g/L)*	0,84–1,1 L/ha	0,34–0,45 L/ac	
ou 2,4-D (564 g/L)*	0,7–0,9 L/ha	0,28–0,36 L/ac	
ou 2,4-D (660 g/L)*	0,6–0,8 L/ha	0,24–0,32 L/ha	
plus surfactant non ionique	2 L/1000L	2 L/1000L	
thifensulfuron-méthyl/ tribenuron-méthyl	*15 g/ha*		
plus 2,4-D*	0,42–0,55 *kg/ha*		
plus *surfactant non ionique*	0,2 % *v/v*		
REFINE M[1]			• **NE PAS** appliquer sur l'orge d'automne, le seigle d'automne ni les céréales contre-ensemencées de cultures fourragères. • Appliquer les mélanges en cuve quand la culture est entre le stade 3 feuilles déployées et le stade feuille de l'épi. • Appliquer les mélanges en cuve quand la culture est entre le stade 3 feuilles déployées et le stade 5 feuilles. • SI L'ON UTILISE REFINE EXTRA, utiliser une dose de 20 g/ha ou de 8 g/ac plus un surfactant non ionique à raison de 2 L/1000 L de bouillie.
REFINE SG (50 %)	30 g/ha	12 g/ac	
plus MCPA (500 g/L)*	0,7–1,1 L/ha	0,28–0,45 L/ac	
plus surfactant non ionique	2 L/1000L	2 L/1000L	
thifensulfuron-méthyl/ tribenuron-méthyl	*15 g/ha*		
plus *MCPA**	0,35–0,55 *kg/ha*		
plus *surfactant non ionique*	0,2 % *v/v*		
Avant la récolte			
AIM EC (240 g/L)	73 à 117 mL/ha	30 à 47 mL/ac	• Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. • Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes et de la culture pour assurer l'efficacité du traitement. • Respecter un délai d'attente de 3 jours avant la récolte.
plus surfactant non ionique	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	
ou MERGE	10 L/1000 L	10 L/1000 L	
carfentrazone-éthyle	*0,0175 à 0,028 kg/ha*		
plus *surfactant non ionique*	0,25 % *v/v*		
ou *MERGE*	0,1 % *v/v*		
glyphosate (360 g/L)	2,5 L/ha	1 L/ac	• Traiter à raison de 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) lorsque la teneur en eau des grains de la céréale est d'au plus 30 %. • Traiter au plus tard 7 jours avant la récolte et seulement à l'aide de matériel terrestre. • **NE PAS** utiliser sur les cultures de semence.
ou glyphosate (450 g/L)	2 L/ha	0,8 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)	1,88 L/ha	0,75 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)	1,8 L/ha	0,72 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)	1,67 L/ha	0,67 L/ac	
glyphosate	*0,9 kg/ha*		

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

Maïs

9. MAÏS SUCRÉ, DE SEMENCE ET DE GRANDE CULTURE

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture)

	Cultures			Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							
Nom commercial	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	Tolérance de la culture
Herbicides de contact de présemis – Voir les tableaux 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85, et 6–2, *Évaluation des herbicides de présemis*, p. 87, pour la liste des herbicides et leurs cotes d'efficacité.																																
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires (en prélevée seulement)																																
PRINCEP NINE-T, SIMADEX, SIMAZINE 480	✓	✓	✓	**9**	**8**	**8**	7	**9**	**9**	**9**	**9**	2	**9**	7	9	-	**9**	**9**[R]	9	9	**9**[R]	**8**[R]	-	5	2	0	0	5	5	2	2	E
Mélanges en cuve d'herbicides radiculaires (en prélevée seulement)																																
DUAL II MAGNUM + LOROX + atrazine*		✓		9	9	9	8	8	**9**	**9**	**9**	2	**9**	7	9	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	7	0	0	0	7	0	0	0	E
PRIMEXTRA II MAGNUM + LOROX			✓	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	2	**9**	7	9	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	7	0	0	0	7	0	0	0	E

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.
✓ Peut être utilisé sur cette culture.
- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.
[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.
[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.
[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.
[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).
[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.
[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.
[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.
Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

Nom commercial	Cultures			Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles													Vivaces							Tolérance de la culture
	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Anti-dicotylédones radiculaires (en prélevée seulement)																																
atrazine*	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**[R]	9	9	**9**[R]	**9**[R]	6	5	2	0	0	0	2	2	0	E
BANVEL II, ORACLE			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	7	**8**	-	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	7	**8**	**2**	0	0	0	0	**2**	**2**	B
CALLISTO + atrazine	✓	✓	✓	2	0	4	0	2	2	2	2	2	8	7	-	-	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	8	**9**	2	0	0	0	0	0	0	E
MARKSMAN ou PROPERO			✓	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	7	**8**	**2**	0	0	0	2	**2**	**2**	B
Anti-graminées radiculaires et de début de postlevée																																
DUAL II MAGNUM	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	2	2	-	2	7	2	**8/9**[c]	**7/8**	4	3	3	0	0	0	**8**[b]	0	0	0	E
FRONTIER MAX	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	2	2	-	2	7	2	**8/9**[c]	**7/8**	4	3	3	0	0	0	**8**[b]	0	0	0	E
PROWL			✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	-	5	-	-	-	-	6	**9**	0	8	**8**	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	E
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires et de début de postlevée																																
BATTALION[1]			✓	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**[e]	9	-	8	-	**8**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	7	**8**	-	-	-	-	7[e]	7[e]	-	B
CONVERGE XT[1] CONVERGE FLEX + atrazine*			✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	6	-	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**9**	-	0	0	0	0	0	0	B
PRIMEXTRA II MAGNUM	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	2	**9**	7	9	-	**9**	**9**[R]	**9**	**9**	**9**	**9**[R]	-	2	0	0	0	**8**[b]	0	0	0	E
Mélanges en cuve radiculaires et de début de postlevée																																
DUAL II MAGNUM + BANVEL II ou ORACLE			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	2	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	9[d]	**9**[c]	**8**[e]	0	0	**8**[b]	0	**9**[e]	**8**[e]	B

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1. *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓ Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.

[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

	Cultures			Graminées annuelles										Dicotylédones annuelles												Vivaces							
Nom commercial	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	Tolérance de la culture
DUAL II MAGNUM + CALLISTO + atrazine*			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	4	**9**	8	-	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8[c]	**9**	2	0	0	**8**[b]	0	0	**0**	E
DUAL II MAGNUM + MARKSMAN ou PROPERO			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	2	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9[c]	**9**[c]	**8**[c]	0	0	**8**[b]	0	8[c]	**8**[c]	B
FRONTIER MAX + atrazine*		✓		**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**[R]	**9**	9	**9**	**9**[R]	6	5	2	0	0	**8**[b]	2	2	0	E
FRONTIER MAX + BANVEL II			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	2	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	9[c]	**9**[c]	**8**[c]	0	0	**8**[b]	0	**9**[c]	**8**[c]	B
FRONTIER MAX + MARKSMAN			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	2	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**[c]	**8**[c]	0	0	**8**[b]	0	8[c]	**8**[c]	E
PRIMEXTRA II, MAGNUM + BANVEL II ou ORACLE			✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	2	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**[c]	**8**[c]	0	0	**8**[b]	0	8[c]	**8**[c]	B
PRIMEXTRA II MAGNUM + CALLISTO	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**8**[a]	**8**	**8**	**8**	**9**	4	**9**	8	7[c]	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8[c]	**9**	2	0	0	**8**[b]	0	0	**0**	E
PROWL + atrazine*			✓	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	7	5	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**[R]	6	6	2	-	-	-	2	2	-	E
PROWL + BANVEL II ou ORACLE			✓	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	-	5	**8**	8	**8**	9	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	9[c]	**9**[c]	-	-	-	-	-	-	-	E
PROWL + MARKSMAN			✓	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	5	**9**	8	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9[c]	**9**[c]	-	-	-	-	-	-	-	E
Anti-graminées de postlevée																																	
ACCENT	✓	✓[3]	✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	9[R]	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0	E
ULTIM			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	-	-	-	-	5	5	7	2	**9**[R]	-	-	5	-	-	7	-	**9**	-	-	B

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[3] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[c] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).

[e] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

[f] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.

[g] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

Nom commercial	Cultures			Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles													Vivaces							Tolérance de la culture
	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Anti-dicotylédones de postlevée																																
2,4-D*			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**8**	2	-	**4**	**9**	**9**	7	**9**	**8**	-	8	7	0	0	0	0	8	8	P
2,4-DB* (CALIBER, COBUTOX, EMBUTOX)			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	-	0	**7**	**8**	7	**9**	**8**	-	8	8	0	0	0	0	8	8	B
atrazine* + huile	✓	✓	✓	4	4	4	0	4	4	4	4	4	**9**	7	9	-	**9**	**9**[R]	**9**	9	**9**[R]	**9**[R]	8	7	7	5	2	5	5	7	2	B
BANVEL II, ORACLE			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	0	0	0	0	**9**	**8**	B
BASAGRAN FORTÉ	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**	**9**	5	**9**	**7**	**9**	7	**8**[R]	**8**	8	**9**	**6**	0	0	**6**	0	6	**8**	E
BUCTRIL M, BADGE, LOGIC M, MEXTROL			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**9**	-	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	7	0	0	0	**7**	**7**	P
CALLISTO + atrazine	✓	✓	✓	2	0	4	0	2	2	2	2	2	8	8	-	-	9	**9**	9	**9**	**9**	**8**	**7**	**9**	2	0	0	0	0	0	0	E
DISTINCT			✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	**9**	**9**	6	9	**9**	**9**	9	**9**	8	0	0	0	0	9	9	E
IMPACT + atrazine*	✓	✓		**7**	**7**	**7**	7	8	**7**	**7**	7	7	8	9	-	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**7**	-	-	-	-	-	-	-	E
LADDOK	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**[R]	**9**	-	**9**	7	0	0	**6**	0	7	7	E
MARKSMAN ou PROPERO			✓	7	0	0	0	7	7	7	7	0	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	0	0	0	0	8	**8**	E
MCPA*			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**7**	7	-	0	**9**	**9**	-	**7**	**9**	-	7	7	6	0	0	0	7	7	M
PARDNER, KORIL	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**8**	-	-	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**[R]	**9**	-	**9**	7	0	0	0	0	7	7	E
PEAKPLUS[1]			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**9**	-	-	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	9	**9**	-	-	-	**0**	0	-	-	E
SHOTGUN			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	7	-	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	9	0	-	0	0	0	-	-	B

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.

[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

Nom commercial	Cultures			Graminées annuelles										Dicotylédones annuelles														Vivaces							Tolérance de la culture
	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
TROPOTOX PLUS, CLOVITOX PLUS, TOPSIDE			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	-	0	**7**	**8**	7	**9**	**9**	-	9	**8**	0	0	0	0	**8**	**8**	B
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée																																		
ACCENT + BANVEL II			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	-	**9**	**8**	0	0	0	**9**	**9**	**8**	B
ACCENT + CALLISTO + atrazine*			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	8	8	-	-	9	9	9	**9**	**9**	**8**	-	**9**	2	0	0	0	**9**	0	0	E
ACCENT + DISTINCT, ACCENT TOTAL[1]			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	9	9	9	9	**9**	**9**	6	9	**9**	**9**	9	**9**	8	0	6	0	**9**	9	**9**	E
ACCENT + MARKSMAN			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	0	0	0	**9**	8	**8**	E
ACCENT + PARDNER			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	-	-	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	0	0	0	**9**	7	7	E
ACCENT + PEAKPLUS[1], ACCENT ONE PASS[1]			✓	**9**	0	7/8	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	-	**9**	-	-	**9**	**9**	**9**	8[d]	**9**	**9**	9	**9**	5	0	0	0	**9**	0	0	E
ACCENT + SHOTGUN			✓	**7**	-	-	**9**	-	**7**[R]	**7**	-	-	**9**	7	-	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	9	0	-	0	0	**9**	-	-	B
atrazine* + BANVEL II ou ORACLE			✓	4	4	4	0	4	4	4	4	4	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	5	2	5	5	**9**	**8**	B
atrazine* + BUCTRIL M ou BADGE ou LOGIC M ou MEXTROL			✓	4	4	4	0	4	4	4	4	4	**9**	**9**	9	7	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	7	7	2	5	5	**7**	**7**	P
atrazine* + PARDNER ou KORIL	✓	✓	✓	4	4	4	0	4	4	4	4	4	**9**	**8**	9	7	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	7	5	2	5	5	7	2	E
BANVEL II ou ORACLE + 2,4-D*			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	0	0	0	0	**9**	**8**	P

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.
✓Peut être utilisé sur cette culture.
- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.
[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.
[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.
[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.
[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).
[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.
[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.
[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.
Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

Nom commercial	Cultures			Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
BANVEL II + PARDNER, KORIL ou BROTEX			✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**8**	9	**9**	**9**	-	**9**	**8**	0	0	0	0	**9**	**8**	B
IMPACT + FRONTIER MAX + atrazine*			✓	**9**	**9**	**9**	**9**	8	**9**	**9**	**9**	-	8	9	-	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**7**	-	-	-	-	-	-	-	E
OPTION 1.2.3.			✓	**9**	**7**	**7**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**7**	**9**	-	-	-	**9**	**9**[R]	**9**	9	**9**	**9**	9	7	-	0	0	0	-	-	-	E
OPTION + atrazine*			✓	**9**	0	**7**	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	**9**	9	-	-	**9**	**9**[R]	**9**	9	**9**[R]	**9**	-	**9**	7	5	2	5	**7/8**	7	2	E
OPTION + BANVEL II			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	**9**	8	0	0	0	**9**	**9**	**8**	B
OPTION + CALLISTO + atrazine*			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	8	8	-	-	9	9	9	**9**	**9**	**9**	8	**9**	2	0	0	0	**9**	0	0	E
OPTION + DISTINCT			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	8	9	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	8	0	0	0	**9**	0	0	B
OPTION + MARKSMAN			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	8	-	-	0	**7/8**	8	**8**	E
OPTION + PARDNER + atrazine*			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	**9**	8	-	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	7	5	2	5	**8**	7	5	E
OPTION + PEAKPLUS1			✓	**9**	0	**7**	**9**	9[R]	**9**[R]	**8**	**9**	**9**	-	9	-	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	-	-	7	0	**9**	-	-	E
PROWL + ACCENT + BANVEL II ou ORACLE			✓	**9**	9	9	**9**	8	**8**	**8**	**9**	**7**	**8**	**8**	8	**9**	**9**	**9**	6	**9**	**9**	**9**	9	**8**	-	-	-	-	-	-	-	B
PROWL + SHOTGUN			✓	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	5	**9**	7	-	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	9	0	-	0	0	0	-	-	B
ULTIM + BANVEL II, ORACLE			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**7**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	0	0	0	**9**	**9**	**8**	B
ULTIM + CALLISTO + atrazine*			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9**[R]	**7**	**9**	**9**	8	8	-	-	9	9	9	**9**	**9**	**8**	8	**9**	-	-	7	-	**9**	-	-	B

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.

[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–1. Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

Nom commercial	Cultures			Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
	maïs de semence	maïs sucré	maïs de grande culture	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
ULTIM + DISTINCT, ULTIM TOTAL[1]			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9[R]**	**7**	**9**	**9**	9	9	9	9	**9**	**9**	7	9	**9**	**9**	9	**9**	8	**8**	6	0	**9**	9	9	B
ULTIM + MARKSMAN			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9[R]**	**7**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	0	0	0	**9**	8	**8**	B
ULTIM + PARDNER			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9[R]**	**7**	**9**	**9**	**9**	**8**	-	-	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	0	0	0	**9**	7	7	B
ULTIM + PARDNER + atrazine*			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	9[R]	**9[R]**	**7**	**9**	**9**	**9**	**8**	9	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	7	5	2	5	**9**	7	2	B
ULTIM + PEAKPLUS[1]			✓	**9**	0	**7/8**	**9**	**9[R]**	**9[R]**	**7**	**9**	**9**	-	**9**	-	-	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	9	**9**	-	-	7	-	**9**	-	-	B
ULTIM + SHOTGUN			✓	**8**	0	**7/8**	**8**	-	**9[R]**	**7**	-	-	**9**	7	-	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	9	0	-	7	0	**9**	-	-	B

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré d'efficacité, faire le traitement par incorporation en présemis (IPS).

[c] Pour une efficacité optimale, faire le traitement en prélevée.

[d] L'ajout d'atrazine est nécessaire pour obtenir ce niveau d'efficacité.

[e] Il faut que les mauvaises herbes soient sorties de terre pour obtenir ce degré d'efficacité.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture)

	Cultures spontanées		Graminées			Dicotylédones annuelles et bisannuelles												Vivaces			
Nom commercial	haricots adzuki spontanés	blé spontané	*Cenchrus*	éragrostide fétide	éragrostide pectinée	sicyos anguleux	armoise bisannuelle	stellaire moyenne	ketmie trilobée	laitue scariole	lampsane commune	arroche étalée	renouée écarlate	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	morelle de la Caroline	agrostide blanche	vesce jargeau	muhlenbergie feuillée
Anti-graminées radiculaires																					
DUAL II MAGNUM	-	-	5	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**	-	-	-	-	-	-
FRONTIER MAX	-	-	5	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**	-	-	-	-	-	-
PROWL	-	6	6	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-dicotylédones radiculaires																					
atrazine*	-	2	-	-	-	5	-	9	-	-	-	-	2	9	0	-	9	-	-	-	-
CALLISTO + atrazine	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	**9**	-	-	-	0	-	0
MARKSMAN, PROPERO	-	2	-	-	-	5	-	9	-	-	-	6	3	9	8	-	9	-	-	-	-
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																					
BATTALION[1]	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVERGE XT[1] **ou** CONVERGE FLEXX + atrazine*	-	2	6	-	-	5	-	9	-	-	-	7	4	9	**9**	-	9	-	-	-	-
PRIMEXTRA II MAGNUM	-	2	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**	-	-	-	-	-	-
Anti-graminées de postlevée																					
ACCENT	-	7[c]	7	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6
OPTION 2.25 OD	-	7[c]	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	**9**
ULTIM	-	7[c]	**8**	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	6
Anti-dicotylédones de postlevée																					
atrazine* + huile	-	2	-	-	-	5	8	9	7	-	9	2	0	9	0	2	9	-	-	-	-
BANVEL II, ORACLE	-	0	-	-	-	2	9	9	9	8	9	7	6	7	9	6	9	-	-	8	-
CALLISTO + atrazine	**9**	2	-	-	-	4	-	9	-	-	6	5	-	0	**9**	8	-	-	0	6	0
DISTINCT	-	-	-	-	-	2	9	9	9	8	9	7	5	9	**9**	8	-	5	-	8	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[c] Les céréales spontanées sont proches de l'épiaison quand ces produits sont normalement appliqués; des traitements plus hâtifs donnent de meilleurs résultats.

TABLEAU 9–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture) (suite)

	Cultures spontanées		Graminées			Dicotylédones annuelles et bisannuelles												Vivaces			
Nom commercial	haricots adzuki spontanés	blé spontané	*Cenchrus*	éragrostide fétide	éragrostide pectinée	sicyos anguleux	armoise bisannuelle	stellaire moyenne	ketmie trilobée	laitue scariole	lampsane commune	arroche étalée	renouée écarlate	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	morelle de la Caroline	agrostide blanche	vesce jargeau	muhlenbergie feuillée
LADDOK	-	-	-	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARKSMAN, PROPERO	-	-	-	-	-	6	9	9	9	9	9	7	3	9	**9**	9	-	-	-	8	-
PARDNER + atrazine*	-	-	-	-	-	**8**	9	9	9	8	9	9	1	9	9	7	-	-	-	-	-
PEAKPLUS[1]	-	-	-	-	-	3	8	9	8	8	6	7	6	8	6	9	-	-	-	7	-
SHOTGUN	-	-	-	-	-	6	9	9	9	8	9	-	0	9	9	-	-	-	-	-	-
Mélanges en cuve d'anti-graminées et d'anti-dicotylédones de postlevée																					
ACCENT + CALLISTO + atrazine*	**9**	7[c]	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	**9**	8	-	-	-	-	-
BATTALION[1]	-	8[b]	8	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ULTIM + BANVEL II, ORACLE	-	7[c]	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	6
ULTIM + CALLISTO + atrazine*	**9**	7[c]	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**	8	-	-	-	-	6
ULTIM + DISTINCT, ULTIM TOTAL[1]	-	7[c]	8	9	9	-	-	-	-	9	-	-	5	9	-	-	-	**8**	-	-	6
ULTIM + MARKSMAN	-	7[c]	8	9	9	6	-	-	-	-	-	-	5	9	-	-	-	7	-	-	6
ULTIM + PEAKPLUS[1]	-	7[c]	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	7	-	-	6

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[c] Les céréales spontanées sont proches de l'épiaison quand ces produits sont normalement appliqués; des traitements plus hâtifs donnent de meilleurs résultats.

Maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture)

Stade critique : le stade critique pour maîtriser les mauvaises dans le maïs est le stade 2–8 feuilles recourbées (3–10 pointes de feuille).

Appliquer tous les traitements dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac), sauf indication contraire.

Toute méthode unique de désherbage ou l'usage continuel du même produit chimique risque d'entrainer une augmentation des mauvaises herbes résistant à cette méthode ou à ce produit ou le tolérant. Le chénopode blanc et l'amarante résistant aux triazines posent désormais des problèmes à cause de la monoculture du maïs et de l'usage répété d'herbicides à base de triazines. La rotation avec d'autres cultures et/ou d'autres méthodes de désherbage réduisent les risques d'infestation.

Un hersage en plein à l'aide d'une herse légère opérant peu profondément, avant la levée du maïs, ou à l'aide d'une herse-bineuse (munie de dents flexibles en équerre), lorsque la culture atteint 5–10 cm de hauteur, permet aussi de lutter contre les plantules de mauvaises herbes annuelles. Un travail du sol rapide (10 km/h) et peu profond (2,5–3 cm) avec une houe rotative, quand le maïs a 7–8 cm de hauteur, détruit une partie des plantules de mauvaises herbes. Ces techniques ne réduisent pas l'action de l'herbicide et peuvent, certaines années, accroître l'efficacité du désherbage chimique. Le sarclage entre les rangs peut être un complément aux autres méthodes de désherbage. Il est plus efficace lorsque les mauvaises herbes sont petites. Le sarclage doit se faire en surface pour réduire :

- la germination de nouvelles graines de mauvaises herbes
- les pertes d'humidité
- les dommages aux racines du maïs

Un sarclage entre les rangs peut être nécessaire lorsque des mauvaises herbes ont échappé au traitement herbicide. Les mauvaises herbes devraient être considérées « échappées » quand elles ont 5–7 cm de hauteur.

L'application de l'herbicide en bande réduit le coût dans une proportion allant de la moitié aux deux tiers, selon l'espace entre les rangs et la largeur de la bande. Un sarclage superficiel entre les rangs est alors nécessaire.

Le sarclage tue une partie des mauvaises herbes vivaces établies, mais en favorise aussi la propagation aux zones non encore infestées. Veiller à la propreté des machines qui vont d'un champ à l'autre. De nombreuses vivaces (par ex. le souchet) peuvent être propagées par les instruments aratoires. Les entrepreneurs de travaux agricoles doivent prendre toutes leurs précautions avant de passer d'une ferme à l'autre.

Recommandations visant le maïs de semence

Bien que certaines des recommandations visant le maïs de grande culture puissent s'appliquer au maïs de semence, il existe des cultivars qui sont sensibles à certains produits chimiques. Vérifier auprès du semencier avec qui l'on travaille avant d'utiliser un herbicide. Pour toute information sur des mauvaises herbes en particulier, voir le tableau 9–1, *Évaluation des herbicides pour le maïs ordinaire (sucré, de semence et de grande culture)*, p. 119, puis revenir à la section appropriée pour les détails sur les traitements.

Les solutions azotées peuvent remplacer l'eau dans certaines bouillies herbicides appliquées en présemis ou en prélevée. Cette méthode n'augmente pas l'efficacité des produits. Traiter avant la levée de la culture. Consulter l'étiquette pour connaitre les méthodes d'application appropriées ainsi que les surfactants à ajouter. Bien régler le pulvérisateur pour fournir la quantité d'azote requise. Utiliser des buses en acier inoxydable ayant la taille appropriée (exemple : Teejet TK SS 5 ou TK SS 10). L'azote est légèrement corrosif, surtout pour le laiton. Il faut donc nettoyer le pulvérisateur immédiatement après usage. On peut utiliser le produit UNITE pour améliorer la compatibilité entre l'engrais liquide et l'herbicide sous forme liquide ou de poudre mouillable, et la stabilité des mélanges, lorsqu'on applique ces produits ensemble. Comme les préparations et les doses varient, il est indispensable de bien lire l'étiquette pour déterminer la quantité exacte et la méthode à employer.

Ne pas appliquer de solution azotée avec des herbicides de postlevée.

Notes spéciales sur le maïs sucré et le maïs de grande culture

PRÉCAUTIONS : NE PAS utiliser 2,4-D, MCPA, MCPB, 2,4-DB ni le dicamba moins de deux semaines avant l'apparition des panicules et des soies. Faire preuve d'une extrême prudence au moment d'appliquer ces herbicides près d'une culture sensible qui pourrait souffrir d'une éventuelle dérive du brouillard. Le soya, la tomate et le tabac sont extrêmement sensibles au dicamba. Les signes de dommages peuvent persister durant plusieurs semaines. Ne pas utiliser le dicamba près de cultures sensibles lorsque la température dépasse 25 °C le jour du traitement ou qu'un degré d'humidité élevé est prévu, à cause du risque de volatilisation du dicamba et par conséquent, de dommages aux cultures avoisinantes. Laisser plusieurs rangs de maïs non traités aux abords de champs de soya ou d'une autre culture sensible à ces produits.

Résidus d'atrazine et de simazine dans le sol

Les résidus d'atrazine et de simazine peuvent persister dans le sol pendant plus d'un an, surtout si l'on utilise les doses supérieures plus d'une fois et lorsque le temps est sec. Quand l'atrazine ou la simazine est utilisée année après année dans un champ portant continuellement du maïs, les résidus de triazines peuvent être plus élevés. Dans des champs où le maïs a été traité

avec de l'atrazine à raison de 1,2–1,5 kg de matière active/ha, on n'a pas en général constaté de dommages sur l'avoine, l'orge, les céréales mélangées ni le soya succédant au maïs excepté les années où la pluie, peu abondante l'automne précédent, a eu pour effet de ralentir la dégradation de l'atrazine dans le sol. Les traitements de postlevée peuvent persister plus longtemps que les traitements de prélevée. La dose de 1,2–1,5 kg d'atrazine/ha peut connaître quelques variations selon les différentes régions de la province.

On a signalé des dommages sur les tomates, haricots blancs, concombres et plantules de cultures fourragères, ainsi que sur les oignons, navets, tabac et pois, dans des champs ayant porté, l'année d'avant, du maïs traité avec une dose d'atrazine dépassant 1,1 kg de matière active/ha.

Pour réduire le risque de résidus d'atrazine sur les cultures suivant le maïs :

- Appliquer l'atrazine, sous forme huile et eau, peu après la levée, à raison de seulement 1,1 kg de matière active/ha. À cette faible concentration, le désherbage risque de ne pas être suffisant et il peut être nécessaire de sarcler.

- Savoir qu'un labour d'automne réduit davantage la toxicité des TRIAZINES qu'un labour de printemps.

- Le labour à la charrue à socs incorpore les résidus d'herbicide plus profondément que ne le fait un labour au chisel, ce qui réduit la concentration d'herbicide dans la couche superficielle du sol.

- S'assurer que le pulvérisateur utilisé est adapté à la tâche, qu'il est réglé et ajusté convenablement. Pulvériser uniformément sans chevauchement et couper l'alimentation de la rampe dès que la machine cesse d'avancer.

Moments des traitements herbicides

- **Présemis (PP) –** Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

- **Incorporation en présemis (IPS) –** Sauf indication contraire, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

- **Prélevée (PRÉ) –** De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas.

- **Postlevée (POST) –** Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques anti-dérive appropriées.

Stades de croissance foliaire du maïs

Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air de compter les feuilles sur un plant de maïs. Toujours vérifier, notamment sur l'étiquette, à quelle méthode de décompte on renvoie, car il en existe plusieurs.

Dans la présente publication, les feuilles sont comptées suivant la *méthode de la feuille recourbée* (voir la figure 9–1, *Stades de croissance foliaire du maïs (méthode de la feuille recourbée)*, p. 130. Cette méthode consiste à compter les feuilles qui sont sorties du cornet et la pointe de la feuille qui commence à se recourber, soit, normalement, lorsque la feuille est à 50 % déployée. C'est la méthode utilisée par la plupart des fabricants, mais il faut toujours s'en assurer en consultant l'étiquette ou le représentant. Pour une comparaison des différentes méthodes, voir le tableau 9–3, *Comparaison des méthodes d'évaluation du stade de croissance*, p. 130.

Une difficulté dans le décompte des feuilles vient aussi de l'incertitude quant à la feuille à considérer comme la première feuille. Dans la présente publication, la première feuille est la feuille du bas du plant. Cette première feuille est plus petite que les autres et sa pointe est arrondie. À mesure que la plante grandit, les premières feuilles finissent par mourir et tomber. Ainsi, un plant de 10 feuilles peut avoir perdu 1–3 feuilles, sans qu'il y paraisse à première vue. Il faut donc se montrer vigilant.

Commencer à compter les feuilles par le bas et voir si la pointe de la première est arrondie.

Il faut environ 75–80 unités thermiques pour produire chaque feuille de maïs. À des températures de 30 °C le jour et de 20 °C la nuit, une nouvelle feuille apparaît tous les 2–3 jours; à 20 °C le jour et 10 °C la nuit, il faut compter 5–6 jours pour chaque nouvelle feuille.

FIGURE 9–1. Stades de croissance foliaire du maïs (méthode de la feuille recourbée)



Le stade critique pour combattre les mauvaises herbes dans le maïs est le stade 3–8 feuilles (méthode de la feuille recourbée).

Certaines étiquettes identifient aussi le stade de croissance par la hauteur du plant. En général, ce critère est plus variable. La génétique et les conditions météorologiques peuvent en effet entrainer des variations en plus ou en moins, par rapport aux hauteurs indiquées dans le tableau qui suit. La hauteur apparente correspond à la hauteur mesurée à partir de la surface du sol jusqu'au sommet de la plante, telle quelle, et la hauteur réelle, à la hauteur une fois le plant redressé à sa pleine hauteur.

TABLEAU 9–3. Comparaison des méthodes d'évaluation du stade de croissance

Feuille recourbée[1]	Collerette	Pointe de la feuille[2]	Hauteur apparente (cm)	Hauteur réelle (cm)
2	1	3	5–6	5–11
4	3	5–6	9–17	16–25
6	4–5	7–8	18–33	29–46
8	5–6	9–10	36–54	54–77
10	8	12	58–85	86–112
12	10	14–15	99–114	121–149

[1] Nombre de feuilles sorties du cornet, y compris la pointe de la feuille qui commence à se recourber
[2] Nombre de feuilles, y compris la pointe d'une feuille qui sort du cornet.

Importance de la maîtrise des mauvaises herbes au départ de la culture

(Source : Eric Page, Clarence Swanton, Département de Phytotechnie, Université de Guelph, 2009 [traduction libre])

La concurrence exercée par les mauvaises herbes demeure un facteur important qui limite la production agricole en Ontario, dans l'ensemble du pays et partout dans le monde. Depuis vingt ans, des chercheurs du laboratoire de malherbologie de l'Université de Guelph s'emploient à déterminer quand et comment la concurrence livrée par les mauvaises herbes réduit les rendements du maïs (*Zea mays* L.) en Ontario. Leurs études ont permis de dégager une période critique d'absence de mauvaises herbes dans le maïs et de montrer que déjà, 20 jours après les semis, soit au stade 3 feuilles du maïs (figure 9–1), la concurrence exercée par les mauvaises herbes peut avoir nui au rendement en grains. Plus important encore, ces études ont aussi montré qu'il n'est jamais possible de compenser les pertes de rendement découlant d'une concurrence exercée par les mauvaises herbes en début de saison et ce, même si les mauvaises herbes sont détruites promptement.

En Ontario, les pertes de rendement du maïs attribuables à la concurrence des mauvaises herbes peuvent atteindre 0,3–2,2 % par jour (passé le stade 3 feuilles; voir la figure 9–2). Le moment et l'ampleur de ces pertes de rendement varient d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre, ce qui complique considérablement la mise en place des mesures de lutte. Cette variabilité est en grande partie attribuable à deux facteurs clés : 1) le moment de la levée des mauvaises herbes par rapport à celui de la culture; et 2) la densité de peuplement des mauvaises herbes. L'importance relative de ces facteurs dans la détermination des pertes de rendement a fait l'objet de plusieurs études, dont l'une par Bonic and Swanton (1997) qui portait sur la concurrence exercée sur le maïs par l'échinochloa pied-de-coq (*Echinochloa crusgali* [L] P. Beav.). Fait intéressant à noter, il ressort de cette étude que la densité de peuplement des mauvaises herbes influence beaucoup moins les pertes de rendement que le moment de la levée des mauvaises herbes (figure 9–3). Ainsi, la levée de 60 plantules d'échinochloa pied-de-coq au stade 1 feuille du maïs a entraîné une baisse de rendement de 12 %, tandis que la levée du même nombre de plantules au stade 4 feuilles a entraîné une perte de rendement de seulement 3 %. Il ressort clairement de cette étude que les mauvaises herbes qui lèvent à peu près en même temps que la culture sont celles qui risquent le plus de nuire au rendement et devraient par conséquent être les plus ciblées par les programmes de lutte contre les mauvaises herbes.

Notre étude la plus récente a porté sur les raisons pouvant expliquer que le moment de la levée des mauvaises herbes ait une si grande incidence sur les pertes de rendement dans le maïs. En nous basant sur la période critique d'absence de mauvaises herbes et les conclusions de l'étude menée par Bosnic et Swanton (1997) (figure 9–3), nous savons que les mauvaises herbes qui lèvent plus tardivement ont souvent beaucoup moins de répercussions sur le potentiel de rendement du maïs. De plus, de bonnes pratiques agronomiques (p. ex. préparation du lit de semence, fertilisation, profondeur de semis, etc.) devraient garantir que les plantules de maïs aient accès à des ressources abondantes au départ de la culture. Comment expliquer alors qu'en présence de ressources abondantes, la coexistence des mauvaises herbes et de la culture puisse abaisser les rendements en grains?

Il est possible que la concurrence qui s'exerce entre la culture et les mauvaises herbes commence avant même que les ressources ne deviennent limitées. En fait, il est bien établi que les végétaux perçoivent la présence à proximité de plantes concurrentes et qu'elles y réagissent avant même que ces dernières ne projettent de l'ombre. Cette réaction d'évitement de l'ombre repose sur des signaux lumineux réfléchis par les feuilles des plantes voisines et sert de système d'alerte rapide d'une concurrence imminente. L'évitement de l'ombre amène les plantes à pousser plus haut et à investir davantage de ressources dans l'élongation des tiges au détriment de l'expansion du système racinaire. Cette réaffectation temporaire des ressources peut permettre aux végétaux de pousser plus haut que leurs concurrents et de s'approprier ainsi plus de lumière. Dans les écosystèmes naturels, l'évitement de l'ombre procure un avantage concurrentiel et augmente les chances de survie par la reproduction. Dans les systèmes agricoles, par contre, l'évitement de l'ombre peut réduire le potentiel de

FIGURE 9–2. Effet de la concurrence exercée par les mauvaises herbes sur le potentiel de rendement du maïs

Les points de données de part et d'autre de la courbe représentent le potentiel de rendement de la culture quand les mauvaises herbes étaient maîtrisées au nombre de jours après les semis correspondant. Adaptation d'un graphique de Hall, Swanton et Anderson (1992).



FIGURE 9–3. Effet respectif de la densité et du moment de la levée des mauvaises herbes sur le potentiel de rendement du maïs

Adaptation d'un graphique de Bosnic et Swanton (1997).



FIGURE 9–4. Nombre de grains par épi dans les peuplements de maïs croissant dans des conditions simulant la présence et l'absence de mauvaises herbes respectivement (E. Page, données inédites)

Les lignes pointillées indiquent le nombre moyen de grains par épi dans chacun des peuplements.



rendement des cultures en amenant une plus grande variabilité dans la hauteur des plants qui composent le peuplement.

L'uniformité du peuplement est depuis longtemps considérée comme un élément clé de l'optimisation du potentiel de rendement. Dans le maïs, le potentiel de rendement est étroitement associé au nombre de grains par plant. Par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que les pertes de rendement attribuables à la concurrence livrée par les mauvaises herbes en début de saison soient également causés par une réduction du nombre de grains par plant. Dans le cadre d'une expérience récente, nous nous sommes demandés si la réaction d'évitement de l'ombre provoquée par la présence de mauvaises herbes, en l'absence de toute concurrence directe pour les ressources, pouvait expliquer les pertes de rendement associées à la concurrence exercée par les mauvaises herbes en début de saison. Effectivement, dans cette étude, la réaction d'évitement de l'ombre à elle seule a amené une réduction du nombre de grains par plant de 7 % et, ce qui est peut-être plus important encore, a doublé la variabilité d'un plant à l'autre dans le nombre de grains par plant (figure 9–4).

Nous estimons que la concurrence exercée par les mauvaises herbes en début de saison amène des pertes de rendement dans le maïs en augmentant la variabilité d'un plant à l'autre dans le nombre de grains par plant. Cet effet persiste même après l'élimination des mauvaises herbes et est rarement apparent, puisque la taille moyenne des plants de maïs reste la même dans l'ensemble du peuplement. Sous des conditions de croissance favorables, de légères réductions du nombre de grains par plant peuvent être compensées par des augmentations du poids du grain, de sorte que les pertes de rendement sont alors minimales. Toutefois, si la culture est par la suite soumise à des facteurs de stress (p. ex. concurrence directe pour des ressources, sécheresse ou autre), les pertes de rendement peuvent refléter les effets cumulatifs déclenchés par l'évitement de l'ombre et les facteurs de stress subséquent. Nous suggérons que c'est pour cette raison que les mauvaises herbes qui lèvent en même temps que la culture exercent sur celles-ci une concurrence plus forte que celles qui lèvent par la suite. De plus, les interactions entre la réaction d'évitement de l'ombre, la concurrence directe et les facteurs de stress environnementaux peuvent expliquer la variabilité dans les pertes de rendement observées d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
MAÏS ORDINAIRE (SUCRÉ, DE SEMENCE ET DE GRANDE CULTURE)			
Désherbants chimiques de présemis et rémanents			
• Des herbicides non sélectifs tels que le glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide rémanent avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. • Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE applicables en présemis. • Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel qu'atrazine, CONVERGE PRO, PRIMEXTRA II MAGNUM) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires (en prélevée seulement)			
PRINCEP NINE-T (90 WG)	1,5–2,5 kg/ha	0,6–1 kg/ac	• Ces produits sont présentés séparément parce que leur fourchette de dose diffère très nettement. Dans l'un ou l'autre cas cependant, appliquer les doses inférieures sur les sols sableux et les doses supérieures sur les sols limoneux et les sols argileux. • Ce traitement maîtrise normalement toutes les mauvaises herbes annuelles pendant toute la saison, sauf la digitaire ou le panic d'automne dans les zones très infestées. • Mise en garde : le sol risque de receler un niveau élevé de résidus après utilisation de doses supérieures à 2,0 kg/ha (0,8 kg/ac).
simazine	*1,35–2,25 kg/ha*		
ou SIMADEX (500 g/L)	3,2–8 L/ha	1,28–3,2 L/ac	
ou SIMAZINE 480 (480 g/L)	3,4–8,3 L/ha	1,36–3,32 L/ac	
simazine	*1,6–4 kg/ha*		
Mélanges en cuve d'herbicides radiculaires (en prélevée seulement)			
DUAL II MAGNUM (915 g/L)	1,25 L/ha	0,5 L/ac	• Appliquer **UNIQUEMENT** sur le maïs sucré. • Faire **SEULEMENT** un traitement par saison. • Appliquer dans un minimum de 150 L d'eau/ha. • **NE PAS** récolter le maïs sucré dans les 50 jours qui suivent le traitement. • Appliquer à l'aide de matériel terrestre **UNIQUEMENT**.
plus LOROX L (480 g/L)	0,79–1,56 L/ha	0,32–0,63 L/ac	
plus atrazine (480 g/L)*	2,06–3,19 L/ha	0,83–1,28 L/ac	
s-métolachlore/benoxacor	*1,14 kg/ha*		
plus linuron	*0,38–0,75 kg/ha*		
plus atrazine	*0,99–1,53 kg/ha*		
PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L)	3–4 L/ha	1,2–1,6 L/ac	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** • Utiliser ce mélange sur des sols de texture légère dont la teneur en matière organique est supérieure à 1,0 %. • Le linuron maîtrise aussi les souches de chénopode blanc et d'amarante réfléchie résistant aux triazines. Le panic d'automne et l'abutilon risquent de ne pas être tenus en échec durant toute la saison.
plus LOROX L (480 g/L)	0,77–1,56 L/ha	0,31–0,63 L/ac	
s-métolachlore/benoxacor/ atrazine	*2,16–2,88 kg/ha*		
plus linuron	*0,37–0,75 kg/ha*		

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones radiculaires (en prélevée seulement)			
atrazine (480 g/L) *atrazine*	2,1–3,1 L/ha *1,01-1,49 kg/ha*	0,84–1,24 L/ac	· Les mauvaises herbes lèvent, mais meurent normalement au bout de quelques jours. L'atrazine peut persister plus ou moins longtemps : plus longuement en sols grossiers et par temps sec et frais. Voir les différents mélanges en cuve destinés à réduire les doses d'application, à éviter les résidus, et à traiter contre les graminées annuelles. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
atrazine (480 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *atrazine* *plus dicamba*	2,1–3,1 L/ha 1,25 L/ha *1,01-1,49 kg/ha* *0,6 kg/ha*	0,84–1,24 L/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Bonne maîtrise de l'abutilon et des dicotylédones résistant aux triazines. · Voir les notes sur les résidus d'atrazine, p. 128. · Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	1,25 L/ha *0,6 kg/ha*	0,5 L/ac	· Si la semence de maïs est enfouie moins profondément que 4 cm dans le sol, retarder le traitement au BANVEL II jusqu'au stade coléoptile du maïs. · Appliquer sur des sols de texture moyenne ou fine renfermant plus de 2,5 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** incorporer au sol.
CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) *mésotrione* *plus atrazine*	0,3 L/ha 2,1–3,1 L/ha *0,140 kg/ha* *1,0-1,49 kg/ha*	0,12 L/ac 0,85–1,25 L/ac	· Appliquer avant la levée du maïs de grande culture, du maïs de semence ou du maïs sucré.
MARKSMAN (393 g/L) **ou** PROPERO (393 g/L) *dicamba/atrazine*	3,7–4,5 L/ha *1,5-1,8 kg/ha*	1,5–1,8 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Voir les notes sur les résidus d'atrazine, p. 128. · Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées radiculaires et de début de postlevée			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	• Appliquer en PRÉ ou par IPS. • Appliquer en POST (jusqu'au stade 3 feuilles du maïs) sur le maïs de grande culture seulement. • Si le traitement est fait par IPS, régler le matériel d'incorporation pour qu'il travaille tout au plus à 10 cm de profondeur. • On obtient une meilleure maîtrise du souchet comestible lorsque DUAL II MAGNUM est appliqué par IPS. • Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. • Contre la morelle, on obtient de meilleurs résultats quand on applique DUAL II MAGNUM en PRÉ. • **NE PAS** utiliser sur les terres noires, dans les sols tourbeux ni les sols riches en matière organique. • Voir les mélanges en cuve efficaces contre les dicotylédones annuelles ou appliquer ensuite un anti-dicotylédones de postlevée. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide* **OU SI L'ON UTILISE :** FRONTIER (900 g/L) *diméthénamide*	756–963 mL/ha *544–693 g/ha* 1,1–1,4 L/ha *1–1,25 kg/ha*	302–385 mL/ac 0,44–0,56 L/ac	• Appliquer par IPS ou avant la levée du maïs de semence, sucré et de grande culture. • Appliquer en POST (jusqu'au stade 3 feuilles du maïs) sur le maïs de grande culture seulement. • Si le traitement est fait par IPS, régler le matériel d'incorporation pour qu'il travaille tout au plus à 10 cm de profondeur. • FRONTIER MAX assure une meilleure maîtrise du souchet comestible s'il est appliqué par IPS à la dose la plus forte. • Ce traitement est sans effet contre les mauvaises herbes sensibles ayant dépassé le stade 2 feuilles. • Utiliser des doses plus fortes sur les sols à texture fine ou les sols riches en matière organique ou pour combattre les morelles, le souchet et les amarantes. • **NE PAS** utiliser sur les terres noires, dans les sols tourbeux ni les sols riches en matière organique. • Voir les mélanges en cuve efficaces contre les dicotylédones annuelles ou appliquer ensuite un anti-dicotylédones de postlevée. • Sur le maïs de semence, la **dose maximale** de FRONTIER MAX est de 756 mL/ha (302 mL/ac). • Avant d'employer FRONTIER MAX, consulter le fournisseur de maïs de semence pour de l'information sur la tolérance des lignées autofécondées de maïs de semence.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de prélevée et de début de postlevée			
BATTALION[1] (ELIM EP (25 DF) + DUAL II MAGNUM (915 g/L) +BANVEL II (480 g/L) *rimsulfuron +* *s-métolachlore/benoxacor +* *dicamba*	 60 g/ha + 0,75 L/ha + 0,75 L/ha *15 g/ha +* *684 g/ha +* *360 g/ha*	 24 g /ac + 0,3 L/ac + 0,3 L/ac	• Appliquer en PRÉ. • Voir ci-dessus les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul. • **NE PAS** incorporer au sol. • BATTALION peut être appliqué avec du NAU 28 % comme support (**en PRÉ seulement**). • Pour détruire la partie aérienne du chiendent commun, appliquer BATTALION au stade 1–6 feuilles du chiendent. • **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • BATTALION est un emballage combiné qui renferme ELIM EP, DUAL II MAGNUM et BANVEL II.
BATTALION[1] ELIM EP (25 DF) + DUAL II MAGNUM (915 g/L) + BANVEL II (480 g/L) plus surfactant non ionique *rimsulfuron +* *s-métolachlore/benoxacor +* *dicamba* *plus surfactant non ionique*	 50 g/ha + 0,625 L/ha + 0,625 L/ha 2 L/1000 L *12,5 g/ha +* *573 g/ha +* *300 g/ha +* *0,2 % v/v*	 20 g/ac + 0,25 L/ac + 0,25 L/ac 2 L/1000 L	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • Appliquer en POST, du stade coléoptile au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. • Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul, p. 141. • Voir l'étiquette de chacun des produits pour connaître les précautions à prendre. • Pour détruire la partie aérienne du chiendent commun, appliquer BATTALION au stade 1–6 feuilles du chiendent. • BATTALION est un emballage combiné qui renferme ELIM EP, DUAL II MAGNUM et BANVEL II.
CONVERGE XT[1] CONVERGE FLEXX (240 g/L) + CONVERGE 480 (480 g/L) *isoxaflutole* *+ atrazine*	 330–440 mL/ha + 1,67–2,21 L/ha *79-105 g/ha +* *0,8-1,063 kg/ha*	 132–174 mL/ac + 0,67–0,88 L/ac	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** • Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. • **NE PAS** incorporer le produit dans le sol si l'on traite avant le semis. • Utiliser les doses supérieures pour combattre le panic d'automne et le panic millet. • CONVERGE XT est un emballage combiné de CONVERGE FLEXX et CONVERGE 480. • **NE PAS** utiliser CONVERGE XT sur les sols sableux, les loams sableux et/ou les sols renfermant moins de 2 % de matière organique. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L) *s-métolachlore/benoxacor/* *atrazine*	3–4 L/ha *2,16–2,88 kg/ha*	1,2–1,6 L/ac	• Appliquer par IPS, en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs. • Utiliser la dose supérieure là où les graminées annuelles sont envahissantes ou si une infestation par le souchet est manifeste. • Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. • On obtient la dose équivalente de PRIMEXTRA II MAGNUM en combinant DUAL II MAGNUM à raison de 0,5–0,7 L/ac et AATREX 480 à raison de 0,84–1,24 L/ac. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Mélanges en cuve d'anti-graminées et d'anti-dicotylédones radiculaires et de début de postlevée			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus dicamba*	1,25–1,75 L/ha 1,25 L/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser des doses plus fortes de DUAL II MAGNUM pour combattre les infestations graves de graminées ou le panic d'automne. Ce dernier peut ne pas être tenu en échec durant toute la saison. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus atrazine (480 g/L)* *s-métolachlore/benoxacor* *plus dicamba* *plus atrazine*	1,25–1,75 L/ha 1,25 L/ha 2,1–3,1 L/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,6 kg/ha* *1,01–1,49 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,5 L/ac 0,84–1,24 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser des doses plus fortes de DUAL II MAGNUM pour combattre les infestations graves de graminées ou le panic d'automne. Ce dernier peut ne pas être tenu en échec durant toute la saison. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus mésotrione* *plus atrazine*	1,25–1,75 L/ha 0,3 L/ha 2,1–3,1 L/ha *1,14–1,60 kg/ha* *0,140 kg/ha* *1,0–1,49 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,12 L/ac 0,85–1,25 L/ac	· Appliquer avant la levée du maïs de grande culture, du maïs de semence et du maïs sucré. · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture seulement. · Utiliser les doses supérieures dans les zones fortement infestées de graminées. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · **NE PAS** appliquer sur le maïs traité avec un insecticide organophosphoré.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus MARKSMAN (393 g/L) **ou** PROPERO (393 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus dicamba/atrazine*	1,25–1,75 L/ha 3,7–4,5 L/ha *1,14–1,6 kg/ha* *1,48–1,8 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 1,5–1,8 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser les doses supérieures dans les zones fortement infestées de graminées et contre le panic d'automne. Ce dernier peut ne pas être tenu en échec durant toute la saison. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul, p. 141. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.
CONVERGE FLEXX plus atrazine (480 g/L) *isoxaflutole* *plus atrazine*	330–440 mL/ha + 1,67–2,21 L/ha *79–105 g/ha* *+ 0,8–1,063 kg/ha*	132–174 mL/ac + 0,67–0,88 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · **NE PAS** incorporer le produit dans le sol si l'on traite avant le semis. · Utiliser les doses supérieures pour combattre le panic d'automne et le panic millet. · **NE PAS** utiliser CONVERGE FLEXX sur les sols sableux, les loams sableux et/ou les sols renfermant moins de 2 % de matière organique.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
FRONTIER MAX (720 g/L) plus atrazine (480 g/L)* *diméthénamide* *plus atrazine*	756–963 mL/ha 2,08–3,19 L/ha *544–693 g/ha* *1–1,53 kg/ha*	302–385 mL/ac 0,832–1,28 L/ac	· Appliquer en présemis, par IPS, en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs. · Utiliser la dose supérieure de FRONTIER MAX pour combattre de fortes infestations de mauvaises herbes. La maîtrise des mauvaises herbes résistantes aux triazines non encore levées se limitera à l'amarante. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. · Si l'on applique FRONTIER (900 g/L), utiliser la dose de 0,44–0,56 L/ac.
FRONTIER MAX (720 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) *diméthénamide* *plus dicamba*	756–963 mL/ha 1,25 L/ha *544–693 g/ha* *0,6 kg/ha*	302–385 mL/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence, le maïs à éclater ni le maïs sucré.** · Appliquer en présemis, en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser la dose supérieure de FRONTIER MAX pour combattre de fortes infestations de mauvaises herbes. Pour une meilleure destruction chimique, l'ajout de glyphosate peut être nécessaire. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul, p. 141. · Si l'on applique FRONTIER (900 g/L), utiliser la dose de 0,44–0,56 L/ac.
FRONTIER MAX (720 g/L) plus MARKSMAN (393 g/L) *diméthénamide* *plus dicamba/atrazine*	756–963 mL/ha 4,5 L/ha *544–693 g/ha* *1,8 kg/ha*	302–385 mL/ac 1,8 L/ac	· **NE PAS utiliser sur du maïs de semence ni sur du maïs sucré.** · Appliquer en présemis, en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser la dose supérieure de FRONTIER MAX pour combattre de fortes infestations de mauvaises herbes. Pour une meilleure destruction chimique, l'ajout de glyphosate peut être nécessaire. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141. · Si l'on applique FRONTIER (900 g/L), utiliser la dose de 0,44–0,56 L/ac.
PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L) plus CALLISTO (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor/atrazine* *plus mésotrione*	3–4 L/ha 0,3 L/ha *2,16–2,88 kg/ha* *0,140 kg/ha*	1,2–1,6 L/ac 0,12 L/ac	· Appliquer avant la levée du maïs de semence et du maïs sucré. · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser les doses supérieures dans les zones fortement infestées de graminées. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · **NE PAS** appliquer sur le maïs traité avec un insecticide organophosphoré.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor/atrazine* *plus dicamba*	3–4 L/ha 1,25 L/ha *2,16–2,88 kg/ha* *0,6 kg/ha*	1,2–1,6 L/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Utiliser les doses supérieures dans les zones fortement infestées de graminées et contre le panic d'automne. Ce dernier peut ne pas être tenu en échec durant toute la saison. · Ce traitement est sans effet contre les graminées ayant dépassé le stade 2 feuilles. · Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière (sable) qui renferment moins de 2 % de matière organique.
PROWL 400 (400 g/L) *pendiméthaline*	4,2 L/ha *1,68 kg/ha*	1,68 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Employé seul, PROWL est sans effet contre les mauvaises herbes levées. Il est recommandé de faire un mélange en cuve ou de suivre un programme de désherbage échelonné pour tuer un maximum de mauvaises herbes. Semer le maïs à au moins 4 cm de profondeur et faire en sorte que les graines soient bien recouvertes. PROWL peut être mélangé à l'eau ou à un engrais liquide, à raison de 200 L d'engrais liquide/ha (80 L/ac). Vérifier au moyen d'un test la compatibilité de l'engrais liquide avec l'une ou l'autre des combinaisons homologuées pour des mélanges en cuve avec PROWL. S'il ne pleut pas dans les 7 jours qui suivent, travailler le champ avec une houe rotative ou un cultivateur léger.
PROWL 400 (400 g/L) plus atrazine (480 g/L)* *pendiméthaline* *plus atrazine*	4,2 L/ha 3,19 L/ha *1,68 kg/ha* *1,53 kg/ha*	1,68 L/ac 1,28 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Voir ci-dessus les précautions relatives à PROWL employé seul.
PROWL 400 (400 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *pendiméthaline* *plus dicamba*	4,2 L/ha 1,25 L/ha *1,68 kg/ha* *0,6 kg/ha*	1,68 L/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Voir les précautions relatives à PROWL employé seul, au dessus, et à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141.
PROWL 400 (400 g/L) plus MARKSMAN (393 g/L) *pendiméthaline* *plus dicamba/atrazine*	4,2 L/ha 3,7–4,5 L/ha *1,68 kg/ha* *1,48–1,8 kg/ha*	1,68 L/ac 1,5–1,8 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en PRÉ ou en POST jusqu'au stade 3 feuilles du maïs de grande culture. · Voir les précautions relatives à PROWL employé seul, au dessus, et à BANVEL II ou à ORACLE employé seul, p. 141.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
ACCENT (75 DF) plus surfactant non ionique plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *nicosulfuron* *plus surfactant non ionique* *plus NAU*	33 g/ha 2 L/1000 L 5 L/ha *25 g/ha* *0,2 % v/v* *5 L/ha*	13 g/ac 2 L/1000 L 2 L/ac	· **NE PAS** ajouter de nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) quand ACCENT sert à traiter du maïs de semence ou du maïs sucré. · S'utilise sur tous les cultivars de maïs sucré. Comme ils n'ont pas tous été testés, communiquer avec l'entreprise ayant mis au point le cultivar pour plus d'information sur la tolérance d'un cultivar en particulier. · Ajouter du NAU pour mieux combattre la sétaire glauque dans le maïs de grande culture. · On peut remplacer le surfactant non ionique par le concentré d'huile ADAPT (1 % v/v), MERGE ou SURE-MIX (0,5 % v/v) (maïs de grande culture seulement). · Toujours ajouter les produits hydrosolubles à de l'eau claire tout en faisant fonctionner l'agitateur. Le maïs doit être entre les stades 1 feuille et 8 feuilles. Appliquer ACCENT lorsque les graminées annuelles sont au stade 1-6 feuilles et/ou que le chiendent commun est au stade 3-6 feuilles.
ULTIM ([1:1] 75 DF) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Toujours ajouter les produits hydrosolubles à de l'eau claire tout en faisant fonctionner l'agitateur. Le maïs soit être au stade 1-6 feuilles. Appliquer ULTIM lorsque les graminées annuelles sont au stade 1-6 feuilles et que le chiendent commun est au stade 3-6 feuilles. · Appliquer ULTIM **uniquement** quand la température de l'air au cours des 24 heures qui précèdent et qui suivent le traitement se situe dans la fourchette de 5 à 28 °C.
Anti-dicotylédones et mélanges en cuve d'anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L) *2,4-D**	0,6–1,2 L/ha *0,28–0,56 kg/ha*	0,24–0,48 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Faire un traitement de pleine surface avant que le maïs atteigne 15 cm (feuille déployée). Ensuite utiliser des pendillards. Utiliser le 2,4-D sous forme amine. · Voir les notes spéciales relatives à l'utilisation en POST du 2,4-D et autres herbicides hormonaux, p. 128. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
atrazine (480 g/L) plus huile *atrazine* *plus huile*	2,1–3,1 L/ha 10–17 L/ha *1,01-1,49 kg/ha* *10-17 L/ha*	0,84–1,24 L/ac 4–6,8 L/ac	· Pour accroître et prolonger l'effet de l'atrazine, appliquer dans une émulsion d'huile et d'eau à raison de 10–17 L d'huile minérale légère émulsifiable/ha (4–6,8 L/ac) et de 150–200 L d'eau/ha (60–80 L/ac). Appliquer lorsque la plupart des mauvaises herbes ont levé. On peut utiliser la dose inférieure si on passe un sarcleur par la suite.
atrazine (480 g/L) plus BUCTRIL M ([1:1] 560 g/L) **ou** BADGE ([1:1] 450 g/L) **ou** LOGIC M ([1:1] 450 g/L) **ou** MEXTROL ([1:1] 450 g/L) *atrazine* *plus bromoxynil/ MCPA*	2,29–3,1 L/ha 1 L/ha 1,25 L/ha *1,1-1,49 kg/ha* *0,56 kg/ha*	0,96–1,24 L/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer au stade 4-6 feuilles du maïs; des dommages sont à craindre passé le stade 6 feuilles. · Maîtrise un spectre plus large de dicotylédones que le bromoxynil/MCPA employé seul; les plants d'abutilon plus avancés seront maîtrisés. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant. · **NE PAS** utiliser de préparations atrazine-huile dans ce mélange en cuve.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
atrazine (480 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *atrazine* *plus dicamba*	2,1–3,1 L/ha 0,6 L/ha *1,01–1,49 kg/ha* *0,288 kg/ha*	0,84–1,24 L/ac 0,24 L/ac	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • Ce traitement procure une maîtrise de bonne à excellente des dicotylédones, y compris celles qui sont résistantes aux triazines et l'abutilon. Utiliser la dose supérieure pour une action rémanente. • Voir les notes spéciales sur le maïs relatives aux applications de dicamba, p. 128, et les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE employé seul en POST, p. 141.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	0,6–1,25 L/ha *0,288–0,6 kg/ha*	0,24–0,5 L/ac	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • On peut appliquer la dose inférieure jusqu'à ce que le maïs atteigne 20 cm de hauteur. Au delà et jusqu'à 50 cm, utiliser des pendillards. La dose de 0,6 kg/ha généralement utilisée pour le traitement de fond est particulièrement efficace contre l'abutilon et tient longtemps en échec les autres dicotylédones annuelles à germination tardive et à racines profondes. Elle peut être appliquée du stade coléoptile au stade 5 feuilles (maïs haut de 13 cm). • Voir les notes spéciales sur l'utilisation en POST du dicamba et des herbicides hormonaux, p. 128. • **NE PAS** utiliser le dicamba si la température dépasse 25 °C ou si on prévoit un taux d'humidité élevé dans les jours qui suivent à cause de la volatilité de ce produit qui pourrait endommager les cultures sensibles à proximité. • **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)* *dicamba* *plus 2,4-D*	0,29 L/ha 0,85 L/ha *0,14 kg/ha* *0,4 kg/ha*	0,12 L/ac 0,34 L/ac	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • On peut traiter jusqu'à ce que le maïs atteigne 10 cm de hauteur. Utiliser des pendillards lorsque le maïs a de 10–50 cm de hauteur. Utiliser le 2,4-D sous forme amine. • Voir les notes spéciales sur l'utilisation en POST du dicamba, du 2,4-D et autres produits hormonaux du même type, p. 128. • **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac	• Deux traitements à raison de 1,75 L/ha (0,7 L/ac) (0,84 kg de matière active/ha) effectués à 10 jours d'intervalle arrêtent la croissance de la partie aérienne du souchet et du chardon des champs et parfois celle du liseron des champs. • Un temps froid ou sec peut retarder l'action de l'herbicide.
BUCTRIL M ([1:1] 560 g/L) **ou** BADGE ([1:1] 450 g/L) **ou** LOGIC M ([1:1] 450 g/L) **ou** MEXTROL ([1:1] 450 g/L) *bromoxynil/MCPA*	1 L/ha 1,25 L/ha *0,558 kg/ha*	0,4 L/ha 0,5 L/ha	• **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. • Appliquer au stade 4–6 feuilles du maïs; des dommages sont à craindre passé le stade 6 feuilles. • Maîtrise la plupart des dicotylédones annuelles jusqu'au stade 4 feuilles (8 feuilles pour le chénopode blanc et les moutardes, sisymbres et vélars). • Utiliser de préférence à PARDNER ou à KORIL lorsque la moutarde des champs pose problème.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) plus surfactant non ionique *mésotrione* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	0,21 L/ha 0,58 L/ha 2 L/1000 L *0,1 kg/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	0,085 L/ac 0,235 L/ac 2 L/1000 L	· Appliquer au stade 3–8 feuilles du maïs de grande culture. · Appliquer au stade 3–6 feuilles du maïs de semence ou du maïs sucré. · **NE PAS** appliquer sur le maïs sucré Delmonte 2038. · **NE PAS** récolter le maïs sucré dans les 50 jours qui suivent le traitement. · Les lignées autofécondées de maïs de semence et les cultivars de maïs sucré n'ont pas tous la même tolérance à CALLISTO; consulter le fournisseur de semences pour plus d'information. · Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha. · **NE PAS** appliquer sur le maïs traité avec un insecticide organophosphoré.
DISTINCT (70 WG) plus surfactant non ionique plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *diflufenzopyr/dicamba* *plus surfactant non ionique* *plus NAU*	0,285 kg/ha 2,5 L/1000 L 12,5 L/1000 L *0,2 kg/ha* *0,25 % v/v* *1,25 % v/v*	0,115 kg/ac 2,5 L/1000 L 12,5 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active quand le maïs est au stade 2–6 feuilles. · Traiter quand on prévoit des températures supérieures à 4 °C pendant les 24 heures qui précèdent et qui suivent le traitement.
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	1,75–2,25 L/ha *1,1–1,5 kg/ha*	0,7–0,9 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Voir les notes spéciales relatives à l'utilisation en POST du 2,4-DB et autres herbicides hormonaux, p. 128. · **Nota :** La dose maximale d'EMBUTOX 625 indiquée sur l'étiquette est de 2,25 L de produit/ha (0,9 L/ac). · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
IMPACT (336 g/L) plus atrazine (480g/L)* plus MERGE plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *topramézone* *plus atrazine* *plus adjuvant* *plus NAU*	0,037 L/ha 1,04 L/ha 5 L/1000 L 12,5 L/1000 L *12,5 g/ha* *0,5 kg/ha* *0,5 % v/v* *1,25 % v/v*	15 mL/ac 0,42 L/ac 5 L/1000 L 12,5 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes déjà levées, jusqu'au stade 4 feuilles des graminées et jusqu'au stade 8 feuilles des dicotylédones. · Appliquer entre le stade coléoptile et le stade 7 feuilles du maïs de semence, sucré et de grande culture. · Dans le cas **du maïs de semence et du maïs sucré**, employer ASSIST plutôt que MERGE à la dose de 12,5 L/1000 L. L'utilisation de MERGE augmenterait les risques de dommages au maïs de semence et au maïs sucré.
LADDOK ([1:1] 400 g/L) plus ASSIST *bentazone/atrazine* *plus concentré d'huile*	2–4 L/ha 2 L/ha *0,8–1,6 kg/ha* *2 L/ha*	0,8–1,6 L/ac 0,8 L/ac	· La dose recommandée de LADDOK est de 1,2–1,6 kg/ha (3–4 L/ha [1,2–1,6 L/ac]). · Cette dose peut être réduite à 0,8–1 kg/ha (2–2,5 L/ha [0,8–1 L/ac]) si FRONTIER ou DUAL II MAGNUM a été appliqué à la dose recommandée pour détruire les graminées en prélevée. Utiliser le LADDOK à raison de 3–4 L/ha (1,2–1,6 L/ac) contre le souchet; répéter le traitement après 7–10 jours si nécessaire.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
MARKSMAN (393 g/L) **ou** PROPERO (393 g/L) *dicamba/atrazine*	3,7–4,5 L/ha *1,48–1,8 kg/ha*	1,5–1,8 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · On peut traiter le maïs jusqu'à ce qu'il atteigne 13 cm de hauteur (5 feuilles). Utiliser la dose inférieure sur des sols de texture grossière et la dose supérieure sur des sols de texture moyenne à fine. · Voir les notes spéciales sur l'utilisation en POST du dicamba et des herbicides hormonaux.
MCPA AMINE (500 g/L)* *MCPA*	0,76–1,26 L/ha *0,38–0,63 kg/ha*	0,3–0,5 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Traiter le maïs avant qu'il atteigne 15 cm de hauteur (feuille déployée). · Utiliser la dose inférieure contre les mauvaises herbes jeunes, en croissance active et la dose supérieure contre les mauvaises herbes développées et lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. · Un traitement à raison de 1 L/ha (0,4 L/ac) arrête la croissance de la partie aérienne de la prêle des champs totalement développée (15–25 cm).
PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) *bromoxynil*	1–1,2 L/ha 1,2–1,4 L/ha *0,28–0,34 kg/ha*	0,4–0,48 L/ac 0,48–0,56 L/ac	· Élimine la plupart des dicotylédones annuelles, y compris les espèces résistantes aux triazines au stade 1–4 feuilles. · PARDNER et KORIL sont des herbicides de contact non volatils. · **NE PAS utiliser BROTEX sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**.
PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) *bromoxynil* *plus dicamba*	1 L/ha 1,2 L/ha 0,3 L/ha *0,28 kg/ha* *0,144 kg/ha*	0,4 L/ac 0,48 L/ac 0,12 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Faire le traitement de pleine surface quand le maïs a entre 4 et 6 feuilles, puis utiliser des pendillards jusqu'à ce que le maïs ait 50 cm de haut. · Maîtrise la plupart des dicotylédones annuelles, dont : les souches de chénopode blanc, d'amarante et d'herbe à poux résistant aux triazines, jusqu'au stade 6 feuilles. · Voir les notes spéciales sur l'utilisation en POST du dicamba et les précautions relatives à BANVEL II employé seul en POST, p. 141.
PEAKPLUS[1] PEAK (75 WG) + BANVEL II (480 g/L) plus surfactant non ionique *prosulfuron + dicamba* *plus surfactant non ionique*	 13,3 g/ha + 0,3 L/ha 2 L/1000 L *10 g/ha + 0,14 kg/ha* *0,2 % v/v*	 5,3 g/ac + 0,12 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs sucré**. · Appliquer entre les stades 2 et 7 feuilles du maïs. · Maîtrise la plupart des dicotylédones annuelles, dont : les souches de chénopode blanc et d'amarante résistant aux triazines, jusqu'au stade 6 feuilles; la lampourde glouteron et l'abutilon, jusqu'au stade 6 feuilles; et l'herbe à poux jusqu'au stade 8 feuilles. · **NE PAS** appliquer sur le maïs qui a été traité avec un insecticide organophosphoré. · PEAKPLUS est un emballage combiné de PEAK 75WG et de BANVEL II.
SHOTGUN (390 g/L) *atrazine/2,4-D*	2,4–3,59 L/ha *0,936–1,404 kg/ha*	0,96–1,44 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Faire un traitement de pleine surface entre le stade coléoptile et le stade 4 feuilles du maïs. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA (15:1)*	2,75–4,25 L/ha *1,1-1,7 kg/ha*	1,1–1,7 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer quand le maïs mesure entre 30 et 60 cm de hauteur, à l'aide de pendillards. On peut détruire en partie la prêle des champs en utilisant les doses supérieures de MCPB/MCPA. · Voir les notes spéciales sur l'utilisation en POST de MCPB/MCPA et des herbicides hormonaux, p. 128. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
Mélanges en cuve d'anti-graminées et d'anti-dicotylédones de postlevée			
ACCENT (75 DF) plus BANVEL II (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron* *plus dicamba* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 0,6 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,288 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,24 L/ac 2 L/1000 L	· Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à BANVEL II ou à ORACLE, p. 141. · **NE PAS** appliquer sur le maïs passé le stade 6 feuilles.
ACCENT (75 DF) plus CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron* *plus mésotrione* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 0,21 L/ha 0,58 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,1 kg/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,085 L/ac 0,235 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer au stade 3–8 feuilles du maïs. · Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha. · Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à CALLISTO plus atrazine, p. 142.
ACCENT TOTAL[1] ACCENT (75 DF) + DISTINCT (70 WG) plus surfactant non ionique plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *nicosulfuron +* *diflufenzopyr/dicamba* *plus surfactant non ionique* *plus NAU*	 33 g/ha + 0,285 kg/ha 2,5 L/1000 L 5 L/ha *25 g/ha +* *0,2 kg/ha* *0,2 % v/v* *5 L/ha*	 13 g/ac 0,115 kg/ac 2,5 L/1000 L 2 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer sur les plantules de dicotylédones en croissance active (moins de 5 cm de hauteur). · Appliquer quand les graminées annuelles sont entre les stades 1 et 6 feuilles et le chiendent commun entre les stades 3 et 6 feuilles (10 à 20 cm). · Appliquer entre les stades 2 et 8 feuilles du maïs. · ACCENT TOTAL est un emballage combiné d'ACCENT et de DISTINCT. · Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à DISTINCT, p. 142.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ACCENT (75 DF) plus MARKSMAN (393 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron plus* *dicamba/atrazine* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 2,5 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *1 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 1 L/ac 2 L/1000 L	· Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à MARKSMAN, p. 143. · **NE PAS** appliquer sur le maïs passé le stade 6 feuilles.
ACCENT (75 DF) plus PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron* *plus bromoxynil* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 1 L/ha 1,2 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac 2 L/1000 L	· Utiliser uniquement lorsque le maïs est au stade 4-8 feuilles. · Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à PARDNER, p. 143.
ACCENT 1-PASS[1] ACCENT (75 DF) + PEAKPLUS[1] (PEAK [75 WG] + BANVEL II [480 g/L]) plus surfactant non ionique *nicosulfuron +* *prosulfuron + dicamba* *plus surfactant non ionique*	 33 g/ha + 13,3 g/ha + 0,3 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha +* *10 g/ha + 0,14 kg/ha* *0,2 % v/v*	 13,3 g/ac + 5,3 g/ac + 0,12 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer entre les stades 2 et 7 feuilles du maïs. · **NE PAS** appliquer sur le maïs qui a été traité avec un insecticide organophosphoré. · ACCENT 1-PASS est un emballage combiné d'ACCENT et de PEAKPLUS. · Pour maîtriser la morelle noire de l'Est du stade cotylédon au stade 6 feuilles, ajouter de l'atrazine (480 g/L) à raison de 1,04 L/ha (0,42 L/ac).
ACCENT (75 DF) plus SHOTGUN (390 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron plus* *atrazine/2,4-D* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 2,4–3,6 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,94–1,4 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,96–1,44 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Faire un traitement de pleine surface au stade 1–4 feuilles du maïs ou au stade 1–6 feuilles des graminées. · Voir les précautions relatives à ACCENT, p. 140, et à SHOTGUN, p. 143.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
IMPACT (336 g/L) plus FRONTIER MAX (720 g/L) plus atrazine (480 g/L)* plus MERGE plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *topramézone* *plus diméthénamide* *plus atrazine*	37 mL/ha 756 mL/ha 1,04 L/ha 5 L/1000 L 12,5 L/1000 L *0,0125 kg/ha* *1,0 kg/ha* *0,5 kg/ha*	15 mL/ac 302 mL/ac 0,42 L/ac 5 L/1000 L 12,5 L/1000 L	· **NE PAS utiliser sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer en POST jusqu'au stade 4 feuilles des graminées et jusqu'au stade 8 feuilles des dicotylédones. · Faire le traitement entre le stade coléoptile et le stade 3 feuilles du maïs. · Ajouter du FRONTIER MAX pour une action rémanente contre les graminées. · Si l'on applique FRONTIER (900 g/L), utiliser la dose de 0,45 L/ac.
OPTION 1.2.3. OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) + DEFINE DF (60 %) plus atrazine (480 g/L)* plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *+ flufénacet* *+ atrazine* *plus NAU*	 0,67 L/ha 750 g/ha 1,75 L/ha 2,5 L/ha *15 g/ha* *450 g/ha* *840 g/ha* *2,5 L/ha*	 0,27 L/ac 304 g/ac 0,71 L/ac 1,0 L/ac	· Appliquer au stade 1–3 feuilles du maïs. · Ajouter obligatoirement de l'atrazine et du NAU (28 %) dans le mélange en cuve; ces produits doivent être achetés séparément. · Traitement inefficace contre le chénopode blanc résistant aux triazines non encore levé.
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus AATREX 480 (480 g/L) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus atrazine* *plus NAU*	1,56 L/ha 1,75–2,33 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *0,84–1,12 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 0,7–0,93 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles du maïs.
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus dicamba* *plus NAU*	1,56 L/ha 0,3 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *0,144 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 0,12 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles du maïs.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus mésotrione* *plus atrazine* *plus NAU*	1,56 L/ha 0,21 L/ha 0,58 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *0,1 kg/ha* *0,28 L/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 0,085 L/ac 0,235 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles du maïs. · Appliquer dans 175 L d'eau/ha (70 L/ac).
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus DISTINCT (70 WG) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus diflufenzopyr/dicamba* *plus NAU*	1,56 L/ha 0,285 kg/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *0,2 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 0,115 kg/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 6 feuilles du maïs.
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) MARKSMAN (393 g/L) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus dicamba/atrazine* *plus NAU*	1,56 L/ha 2,5 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *1 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 1 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer jusqu'au stade 5 feuilles du maïs.
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL (235 g/L) plus AATREX 480 (480 g/L) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus bromoxynil* *plus atrazine* *plus NAU*	1,56 L/ha 0,5 L/ha 0,6 L/ha 1,04 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *0,14 kg/ha* *0,5 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 0,2 L/ac 0,24 L/ac 0,42 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles du maïs.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
OPTION 2.25 OD (22,5 g/L) plus PEAKPLUS[1] (PEAK [75 WG] + BANVEL II [480 g/L]) plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *foramsulfuron* *plus prosulfuron + dicamba* *plus NAU*	1,56 L/ha 13,3 g/ha + 0,3 L/ha 2,5 L/ha *35 g/ha* *10 g/ha + 0,14 kg/ha* *2,5 L/ha*	0,63 L/ac 5,3 g/ac + 0,12 L/ac 1 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 7 feuilles du maïs.
PROWL 400 (400 g/L) plus ACCENT (75 DF) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus surfactant non ionique *pendiméthaline* *plus nicosulfuron* *plus dicamba* *plus surfactant non ionique*	2,5 L/ha 16,7 g/ha 0,625 L/ha 2 L/1000 L *1 kg/ha* *12,5 g/ha* *300 g/ha* *0,2 % v/v*	1 L/ac 6,7 g/ac 0,25 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Traiter peu après la levée quand le maïs est entre le stade coléoptile et le stade 3 feuilles. · Voir les précautions relatives à PROWL, p. 139, à ACCENT, p. 140, et à BANVEL II ou à ORACLE, p. 141.
PROWL 400 (400 g/L) plus SHOTGUN (390 g/L) *pendiméthaline* *plus 2,4-D/atrazine*	4,2 L/ha 2,4–3,59 L/ha *1,68 kg/ha* *0,936–1,404 kg/ha*	1,68 L/ac 0,96–1,44 L/ac	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer du stade coléoptile au stade 3 feuilles du maïs. · Les graminées annuelles ne doivent pas avoir plus de 1–2 feuilles. · Appliquer sur des sols de texture moyenne ou fine renfermant plus de 3 % de matière organique. · Voir les précautions relatives à PROWL employé seul en POST, p. 139, et à SHOTGUN employé seul en POST, p. 143.
ULTIM (75 DF) plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus dicamba* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 0,6 L/ha 0,6 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,288 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,24 L/ac 0,24 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Se reporter à l'étiquette des produits pour des précisions sur les mauvaises herbes supprimées, le moment du traitement et les précautions à prendre. Si les stades de croissance des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, un traitement échelonné avec ULTIM et avec BANVEL II ou ORACLE est nécessaire. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à BANVEL II employé seul, p. 141.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ULTIM (75 DF) plus CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus mésotrione* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 0,21 L/ha 0,58 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,1 kg/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,085 L/ha 0,235 L/ac 2 L/1000 L	· Appliquer au stade 3–6 feuilles du maïs. · **NE PAS** utiliser sur du maïs de semence ni sur du maïs sucré. · Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à CALLISTO plus AATREX LIQUID, p. 142.
ULTIM TOTAL[1] ULTIM (75 DF) + DISTINCT (70 WG) plus surfactant non ionique plus nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) *nicosulfuron/rimsulfuron +* *diflufenzopyr/dicamba* *plus surfactant non ionique* *plus NAU*	 33 g/ha + 0,285 kg/ha 2,5 L/1000 L 12,5 L/1000 L *25 g/ha +* *0,2 kg/ha* *0,25 % v/v* *12,5 L/1000 L*	 13 g/ac + 0,115 kg/ac 2,5 L/1000 L 12,5 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer sur les plantules de dicotylédones en croissance active (moins de 5 cm de hauteur). · Appliquer sur les graminées annuelles au stade 1–6 feuilles et sur le chiendent commun au stade 3–6 feuilles. · ULTIM TOTAL se vend UNIQUEMENT en emballage combiné de ULTIM + DISTINCT. · Un sachet d'ULTIM TOTAL traite 4 ha (10 ac). · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à DISTINCT employé seul, p. 142.
ULTIM (75 DF) plus MARKSMAN (393 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron plus* *dicamba/atrazine* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 2,5 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *1,003 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 1 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Appliquer jusqu'au stade 5 feuilles du maïs. · Appliquer un sac hydrosoluble d'ULTIM/ha. Si les stades de croissance des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, un traitement échelonné avec ULTIM et MARKSMAN est nécessaire. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à MARKSMAN employé seul, p. 143.
ULTIM ([1:1] 75 DF) plus PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus bromoxynil* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 1 L/ha 1,2 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré**. · Pour un maximum de résultats, appliquer au stade 3–6 feuilles du maïs. · Chaque sachet hydrosoluble d'ULTIM traite 1 ha (2,5 ac). Se reporter à l'étiquette des produits pour des précisions sur les mauvaises herbes maîtrisées, le moment du traitement et les précautions à prendre. Si les stades de croissance des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, un traitement échelonné avec ULTIM et PARDNER est nécessaire. · **NE PAS** utiliser ULTIM sur du maïs traité avec des insecticides organophosphorés.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ULTIM ([1:1] 75 DF) plus PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) plus ATRAZINE 480 (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus bromoxynil* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 0,5 L/ha 0,6 L/ha 1,04 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *0,14 kg/ha* *0,5 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 0,2 L/ac 0,24 L/ac 0,42 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer au stade 3–6 feuilles du maïs de grande culture. · Ce traitement procure une meilleure maîtrise des plants plus gros d'abutilon (jusqu'au stade 6 feuilles) et d'herbe à poux (jusqu'au stade 8 feuilles). Si les stades de croissance des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, un traitement échelonné avec ULTIM et PARDNER plus atrazine est nécessaire. · **Nota :** Certains hybrides présentent une sensibilité au ULTIM. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, à PARDNER employé seul, p. 143, et à l'atrazine employée seule, p. 140.
ULTIM (75 DF) plus PEAKPLUS[1] PEAK (75 WG) + BANVEL II (480 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus prosulfuron + dicamba* *plus surfactant non ionique*	33 g/ha 13,3 g/ha + 0,3 L/ha 2 L/1000 L *25 g/ha* *10 g/ha + 0,14 kg/ha* *0,2 % v/v*	13 g/ac 5,3 g/ac + 0,12 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Appliquer sur le maïs au stade 2–6 feuilles. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à PEAKPLUS employé seul, p. 143. · PEAKPLUS est un emballage combiné de PEAK et de BANVEL II.
ULTIM (75 DF) SHOTGUN (390 g/L) plus surfactant non ionique *nicosulfuron/rimsulfuron* *plus atrazine/2,4-D* *plus surfactant non ionique*	33,7 g/ha 2,4–3,6 L/ha 2 L/1000 L 25 g/ha 0,94–1,4 kg/ha 0,2 % v/v	13,4 g/ac 0,96–1,44 L/ac 2 L/1000 L	· **NE PAS appliquer sur le maïs de semence ni sur le maïs sucré.** · Faire un traitement de pleine surface au stade 1–4 feuilles du maïs ou au stade 1–6 feuilles des graminées. · Voir les précautions relatives à ULTIM employé seul, p. 140, et à SHOTGUN employé seul, p. 143.

MAÏS « ROUNDUP READY » (TOLÉRANT LE GLYPHOSATE)

Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le maïs tolérant le glyphosate

On peut recourir à quatre grandes stratégies pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs tolérant le glyphosate :

1. Une seule application de glyphosate.
2. L'application de glyphosate mélangé en cuve avec un herbicide rémanent.
3. Deux applications de glyphosate en postlevée.
4. Une application en prélevée d'un herbicide rémanent, suivie d'une application de glyphosate en postlevée.

Au cours d'essais menés par le secteur public, l'efficacité de ces quatre stratégies a été évaluée en onze endroits sur deux saisons de croissance. Les données de rendement recueillies lors de ces essais sont présentées dans le tableau 9–4 en pourcentage par rapport au traitement le plus efficace. En général, les quatre stratégies procurent un maximum de rendement quel que soit le champ, pourvu qu'elles assurent une excellente maîtrise des mauvaises herbes au stade 3–8 feuilles du maïs.

TABLEAU 9–4. Rendement du maïs avec différentes stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le maïs tolérant le glyphosate

STRATÉGIE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS	RENDEMENT (%)
Application de glyphosate en deux passages *Application du glyphosate au stade 3–4 feuilles du maïs et à nouveau au stade 7–8 feuilles du maïs*	· Stratégie généralement la plus efficace au chapitre de la lutte contre les mauvaises herbes et des rendements du maïs. · Maîtrise optimale des mauvaises herbes vivaces.	· Stratégie plus coûteuse. · Augmentation des risques d'apparition d'une résistance au glyphosate.	100
PRÉ/POST *Application d'un herbicide rémanent en PRÉ, suivie d'une application de glyphosate au stade 7–8 feuilles du maïs*	· Stratégie généralement la plus efficace au chapitre de la lutte contre les mauvaises herbes et des rendements du maïs. · Recours à des herbicides ayant des modes d'action multiples pour venir à bout des peuplements de mauvaises herbes résistants. · Maîtrise optimale des mauvaises herbes vivaces.	· Stratégie plus coûteuse.	99
Application en un seul passage d'un mélange en cuve comprenant un herbicide rémanent *Application d'un mélange glyphosate + herbicide rémanent au stade 3–4 feuilles du maïs*	· Une seule application. · Recours à des herbicides ayant des modes d'action multiples pour venir à bout des peuplements de mauvaises herbes résistants.	· Traitement survenant trop tôt pour maîtriser bon nombre des mauvaises herbes vivaces. · Traitement moins efficace quand le produit ajouté au mélange n'a pas d'action rémanente contre l'éventail de mauvaises herbes présentes dans le champ.	97
Application hâtive de glyphosate en un seul passage *Application du glyphosate au stade 3–4 feuilles du maïs*	· Une seule application.	· Programme ne permettant pas toujours de tenir les mauvaises herbes en échec pendant toute la saison de croissance. · Possibilité que les mauvaises herbes qui lèvent après le traitement abaissent les rendements de manière significative.	96
Application tardive de glyphosate en un seul passage *Application du glyphosate au stade 7–8 feuilles du maïs*	· Stratégie non recommandée.	· Stratégie non recommandée.	90

Données de rendement recueillies au cours de onze essais reproduits durant les campagnes 2007 et 2008.
Source : P.H. Sikkema, Ph.D., campus de Ridgetown, Université de Guelph, et R. Nurse, Ph.D., Agriculture et Agroalimentaire Canada, Harrow.

TABLEAU 9–5. Évaluation des herbicides dans le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)

Nom commercial	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
	échinochloa pied-de-coq	digitaire astringente	digitaire sanguine	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Herbicides de contact de présemis – Voir les tableaux 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85, et 6–2, *Évaluation des herbicides de présemis*, p. 87, pour la liste des herbicides et leurs cotes d'efficacité.																													
Traitements en seul passage destinés uniquement aux hybrides tolérant le glyphosate																													
glyphosate[4] *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7/8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Mélanges en cuve à action rémanente pour application en un seul passage uniquement sur les hybrides tolérant le glyphosate																													
GALAXY[1] *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7/8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	G[4]
Action rémanente	-	-	9	**8**	8	**8**	8	8	9	8	-	-	-	**8**	**7**	-	7	**8**	7	-	5	2	0	0	0	7	0	0	
GALAXY[4] + atrazine* *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7/8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	G[4]
Action rémanente	-	-	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	8	9	**9**	7	**9**	-	**9**	**7**	9	9	**8**	**9**	6	5	2	0	0	0	7	0	0	
glyphosate[4] + atrazine *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7/8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	6	5	2	0	0	0	0	0	0	
glyphosate[4] + CALLISTO + AATREX LIQUID 480 *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	2	0	2	0	2	2	2	2	2	9	6	9	-	9	**9**	**9**	9	**9**	**9**	6	**9**	2	0	0	0	0	0	0	
glyphosate[4] + IMPACT + atrazine *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**8**	**9**	8	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	**6**	0	**6**	0	**6**	**6**	0	0	0	8	7	9	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	6	**6**	0	0	0	0	0	0	0	

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[4] À utiliser uniquement sur le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des mélanges en cuve et des produits homologués.

TABLEAU 9–5. Évaluation des herbicides dans le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate) (suite)

	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire astringente**	**digitaire sanguine**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**spargoute des champs**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**Tolérance de la culture**
glyphosate[4] + MARKSMAN ou PROPERO *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	7	**8**	**2**	0	0	0	2	2	2	
glyphosate[4] + PRIMEXTRA II MAGNUM *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7/8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	9	9	9	8	8	9	**9**	**9**	2	**9**	7	9	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	5	0	0	0	3	0	0	0	
HALEX GT + AATREX *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8	**9**	7/8	-	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	E[4]
Action rémanente	9	9	9	9	9	9	**9**	**9**	4	**9**	8	-	-	**9**	9	9	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	0	0	3	0	0	0	

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[4] À utiliser uniquement sur le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des mélanges en cuve et des produits homologués.

TABLEAU 9–6. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)

	Cultures spontanées		Graminées			Dicotylédones annuelles et bisannuelles												Vivaces			
Nom commercial	**haricots adzuki spontanés**	**blé spontané**	***Cenchrus***	**éragrostide fétide**	**éragrostide pectinée**	**sicyos anguleux**	**armoise bisannuelle**	**stellaire moyenne**	**ketmie trilobée**	**laitue scariole**	**lampsane commune**	**arroche étalée**	**renouée écarlate**	**ricinelle rhomboïde**	**amarante rugueuse**	**carotte sauvage**	**oxalide**	**morelle de la Caroline**	**agrostide blanche**	**vesce jargeau**	**muhlenbergie feuillée**
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée (pour hybrides tolérant le glyphosate uniquement)																					
glyphosate[4]	9	9	9	-	-	8	8	9	9	9	-	7/8	5	8	9	-	-	8	-	5	9
glyphosate[4] + atrazine*	9	9	9	-	-	8	8	9	9	9	9	7/8	5	9	9	2	9	8	-	5	9
glyphosate[4] + CALLISTO + AATREX	9	9	9	-	-	8	8	9	9	9	6	5	5	8	9	8	-	8	0	6	9
glyphosate[4] + MARKSMAN, PROPERO	9	9	9	-	-	8	9	9	9	9	9	7/8	5	9	9	9	-	8	-	8	9

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[c] Les céréales spontanées sont proches de l'épiaison quand ces produits sont normalement appliqués; des traitements plus hâtifs donnent de meilleurs résultats.

[4] À utiliser uniquement sur le maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des mélanges en cuve et des produits homologués.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 9–7. Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)

Produits à base de glyphosate	DOSE DE MATIÈRE ACTIVE : 0,9 kg/ha — DOSE DE PRODUIT :	1,35 kg/ha	1,8 kg/ha	PRODUITS POUVANT ÊTRE AJOUTÉS AUX MÉLANGES EN CUVE								
				atrazine*	CALLISTO + atrazine	DUAL II MAGNUM	DUAL II MAGNUM + CALLISTO	ELIM EP (GALAXY)	ELIM EP + atrazine	IMPACT + atrazine	MARKSMAN	PRIMEXTRA II MAGNUM
CREDIT PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
CREDIT 45 (450 g/L)	0,8 L/ac	1,2 L/ac	1,6 L/ac	✓						✓	✓	
FACTOR 540 GLYPHOSATE (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac					✓	✓	✓	✓	
GLYFOS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓	✓					✓	✓	
ROUNDUP ULTRA2 (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac	✓				✓	✓	✓	✓	
ROUNDUP WEATHERMAX (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac	✓				✓	✓	✓	✓	
SHARPSHOOTER PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓						✓	✓	
TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L)**	0,72 L/ac	1,1 L/ac	1,44 L/ac	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VANTAGE PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓	✓				✓	✓	✓	✓
VANTAGE PLUS MAX (480 g/L)	0,75 L/ac	1,13 L/ac	1,5 L/ac	✓						✓	✓	

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.
**TOUCHDOWN TOTAL peut également être mélangé en cuve avec PROPERO (dicamba/atrazine, 393 g/L).

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Désherbants chimiques de présemis et rémanents			
· Des herbicides non sélectifs tels que glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide rémanent avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. · Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE à utiliser en présemis. · Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel qu'atrazine, CONVERGE PRO, PRIMEXTRA II MAGNUM) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
Traitements de postlevée en seul passage destinés uniquement au maïs tolérant le glyphosate			
glyphosate*	**Voir tableau 9–7**	**Voir tableau 9–7**	· Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des produits à base de glyphosate homologués. · Appliquer jusqu'au stade 6 feuilles du maïs, inclusivement. · Les traitements doivent être prévus de manière à garder le maïs exempt de mauvaises herbes quand il est au stade 3-8 feuilles.
glyphosate	*0,9–1,8 kg/ha*		
Mélanges en cuve de postlevée à action rémanente pour application en un seul passage uniquement sur le maïs tolérant le glyphosate			
GALAXY[1] ELIM EP (25 DF) + ROUNDUP WEATHERMAX (540 g/L)	50 g/ha + 1,67 L/ha	20 g/ac + 0,67 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). · Appliquer du stade coléoptile au stade 6 feuilles du maïs. · Utiliser sur du maïs de plus de 2500 unités thermiques-maïs. · Volume d'eau : 140–190 L/ha. · Procure une action rémanente contre le panic d'automne, la sétaire verte, le chénopode blanc et les amarantes.
rimsulfuron + *glyphosate*	*12,5 g/ha +* *0,9 kg/ha*		
glyphosate* plus ATRAZINE 480 (480 g/L)	**Voir tableau 9–7** 1,56–2,1 L/ha	**Voir tableau 9–7** 0,63–0,85 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). · Appliquer jusqu'au stade 5 feuilles du maïs, inclusivement. · L'atrazine procure une action rémanente contre les dicotylédones. · Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des produits à base de glyphosate qui peuvent être mélangés en cuve avec de l'atrazine.
glyphosate *plus atrazine*	*0,9 kg/ha* *0,75–1,0 kg/ha*		

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
glyphosate* plus CALLISTO (480 g/L) plus AATREX LIQUID (480 g/L) plus surfactant non ionique *glyphosate* *plus mésotrione* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	**Voir tableau 9–7** 0,21 L/ha 0,58 L/ha 2 L/1000 L *0,9 kg/ha* *0,1 kg/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	**Voir tableau 9–7** 0,085 L/ac 0,235 L/ac 2 L/1000 L	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles du maïs, inclusivement. • CALLISTO et l'atrazine procurent une action rémanente contre les dicotylédones. • Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour une liste complète des produits à base de glyphosate qui peuvent être mélangés en cuve avec CALLISTO plus AATREX LIQUID.
glyphosate* plus IMPACT (336 g/L) plus atrazine (480 g/L)* *glyphosate** *topramézone* *plus diméthénamide* *plus atrazine*	**Voir tableau 9–7** 37 mL/ha 1,04 L/ha *0,9 kg/ha* *0,0125 kg/ha* *1,0 kg/ha* *0,5 kg/ha*	**Voir tableau 9–7** 15 mL/ac 0,42 L/ac	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • Appliquer jusqu'au stade 7 feuilles du maïs, inclusivement. • Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour une liste complète des produits à base de glyphosate qui peuvent être mélangés en cuve avec IMPACT plus atrazine.
glyphosate* plus MARKSMAN (393 g/L) **ou** PROPERO (393 g/L) *glyphosate* *plus dicamba/atrazine*	**Voir tableau 9–7** 2,5–3,7 L/ha *0,9 kg/ha* *1-1,5 kg/ha*	**Voir tableau 9–7** 1–1,5 L/ac	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • Appliquer jusqu'au stade 5 feuilles du maïs, inclusivement. • Marksman procure une action rémanente contre les dicotylédones. • Voir les précautions relatives à BANVEL II ou à ORACLE appliqués en POST, p. 141. • Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour la liste des produits à base de glyphosate qui peuvent être mélangés en cuve avec dicamba/atrazine.
glyphosate* plus PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L) *glyphosate* *plus s-métolachlore/benoxacor/atrazine*	**Voir tableau 9–7** 2,5 L/ha *0,9 kg/ha* *1,8 kg/ha*	**Voir tableau 9–7** 1,0 L/ac	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • Appliquer jusqu'au stade 6 feuilles du maïs, inclusivement. • PRIMEXTRA II MAGNUM procure une action rémanente contre les graminées et dicotylédones. • Pour assurer un maximum de compatibilité entre PRIMEXTRA II MAGNUM et l'un ou l'autre des produits à base de glyphosate : verser d'abord PRIMEXTRA II MAGNUM dans la cuve, puis ajouter AGRAL 90, AGSURF ou COMPANION à raison de 2,5 L/1000 L. Poursuivre l'agitation, puis ajouter le produit à base de glyphosate. • Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 155, pour une liste complète des produits à base de glyphosate qui peuvent être mélangés en cuve avec PRIMEXTRA II MAGNUM.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour en avoir une liste complète.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
HALEX GT (525 g/L) plus AATREX 480 (480 g/L) plus surfactant non ionique *glyphosate/s-métolachlore/ mésotrione* *plus atrazine* *plus surfactant non ionique*	4,2 L/ha 0,58 L/ha 2 L/1000 L *2 205 g/ha* *0,28 kg/ha* *0,2 % v/v*	1,7 L/ac 0,235 L/ac 2 L/1000 L	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • Appliquer jusqu'au stade 6 feuilles du maïs, inclusivement. • L'ajout d'atrazine renforce l'action contre : renouée liseron, lampourde glouteron, renouée persicaire, petite et grande herbes à poux.
Stratégies de lutte en PRÉ et en POST uniquement dans le maïs tolérant le glyphosate			
En PRÉ : PRIMEXTRA II MAGNUM ([1:0,8] 720 g/L) *s-métolachlore/benoxacor/atrazine* En POST : glyphosate* *glyphosate*	2,5 L/ha *1,8 kg/ha* **Voir tableau 9–7** *0,9 kg/ha*	1 L/ac **Voir tableau 9–7**	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). • L'application de la dose réduite de PRIMEXTRA II MAGNUM (1 L/ac) supprime la partie aérienne des mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette et s'inscrit dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes intégrant un traitement au glyphosate de suivi en postlevée.
Traitements de postlevée au glyphosate en deux passages destinés uniquement au maïs tolérant le glyphosate			
glyphosate* *glyphosate*	**Voir tableau 9–7** *0,9-1,8 kg/ha*	**Voir tableau 9–7**	• Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de maïs sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate). Voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)* p. 155, pour la liste des produits homologués à base de glyphosate. • On recommande de faire le traitement initial entre les stades 3 et 5 feuilles pour éliminer la concurrence en début de saison. Un deuxième traitement peut être fait jusqu'au stade 8 feuilles du maïs. • Utiliser 100–200 L d'eau/ ha (40–80 L/ ac).

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 9–7, *Doses des produits à base de glyphosate et liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve destinés au maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate), p. 155*, pour en obtenir une liste complète.

MAÏS « LIBERTY LINK » (TOLÉRANT LE GLUFOSINATE)

Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le maïs tolérant le glufosinate

On peut recourir aux stratégies suivantes pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) :

1. Une seule application de LIBERTY.
2. L'application de LIBERTY mélangé en cuve avec un herbicide rémanent.
3. Deux applications de LIBERTY en postlevée.
4. Une application en prélevée d'un herbicide rémanent, suivie d'une application de LIBERTY en postlevée.

Le rendement en grains et la maîtrise des mauvaises herbes observés avec chacune des stratégies indiquées ci-dessus sont semblables à ceux qui ont été observés dans les essais menés par l'Université de Guelph sur le maïs tolérant le glyphosate; voir le tableau 9–8, ci-dessous. LIBERTY procure généralement une maîtrise optimale des mauvaises herbes sous des conditions chaudes et humides, quand les traitements sont faits le jour (plutôt que le matin ou le soir) et quand le recouvrement est uniforme. En présence de conditions fraîches, de mauvaises herbes de bonne taille et de rosée sur les feuilles des mauvaises herbes, LIBERTY est moins efficace et ce, même si les doses indiquées sur l'étiquette sont respectées.

TABLEAU 9–8. Évaluation des herbicides dans le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)

	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire astringente**	**digitaire sanguine**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**spargoute des champs**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	
Herbicides de contact de présemis – Voir les tableaux 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85, et 6–2, *Évaluation des herbicides de présemis*, p. 87, pour la liste des herbicides et leurs cotes d'efficacité.																												
Traitements en seul passage destinés uniquement aux hybrides « Liberty Link »																												
LIBERTY 200 SN[3] *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**8**	9	-	7	**8/9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**8**	**6**	6	-	6	**6/7**	**8**	**7**	E[3]
Mélanges en cuve à action rémanente pour application en un seul passage uniquement sur les hybrides « Liberty Link »																												
LIBERTY 200 SN[3] + atrazine *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	8	9	9	7	**8/9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**8/9**	**6**	6	-	6	**6/7**	**8**	**7**	E[3]
Action rémanente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	6	5	2	0	0	0	0	0	0	

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[3] À utiliser uniquement sur le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate).

TABLEAU 9–8. Évaluation des herbicides dans le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) (suite)

	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire astringente**	**digitaire sanguine**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**spargoute des champs**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	
LIBERTY 200 SN[3] + BANVEL II *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	6	-	6	**6/7**	**9**	**8**	E[3]
Action rémanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	7	**8**	-	**9**	**9**	**6**	9	**9**	**9**	7	**8**	**2**	0	0	0	0	**2**	**2**	
LIBERTY 200 SN[3] + DISTINCT *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	6	-	6	**6/7**	**9**	**9**	E[3]
LIBERTY 200 SN[3] + MARKSMAN **ou** PROPERO *(mauvaises herbes levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	-	6	**6/7**	**8**	**8**	E[3]
Action rémanente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**9**	7	**9**	-	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	**7**	**8**	**2**	0	0	0	2	2	**2**	
LIBERTY 200 SN[3] + PROWL *(mauvaises herbes levées)*	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**8**	9	-	7	**8/9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**8**	**6**	6	-	6	**6/7**	**8**	**7**	E[3]
Action rémanente	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	-	5	-	-	-	-	6	**9**	0	8	**8**	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[3] À utiliser uniquement sur le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate).

TABLEAU 9–9. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)

	Cultures spontanées		Graminées			Dicotylédones annuelles et bisannuelles												Vivaces			
Nom commercial	haricots adzuki spontanés	blé spontané	*Cenchrus*	éragrostide fétide	éragrostide pectinée	sicyos anguleux	armoise bisannuelle	stellaire moyenne	ketmie trilobée	laitue scariole	lampsane	arroche étalée	renouée écarlate	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	morelle de la Caroline	agrostide blanche	vesce jargeau	muhlenbergie feuillée
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée (uniquement pour les hybrides « Liberty Link »)																					
LIBERTY 200 SN[2]	-	-	7	-	-	4	-	-	7	-	-	-	1	6	-	-	-	7	-	-	8
LIBERTY 200 SN[2] + atrazine	-	2	7	-	-	5	8	9	7	-	9	2	0	9	0	2	9	7	-	-	8
LIBERTY 200 SN[2] + BANVEL II	-	0	7	-	-	2	9	9	9	8	9	7	6	7	9	6	9	7	-	8	8
LIBERTY 200 SN[2] + DISTINCT	-	-	7	-	-	4	9	9	9	8	9	7	5	9	**9**	8	-	7	-	8	8
LIBERTY 200 SN[2] + MARKSMAN **ou** PROPERO	-	-	7	-	-	6	9	9	9	9	9	7	3	9	**9**	9	-	7	-	8	8

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[2] À utiliser uniquement sur le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate).

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

[a] Utiliser la dose supérieure de l'herbicide pour une efficacité optimale.

[b] Pour obtenir ce degré de maîtrise, pulvériser sur les céréales spontanées avant le stade de la feuille de l'épi.

[c] Les céréales spontanées sont proches de l'épiaison quand ces produits sont normalement appliqués; des traitements plus hâtifs donnent de meilleurs résultats.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Désherbants chimiques de présemis et rémanents			
· Des herbicides non sélectifs tels que glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide rémanent avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. · Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE à utiliser en présemis. · Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel qu'atrazine, CONVERGE PRO, PRIMEXTRA II MAGNUM) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
Traitements de postlevée en seul passage destinés uniquement au maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)			
LIBERTY 200 SN (200 g/L) *glufosinate ammonium*	2,5 L/ha *0,5 kg/ha*	1 L/ac	· Traitement réservé **UNIQUEMENT** au maïs de grande culture et au maïs de semence spécialement sélectionnés pour leur tolérance au LIBERTY 200 SN. · On peut pulvériser le LIBERTY 200 SN du stade 1 feuille au stade 8 feuilles du maïs. · LIBERTY 200 SN est un herbicide de contact qui n'a pas d'activité rémanente dans le sol. Consulter l'étiquette du produit pour connaître les doses recommandées selon la mauvaise herbe visée et son stade de développement. On peut appliquer du sulfate d'ammonium à raison de 6 L/ha (2,4 L/ac) (préparation liquide) ou de 3,3 kg/ha (1,3 kg/ac) (préparation sèche) si l'on veut une action plus radicale contre certaines mauvaises herbes en particulier. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
Mélanges en cuve à action rémanente pour application en un seul passage uniquement sur le maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)			
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus ATRAZINE 480 (480 g/L) *glufosinate ammonium* *plus atrazine*	2,5 L/ha 1,75–2,34 L/ha *0,5 kg/ha* *0,84–1,12 kg/ha*	1 L/ac 0,7–0,93 L/ac	· Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate). · Ce mélange en cuve peut être appliqué jusqu'au stade 8 feuilles du maïs.
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus BANVEL II (480 g/L) *glufosinate ammonium* *plus dicamba*	2,5 L/ha 0,625 L/ha *0,5 kg/ha* *0,3 kg/ha*	1 L/ac 0,25 L/ac	· Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate). · Ce mélange en cuve peut être appliqué jusqu'au stade 5 feuilles du maïs. · Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul en POST, p. 141.
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus DISTINCT (70 WG) *diflufenzopyr/dicamba*	2,5 L/ha 0,285 kg/ha *0,2 kg/ha*	1 L/ac 0,114 kg/ha	· Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate). · Ce mélange en cuve peut être appliqué jusqu'au stade 5 feuilles du maïs. · Voir les précautions relatives à DISTINCT employé seul en POST, p. 142.
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus MARKSMAN (393 g/L) **ou** PROPERO (393 g/L) *glufosinate ammonium plus* *dicamba/atrazine*	2,5 L/ha 2,5–3,7 L/ha *0,5 kg/ha* *1–1,5 kg/ha*	1 L/ac 1–1,5 L/ac	· Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) · Ce mélange en cuve peut être appliqué jusqu'au stade 5 feuilles du maïs. · Voir les précautions relatives à BANVEL II employé seul en POST, p. 141.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LIBERTY 200 SN (200 g/L) PROWL 400 (400 g/L) *glufosinate ammonium* *plus pendiméthaline*	2,5 L/ha 2,5 L/ha *0,5 kg/ha* *1 kg/ha*	1 L/ac 1 L/ac	• Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) • Ce mélange en cuve peut être appliqué jusqu'au stade 4 feuilles du maïs.
Traitements de postlevée au glufosinate en deux passages destinés uniquement au maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)			
LIBERTY 200 SN (200 g/L) suivi de LIBERTY 200 SN (200 g/L) *glufosinate ammonium* *glufosinate ammonium*	2,5 L/ha 2 L/ha *0,5 kg/ha* *0,4 kg/ha*	1 L/ac 0,8 L/ac	• Appliquer **UNIQUEMENT** sur les hybrides de maïs « Liberty Link » (tolérant le glufosinate) • On peut faire la première application au stade 4–5 feuilles du maïs lorsque les mauvaises herbes sont au bon stade de croissance, puis faire la seconde application jusqu'au stade 8 feuilles du maïs afin de maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.

TABLEAU 9–10. Stade foliaire maximal (ou hauteur maximale) des mauvaises herbes pour les applications d'herbicides de postlevée dans le maïs

Nom commercial	Plage d'application (stade du maïs — feuille recourbée)	Graminées annuelles : Stade foliaire maximal						Dicotylédones annuelles : Stade foliaire maximal										Vivaces
		échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire verte	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	stramoine commune	renouée persicaire	chénopode blanc	moutarde des champs	morelles	amarantes	herbes à poux	abutilon	chiendent commun
Anti-graminées de postlevée																		
ACCENT	1–8	6	-	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3–6
DUAL II MAGNUM	PRÉ–3	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	PRÉ	PRÉ	-	-	-
FRONTIER MAX	PRÉ–3	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	PRÉ	PRÉ	-	-	-
ULTIM	1–6	6	-	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3–6
Anti-dicotylédones de postlevée																		
atrazine	tolérant à tous les stades	-	-	-	-	-	-	PRÉ	-	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	7–10 cm	5–10 cm	-
BANVEL II **ou** ORACLE	jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
BUCTRIL M **ou** BADGE **ou** MEXTROL	4–6	-	-	-	-	-	-	8	4	-	4	8	8	-	4	8	4	-
CALLISTO + atrazine	3–8	-	-	-	-	-	-	8	4	4	8	8	-	8	8	6	8	-
DISTINCT	2–6	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6–8	6	6	6	6	6	6	-
IMPACT + atrazine	1–7	4	-	-	4	-	-	-	-	5	-	8	8	8	8	8	8	-
MARKSMAN, PROPERO	jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
PARDNER **ou** BROTOX **ou** KORIL	4–8	-	-	-	-	-	-	8	4	-	4	8	4	-	4	4	4	-
PARDNER **ou** KORIL + atrazine	4–8	-	-	-	-	-	-	8	4	-	4	8	4	-	6	8	6	-
PEAKPLUS[1]	jusqu'à 6	-	-	-	-	-	-	-	6	5	4	6	12	-	6	8	6	-
SHOTGUN	coléoptile–4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	6	6	-	6	6	6	-

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.
[2] Destiné uniquement aux hybrides de maïs - Roundup Ready - (tolérant le glyphosate).
- Signifie que l'herbicide est inefficace contre la mauvaise herbe ou que les données disponibles ne permettent pas de préciser un stade foliaire maximal.
Le stade foliaire est exprimé en termes de nombre de feuilles, à moins d'indication différente.

TABLEAU 9–10. Stade foliaire maximal (ou hauteur maximale) des mauvaises herbes pour les applications d'herbicides de postlevée dans le maïs (suite)

Nom commercial	Plage d'application (stade du maïs — feuille recourbée)	Graminées annuelles : Stade foliaire maximal						Dicotylédones annuelles : Stade foliaire maximal										Vivaces
		échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire verte	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	stramoine commune	renouée persicaire	chénopode blanc	moutarde des champs	morelles	amarantes	herbes à poux	abutilon	chiendent commun
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																		
ACCENT 1-PASS[1]	1–7	6	-	6	6	6	6	-	6	-	4	6	12	-	6	8	6	3–6
ACCENT TOTAL[1]	2–8	6	-	6	6	6	6	6	6	6	6–8	6	6	6	6	6	6	3-6
BATTALION[1]	PRÉ–3	3	PRÉ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
GALAXY[1,2]	1–6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
glyphosate[2]	jusqu'à 8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
HALEX[2]	coléoptile–6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
IMPACT + FRONTIER + atrazine	1–7	4	-	-	4	-	-	-	-	5	-	8	8	8	8	8	8	-
LIBERTY	jusqu'à 8	5	5	4	5	4	5	-	4	-	6	6	4	-	6	7	4	1–4
OPTION 2.25OD	jusqu'à 8	6	-	4	5	4	5	-	-	-	-	8	7	5	7	4	4	6
PRIMEXTRA	PRÉ–3	2	2	2	2	2	2	PRÉ	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-
ULTIM TOTAL	2–6	6	-	6	6	6	6	6	6	6	6–8	6	6	6	6	6	6	3–6

[1] Indique que l'herbicide est vendu en emballage combiné sous cette appellation commerciale.
[2] Destiné uniquement aux hybrides de maïs « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate).
- Signifie que l'herbicide est inefficace contre la mauvaise herbe ou que les données disponibles ne permettent pas de préciser un stade foliaire maximal.
Le stade foliaire est exprimé en termes de nombre de feuilles, à moins d'indication différente.



REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 10–1. Évaluation des herbicides pour les fourrages

	Cultures								Graminées								Dicotylédones annuelles																Vivaces			
Nom commercial	plantules de luzerne	plantules de lotier	plantules de trèfle	plantules de graminées fourragères	luzerne établie	lotier établi	trèfles établis	pâturages (surtout de graminées)	sorgho fourrager et petit mil	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	folle avoine	renouée liseron	stellaire moyenne	gaillet gratteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	ortie royale	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	céraiste vulgaire	patience crépue	pissenlit	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs
Anti-graminées radiculaires																																							
EPTAM	✓	✓								**9**	**9**	**9**	9	**9**	**9**	-	-	6	**7**	-	-	0	-	7	**9**	6	**9**	2	0	-	-	-	0	0	0	0	**8**	**2**	0	0
TREFLAN **ou** RIVAL **ou** BONANZA	✓									**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	**8**	**5**	-	-	-	0	5	2	**8**	2	**8**	2	1	3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Anti-graminées de postlevée																																							
ACHIEVE LIQUID[1]				✓[1]						**8**	-	-	-	**9**	**9**	-	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
ASSURE II[1]					✓					**9**	8	9	9	**9**	9	9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0
VENTURE L	✓	✓	✓			✓	✓			**9**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0
KERB					✓	✓				**8**	**8**	**6**	-	**8**	**8**	-	-	-	**8**	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	**8**	0	0

✓Indique l'herbicide est homologué pour cet usage.
* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.
- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.
Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur les cultures de semence.
[2] Ne pas utiliser sur le mélilot.
[3] Sur les légumineuses établies, faire uniquement des traitements localisés à l'automne.
[4] Ne pas utiliser CLOVITOX PLUS et TOPSIDE sur les trèfles établis.
[5] Ne pas utiliser SIMADEX sur la luzerne établie.

TABLEAU 10–1. Évaluation des herbicides pour les fourrages (suite)

Nom commercial	Cultures									Graminées								Dicotylédones annuelles														Vivaces							
	plantules de luzerne	plantules de lotier	plantules de trèfle	plantules de graminées fourragères	luzerne établie	lotier établi	trèfles établis	pâturages (surtout de graminées)	sorgho fourrager et petit mil	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	folle avoine	renouée liseron	stellaire moyenne	gaillet gratteron	spargoute des champs	vergerette du Canada	ortie royale	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	céraiste vulgaire	patience crépue	pissenlit	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs
POAST ULTRA		✓	✓		✓					**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0
SELECT	✓									9	8	9	9	**9**	**9**	**9**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0
Anti-dicotylédones de postlevée																																						
2,4-D*				✓				✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**7**	2	-	-	-	**4**	**9**	**9**	**9**	**8**	-	**8**	-	-	**7**	**8**	-	0	0	0	**8**	**8**
2,4-DB : CALIBER **ou** COBUTOX **ou** EMBUTOX [2,3]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	5	-	-	-	-	**4**	**7**	**8**	**9**	**8**	-	8	**8**	-	-	-	-	-	0	0	8	**8**
BANVEL II **ou** ORACLE								✓		0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	-	-	9	8	-	**9**	**9**	**7**	**7**	9	8	**9**	**8**	-	9	8	-	0	0	0	**9**	**8**
BASAGRAN	✓				✓				✓	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	-	-	**5**	-	**9**	**7**	**9**	**7**	**8**	**6**	**9**	**6**	-	-	-	-	2	**8**	0	6	7
INFINITY				✓[1]						0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**9**	**9**	-	-	**9**	-	**9**	**9**	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**9**	7
MCPA*								✓		0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	-	-	-	-	**8**	-	**9**	**9**	**8**	**8**	-	**8**	**7**	-	-	-	8	-	0	0	**6**	**5**
MILESTONE								✓		0	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	6	-	-	-	-	9	**9**
PARDNER **ou** BROTOX **ou** KORIL									✓	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	2	-	2	-	2	**8**	**9**	**7**	**7**	**9**	-	**9**	5	-	-	-	0	0	0	0	6	5
PEAKPLUS									✓	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPSIDE4 **ou** TROPOTOX PLUS **ou** CLOVITOX PLUS[4]			✓	✓				✓		0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	-	-	-	**8**	-	**9**	**9**	**9**	**8**	-	**9**	**8**	-	-	-	-	-	0	0	**9**	**9**
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																																						
GRAMOXONE					✓	✓				8	**7**	**9**	-	**9**	**9**	-	-	**9**	**9**	-	-	-	-	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	9	-	-	-	0	0	-	0	0	**5**	0	0

✓Indique l'herbicide est homologué pour cet usage.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur les cultures de semence.

[2] Ne pas utiliser sur le mélilot.

[3] Sur les légumineuses établies, faire uniquement des traitements localisés à l'automne.

[4] Ne pas utiliser CLOVITOX PLUS et TOPSIDE sur les trèfles établis.

[5] Ne pas utiliser SIMADEX sur la luzerne établie.

TABLEAU 10–1. Évaluation des herbicides pour les fourrages (suite)

	Cultures								Graminées								Dicotylédones annuelles																Vivaces								
Nom commercial	**plantules de luzerne**	**plantules de lotier**	**plantules de trèfle**	**plantules de graminées fourragères**	**luzerne établie**	**lotier établi**	**trèfles établis**	**pâturages (surtout de graminées)**	**sorgho fourrager et petit mil**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**folle avoine**	**renouée liseron**	**stellaire moyenne**	**gaillet gratteron**	**spargoute des champs**	**vergerette du Canada**	**ortie royale**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**céraiste vulgaire**	**patience crépue**	**pissenlit**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
PRINCEP NINE-T **ou** SIMADEX[5] **ou** SIMAZINE					✓	✓	✓			6	8	8	-	-	**8**	**8**	**9**	**9**	-	-	-	-	-	**9**	**9**	9	9	**8**	-	6	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-
PURSUIT[1]	✓[1]				✓[1]					**8**	**7**	7	7	**9**	**9**	**8**	8	**8**	8	-	-	2	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	-	-	6	2	2	7	5	2	2
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée																																							
2,4-DB* + MCPA*[2,3]	✓									0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	5	-	-	-	-	-	**7**	**9**	**9**	**9**	-	-	**8**	-	-	-	-	-	0	0	8	**8**
MILESTONE + 2,4-D*								✓		0	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	**8**	**8**	8	-	-	-	**9**	**9**

✓Indique l'herbicide est homologué pour cet usage.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur les cultures de semence.

[2] Ne pas utiliser sur le mélilot.

[3] Sur les légumineuses établies, faire uniquement des traitements localisés à l'automne.

[4] Ne pas utiliser CLOVITOX PLUS et TOPSIDE sur les trèfles établis.

[5] Ne pas utiliser SIMADEX sur la luzerne établie.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)

GRAMINÉES FOURRAGÈRES (PRODUCTION DE SEMENCE UNIQUEMENT)

Moments des traitements herbicides :

- **Présemis (PP) —** Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.
- **Incorporation en présemis (IPS) —** Sauf indications contraires, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.
- **Prélevée (PRÉ)**
- **Postlevée (POST) —** Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

Appliquer tous ces traitements dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac), sauf indication contraire.

FIGURE 10–1. Stades de croissance foliaire de la luzerne

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Anti-graminées de postlevée			
ACHIEVE LIQUID (400 g/L) plus TURBOCHARGE	0,5 L/ha 0,5 L/100 L	0,2 L/ac 0,5 L/100 L	· Appliquer sur la folle avoine, la repousse d'avoine et les sétaires verte et glauque avant le tallage. Les traitements faits après le tallage des mauvaises herbes risquent de ne pas être d'une efficacité acceptable.
tralkoxydime plus *adjuvant*	*0,2 kg/ha* *0,5 % v/v*		· **Sûr pour les graminées fourragères suivantes uniquement si elles sont destinées à la production de semence :** – Plantules et plants établis d'agropyre intermédiaire et d'agropyre à crête, de fétuque rouge traçante, de brome des prés et de brome inerme contre-ensemencés de céréales ou cultivés seuls. – Pour l'établissement de l'agropyre du Nord, de l'agropyre de l'Ouest et de l'agropyre à chaumes rudes. · **NE PAS** mélanger en cuve ACHIEVE LIQUID avec des herbicides, insecticides, fongicides, engrais, micronutrients ni adjuvants autres que ceux qui sont énumérés sur l'étiquette.
Anti-dicotylédones de postlevée			
INFINITY *pyrasulfotole/bromoxynil*	0,83 L/ha *0,213 kg/ha*	0,33 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** sur le phléole des prés destiné à la production de semences. · Appliquer en POST avant la sortie de la feuille de l'épi. · Ajouter du sulfate d'ammonium à raison de 1 L/ha (0,4 L/ac) pour maîtriser le gaillet gratteron au stade 4–6 verticilles.
LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES SEMÉES SANS PLANTE-ABRI			
Anti-graminées radiculaires			
EPTAM (800 g/L) *EPTC*	4,25 L/ha *3,4 kg/ha*	1,7 L/ac	· Appliquer par IPS. · Dans la luzerne ou le lotier en culture pure seulement. · Appliquer l'herbicide sur un sol sec en surface et enfouir immédiatement. · Certaines dicotylédones, comme l'herbe à poux, les moutardes, sisymbres et vélars, et les amarantes échappent souvent au traitement.
TREFLAN (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,148 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. · Pour les peuplements purs de luzerne. · Utiliser la dose inférieure en sols sableux et la dose supérieure en sols loameux à argileux.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus ASSIST **ou** MERGE *séthoxydime* plus *concentré d'huile* **ou** *surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 2 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *2 L/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,8 L/ac 0,4 L/ac	· Appliquer POAST ULTRA sur les graminées annuelles levées quand elles sont au stade 1–6 feuilles et en croissance active, tant que la culture est assez basse pour que la pulvérisation atteigne toutes les mauvaises herbes. · La luzerne tolère POAST ULTRA à tous les stades de sa croissance. · Utiliser MERGE lorsque les conditions ou les mauvaises herbes réclament des doses de moyennes à élevées de POAST ULTRA. · Le désherbage est normalement complet au bout de 7–21 jours. · Laisser s'écouler 70 jours entre le traitement et la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* plus *surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha* *1-2 L/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer lorsque le chiendent commun possède 1–3 feuilles et est en pleine croissance. · Une préparation minutieuse du lit de semence favorise la levée plus uniforme du chiendent commun. · Tient en échec le chiendent commun pendant 6–8 semaines. · Laisser s'écouler 70 jours entre le traitement et la récolte.
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* plus *surfactant*	0,13–0,38 L/ha 5–10 L/1000 L *0,03–0,09 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,05–0,15 L/ac 5–10 L/1000 L	· Pulvériser quand les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2–6 feuilles. · Pour les peuplements purs de luzerne. · La luzerne est tolérante à tous les stades de croissance. · Utiliser la dose la plus forte pour lutter contre le chiendent commun. · Laisser s'écouler 30 jours entre l'application et la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,8–2 L/ha *0,1–0,25 kg/ha*	0,32–0,8 L/ac	· Utiliser la dose supérieure (2 L/ha [0,8 L/ac]) en présence de chiendent commun. · Appliquer au stade 2–4 feuilles des graminées annuelles et au stade 3–5 feuilles du chiendent commun. · VENTURE L et le 2,4-DB peuvent être mélangés dans la cuve du pulvérisateur, aux doses indiquées sur l'étiquette, pour maîtriser une large gamme de mauvaises herbes. Consulter l'étiquette de 2,4-DB. · **NE PAS** servir de luzerne aux animaux dans les 41 jours qui suivent le traitement. · **NE PAS** servir ni donner en pâturage de trèfle rouge ni de lotier corniculé à des animaux dans l'année du traitement.
Anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* plus *concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Traitement destiné à la culture de semence de luzerne uniquement. · Traiter à partir du stade 3e feuille trifoliée de la luzerne. · Deux pulvérisations à raison de 1,75 L/ha (0,7 L/ac), à 10 jours d'intervalle, détruisent la partie aérienne du souchet comestible et du chardon des champs, et parfois celle du liseron des champs. · Un temps frais ou la sécheresse risque de réduire l'effet désherbant. · Réduire la dose de concentré d'huile à 1 L/ha (0,4 L/ac) par temps anormalement chaud et humide, sous peine de léser les légumineuses.
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	1,75–2,25 L/ha *1,1–1,4 kg/ha*	0,7–0,9 L/ac	· Appliquer dans au moins 150 L d'eau/ha (60 L/ac), lorsque la luzerne, le lotier ou les trèfles ont 1–4 feuilles et que les plantules de graminées fourragères ont 2–4 feuilles. · **NE PAS** donner en pâturage ni récolter les légumineuses comme fourrage dans les 30 jours qui suivent un traitement. · Ce traitement **N'EST PAS** conçu pour les cultures de graminées fourragères destinées à être pâturées ou récoltées comme fourrage dans l'année du traitement. · **NE PAS** appliquer sur des cultures de semence. · **NE PAS** faire ce traitement s'il y a sécheresse. · Le 2,4-DB arrête habituellement la croissance des légumineuses pendant 2–3 semaines. · En cas de sécheresse, de température élevée ou d'autre stress, ce traitement peut endommager gravement les légumineuses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA (15:1)*	2,75–4,25 L/ha *1,1–1,7 kg/ha*	1,1–1,7 L/ac	• Appliquer lorsque les trèfles ont entre 1 feuille simple et 4 feuilles trifoliées et que les plantules de graminées fourragères ont 2–4 feuilles. • Peut ralentir la croissance des trèfles pendant 2–3 semaines. • **NE PAS** dépasser 3,5 L de TOPSIDE/ha **sur les plantules de graminées fourragères.** • **NE PAS** appliquer TOPSIDE ni TROPOTOX PLUS dans moins de 150 L d'eau/ha (60 L/ac). • **NE PAS** appliquer CLOVITOX PLUS dans moins de 175 L d'eau/ha (70 L/ac). • **NE PAS** appliquer CLOVITOX PLUS lorsque les températures dépassent 27 °C. • **NE PAS** faire ce traitement s'il y a sécheresse. • **NE PAS** donner en pâturage ni récolter de fourrage dans l'année du traitement.
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée			
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) plus MCPA AMINE (500 g/L) *2,4-DB* plus *MCPA*	1,25 L/ha 70 mL/ha *0,8 kg/ha* *35 g/ha*	0,5 L/ac 28 mL/ac	• Appliquer lorsque les légumineuses ont entre 1 et 4 feuilles. • **NE PAS** donner en pâturage ni récolter comme fourrage dans les 30 jours qui suivent un traitement. • **NE PAS** appliquer sur des cultures de semence. • L'ajout de MCPA permet un traitement plus efficace contre la moutarde que le 2,4-DB seul. • Appliquer dans au moins 150 d'eau/ha (60 L/ac).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
PURSUIT (240 g/L) plus surfactant non ionique plus engrais liquide (10-34-0, 28-0-0 ou 32-0-0) *imazéthapyr* plus *surfactant non ionique* plus *engrais liquide*	0,312–0,42 L/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *0,075–0,1 kg/ha* *0,25 % v/v* *2 L/ha*	0,125–0,168 L/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	• Appliquer seulement une fois que la première feuille trifoliée est pleinement développée. • Pour la luzerne de semence seulement. • Une application par année. Appliquer lorsque les mauvaises herbes ont moins de 7,5 cm de haut. • Appliquer dans 200 L d'eau/ha (80 L/ac).
LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES ÉTABLIES			
Anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* plus *concentré d'huile*	0,375–0,75 L/ha 5 L/1000 L *0,036–0,072 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,3 L/ac	• Traiter lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées sont entre le stade 2 feuilles et le tallage, et le chiendent commun au stade 2–6 feuilles. • Pour la luzerne de semence seulement. • **NE PAS** donner en pâturage ni récolter de fourrage dans l'année du traitement. • Utiliser la dose de 0,375 L/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales et la sétaire verte. • La dose de 0,5 L/ha (0,2 L/ac) détruit la partie aérienne du chiendent commun et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. • Utiliser la dose de 0,75 L/ha (0,3 L/ac) pour maîtriser le chiendent commun.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
KERB (50 WP) *propyzamide*	2,25–3,25 kg/ha *1,125-1,625 kg/ha*	0,9–1,3 kg/ac	• Contre les graminées uniquement dans la luzerne et le lotier. • Appliquer entre la fin septembre et le début novembre avant que le sol gèle. • **NE PAS** récolter ni laisser les animaux brouter le fourrage avant 90 jours si l'on a employé les doses supérieures et 60 jours si l'on a employé les doses inférieures.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* plus *surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer lorsque le chiendent commun possède 1–3 feuilles et est en pleine croissance. • Appliquer dans 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac). • Maîtrise le chiendent commun pendant 6–8 semaines. • Laisser s'écouler 70 jours entre le traitement et la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	• Utiliser la dose supérieure (2 L/ha [0,8 L/ac]) en présence de chiendent commun. • Appliquer au stade 2–4 feuilles des graminées annuelles et au stade 3–5 feuilles du chiendent commun. • VENTURE L et le 2,4-DB peuvent être mélangés dans la cuve du pulvérisateur, aux doses indiquées sur l'étiquette, pour maîtriser une large gamme de mauvaises herbes. Consulter l'étiquette de 2,4-DB. • Attendre 41 jours après le traitement avant de servir de la luzerne aux animaux. • **NE PAS servir de trèfle rouge ni de lotier corniculé à des animaux dans l'année du traitement.**
Anti-dicotylédones de postlevée			
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	2,25–2,75 L/ha *1,4–1,7 kg/ha*	0,9–1,1 L/ac	• Pour les cultures pures ou les mélanges de luzerne et de lotier, faire des traitements localisés ou quand le regain après la coupe ou le broutage n'atteint pas plus de 7 cm de hauteur. • **NE PAS** donner en pâturage ni récolter comme fourrage dans les 30 jours qui suivent un traitement. • **NE PAS** appliquer sur les cultures de semence. • Appliquer dans au moins 150 d'eau/ha (60 L/ac).
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	2,25 L/ha *1,4 kg/ha*	0,9 L/ac	• Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active au mois de septembre ou octobre quand le regain, après la coupe ou le broutage, n'atteint pas plus de 7 cm. • Appliquer dans au moins 150 d'eau/ha (60 L/ac).
CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA (15:1)*	4,25 L/ha *1,7 kg/ha*	1,7 L/ac	• Pour les cultures pures ou les mélanges de trèfles rouge et alsike. • Faire des traitements localisés ou un traitement de pleine surface quand le regain, après la coupe ou le broutage, n'atteint pas plus de 7 cm de hauteur.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	4,75–12 L/ha 3,8–9,6 L/ha 3,56–9 L/ha 3,42–8,64 L/ha 3,17–8 L/ha *1,71–4,32 kg/ha*	1,7–4,8 L/ac 1,52–3,84 L/ac 1,42–3,6 L/ac 1,38–3,5 L/ac 1,27–3,2 L/ac	· **EN TRAITEMENT LOCALISÉ SEULEMENT :** Appliquer lorsque le liseron des champs est en fleur et que les autres mauvaises herbes sont entre les stades bouton floral et pleine floraison. · **NE PAS** faire pâturer ni récolter les zones traitées tant que les mauvaises herbes traitées n'ont pas bruni.
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	2,8–5,5 L/ha *0,56–1,1 kg/ha*	1,12–2,2 L/ac	· Appliquer au printemps sur le lotier de semence quand il atteint environ 15 cm de hauteur. · Appliquer sur la luzerne ou le lotier fourrager dans les 5 jours qui suivent la coupe. · Lors de sécheresses ou de grosses chaleurs, on a constaté un éclaircissement du pâturage et une lente reprise de la végétation. · **NE PAS** utiliser au printemps après un traitement à la simazine.
PURSUIT (240 g/L) plus surfactant non ionique plus engrais liquide (10-34-0, 28-0-0 ou 32-0-0) *imazéthapyr* plus *surfactant non ionique* plus *engrais liquide*	0,312–0,42 L/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *0,075–0,1 kg/ha* *0,25 % v/v, 2 L/ha*	0,125–0,168 L/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	· Appliquer seulement une fois que la première feuille trifoliée est pleinement développée. · Pour la luzerne de semence seulement. · Une application par année. Appliquer lorsque les mauvaises herbes ont moins de 7,5 cm de haut. · Appliquer dans 200 L d'eau/ha (80 L/ac).
SIMADEX (500 g/L) **ou** PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMAZINE 80W (80 WP) *simazine*	2,2 L/ha 1,22 kg/ha 1,38 kg/ha *1,1 kg/ha*	0,88 L/ac 0,49 kg/ac 0,55 kg/ac	· Traiter entre septembre et novembre, avant la gelée. · Ce traitement empêche l'établissement des plantules de légumineuses pendant environ 8 mois. · **NE PAS** utiliser SIMADEX sur la luzerne. · **NE PAS** traiter l'automne précédant le semis d'une autre culture. · **NE PAS** appliquer GRAMOXONE pendant un an après avoir appliqué de la simazine. · **NE PAS** appliquer sur le même champ pendant plus de 3 années consécutives. · **NE PAS** laisser paître les bovins ou les moutons dans les 30 jours qui suivent le traitement.
Avant la récolte			
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	2,5–5 L/ha 2–4 L/ha 1,875–3,75 L/ha 1,8–3,6 L/ha 1,67–3,34 L/ha 0,9–1,8 kg/ha	1 –2 L/ac 0,8–1,6 L/ac 0,75 à 1,5 L/ac 0,73 à 1,46 L/ac 0,67 à 1,34 L/ac	· Appliquer 3–7 jours avant la dernière coupe de la dernière année de culture de la plante fourragère. Le fourrage peut être brouté ou servir de foin ou d'ensilage mi-fané.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
SORGHO ET MILLET FOURRAGERS			
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D Amine (470 g/L)*	0,6–1,2 L/ha	0,24–0,48 L/ac	· Appliquer lorsque la culture est au stade 4–6 feuilles avant la fermeture du couvert de feuillage. · **NE PAS** appliquer dans les 30 jours qui précèdent la récolte. · **NE PAS** faire la pulvérisation si le temps est chaud (plus de 27 °C) et humide.
2,4-D	*0,28–0,56 kg/ha*		
BASAGRAN FORTÉ (480 g/L)	1,75–2,25 L/ha	0,7–0,9 L/ac	· Appliquer lorsque la culture est au stade 3–6 feuilles avant la fermeture du couvert de feuillage. · **NE PAS** appliquer dans les 30 jours qui précèdent la récolte. · Du temps chaud et humide risque de faire jaunir temporairement le feuillage.
bentazone	*0,84–1,08 kg/ha*		
PARDNER (280 g/L) **ou** KORIL, BROTEX (235 g/L) *bromoxynil*	1 L/ha 1,2 L/ha *0,28 kg/ha*	0,4 L/ac 0,48 L/ac	· Appliquer en postlevée à raison de 200–300 L d'eau/ha. · Appliquer lorsque la culture a plus de 4 feuilles, mais avant qu'elle n'atteigne 20 cm de hauteur. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · **NE PAS** récolter dans les 30 jours qui suivent le traitement.
PEAKPLUS[1] (PEAK [75 WG] + BANVEL [480 g/L]) plus AGRAL 90 **ou** ASSIST *prosulfuron + dicamba* plus *surfactant non ionique* **ou** *concentré d'huile*	13,3 g/ha + 0,3 L/ha 2 L/1000 L 10 L/1000 L *10 g/ha + 0,14 kg/ha* *0,2 % v/v* *1 % v/v*	5,3 g/ac + 0,12 L/ac 2 L/1000 L 10 L/1000 L	· Appliquer quand la culture est au stade 3–5 feuilles. · Pour une efficacité maximale, pulvériser sur des mauvaises herbes en croissance active, entre les stades 1 et 6 feuilles. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **UNE SEULE** application par année.
RÉNOVATION DES PÂTURAGES AVEC DU LOTIER			
Pour réussir l'introduction de cette légumineuse dans un pâturage, il faut éliminer la concurrence que pourraient lui faire les mauvaises herbes et les graminées fourragères au cours des 2–4 mois qui suivent le début de sa germination. La lutte contre les mauvaises herbes vivaces établies devrait commencer au moins un an avant le semis de la légumineuse. Les traitements recommandés au chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, de la présente publication peuvent être utilisés. Si on ne peut pas labourer le champ ni le préparer pour l'ensemencement, on peut utiliser l'une des méthodes de désherbage chimiques suivantes. Le succès de ces programmes dépend de plusieurs interventions comme l'inoculation des graines de lotier et la maîtrise de la fertilité et du broutage.			

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
glyphosate (360 g/L) glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	4,75–12 L/ha 3,8–9,6 L/ha 3,56–9 L/ha 3,42–8,64 L/ha 3,17–8 L/ha *1,71–4,32 kg/ha*	1,9–4,8 L/ac 1,52–3,84 L/ac 1,42–3,6 L/ac 1,37–3,46 L/ac 1,27–3,2 L/ac	· Traiter lorsque les graminées fourragères ont au moins 2 feuilles.
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· Semer le lotier et épandre les engrais en pleine surface à la mi-avril. · Appliquer GRAMOXONE au début mai lorsque les graminées ont 5–10 cm de hauteur avant que les semences de légumineuses ne germent.

PÂTURAGES (SURTOUT DE GRAMINÉES)

Bisannuelles : À moins d'indications différentes, la plupart des produits chimiques ont avantage à être appliqués au début de l'automne de la première année de croissance ou à la fin du printemps de la deuxième année.

Vivaces : À moins d'indications différentes, appliquer à la fin du printemps (fin mai-début juin) quand les mauvaises herbes sont en croissance active. Le pâturage intensif a généralement pour effet d'éclaircir le peuplement de graminées et de favoriser l'établissement des mauvaises herbes. Le sous-pâturage permet aux mauvaises herbes comme la carotte sauvage de monter à graines. Le fauchage, fait au bon moment, empêche les graines de mûrir et de s'éparpiller au vent.

- Il existe des produits chimiques qui luttent contre la plupart des mauvaises herbes nuisibles aux pâturages de graminées. Ils peuvent tuer plus rapidement les mauvaises herbes établies que n'importe quelle autre méthode. Il est parfois nécessaire de répéter le traitement pour détruire les vivaces établies et empêcher la nouvelle pousse de mauvaises herbes quand le pâturage est clairsemé. On peut revigorer un pâturage clairsemé en conjuguant produits chimiques, fertilisation et gestion du broutage.
- Le désherbage chimique doit être fait jusqu'aux clôtures et aux zones bordant le pâturage afin d'éviter que ces endroits ne deviennent une source d'infestation.
- Généralement, les traitements chimiques endommagent sérieusement les trèfles. Toutefois, le trèfle blanc et la lupuline leur offrent une certaine résistance et se rétablissent promptement.
- Vérifier sur l'étiquette du produit utilisé le délai pendant lequel le bétail ne doit pas paître dans le champ traité.
- Ne pas laisser paître le troupeau dans les endroits où poussent des plantes toxiques (carotte à Moreau, renoncule, cerisier de Virginie, etc.) car elles peuvent devenir plus attrayantes pour les bestiaux après un traitement chimique. Garder le troupeau hors du pâturage pendant au moins une semaine après un désherbage chimique afin d'éviter que les animaux ne mangent des plantes dangereuses.
- Appliquer les traitements chimiques dans au moins 200 L d'eau/ha (80 L/ac) et augmenter ce volume, au besoin, pour atteindre les mauvaises herbes à travers une végétation dense.
- Pendant l'emploi de 2,4-D ou de dicamba, éviter que la dérive du produit ou de la vapeur qui s'en dégage n'atteigne des cultures sensibles, en recourant à des techniques de réduction de la dérive, comme les pulvérisations à haut volume, la production de gouttelettes grossières ou l'utilisation de buses anti-dérive.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
2,4-D (470 g/L) **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* 2,4-D*	1,8–2,34 L/ha 1,5–1,95 L/ha 1,29–1,67 L/ha *0,85–1,1 kg/ha*	0,72–0,94 L/ac 0,6–0,78 L/ac 0,52–0,67 L/ac	· **Utiliser la dose inférieure contre la chicorée sauvage.** · **Utiliser la dose supérieure contre :** – **Verge d'or.** – **Barbarée vulgaire :** faucher avant de pulvériser si les plantes sont en fleurs. – **Vipérine commune et bardane :** appliquer sous forme d'ester peu volatil. – **Carotte sauvage :** traiter au début du printemps ou au début de l'automne. En présence de souches résistantes au 2,4-D, faucher pour limiter la propagation par graines. – **Salsifis :** appliquer au début du printemps ou de l'automne. – **Asclépiade :** pulvériser le revers des feuilles. Ne détruit que la partie aérienne. – **Carotte à Moreau :** traiter en mai ou en juin. – **Pissenlit :** traitement également possible en septembre.
2,4-D (470 g/L) **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* 2,4-D*	2,34–3,72 L/ha 1,95–3,1 L/ha 1,29–2,65 L/ha *1,1–1,75 kg/ha*	0,94–1,49 L/ac 0,6–1,24 L/ac 0,52–1,06 L/ac	· Contre la **marguerite blanche** et le **crépis :** faire 2 traitements, l'un à la fin du printemps, l'autre au début de septembre si la repousse est suffisante.
2,4-D (470 g/L) **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* 2,4-D*	4,5 L/ha 3,99 L/ha 3,40 L/ha *2,25 kg/ha*	1,8 L/ac 1,6 L/ac 1,36 L/ac	· Contre le **séneçon jacobée.** · Appliquer sur les rosettes au printemps ou à l'automne. · Traiter à nouveau pour détruire les nouvelles plantules ou en cas de repousse.
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* plus BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *2,4-D** plus *dicamba*	2,34 L/ha 1,95 L/ha 1,29 L/ha 2,1 L/ha *1,1 kg/ha* *1,01 kg/ha*	0,94 L/ac 0,6 L/ac 0,52 L/ac 0,84 L/ac	· Contre la **carotte sauvage.** Appliquer tôt à l'automne contre les plantes de l'année. · Après le traitement, attendre 14 jours avant de récolter le fourrage destiné au troupeau laitier ou de laisser celui-ci brouter le fourrage. · Les animaux de boucherie peuvent paître l'herbe traitée ou manger du fourrage traité 30 jours après l'application du dicamba sans problème à l'abattage. · Dans le cas où des animaux de boucherie auraient consommé du fourrage traité au cours des 30 jours qui suivent l'application du dicamba, les nourrir de fourrage non traité pendant 30 jours avant l'abattage.
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	0,165–0,46 L/10 L *0,038–0,106 kg/10 L*		· **EN TRAITEMENT LOCALISÉ SEULEMENT.** · Utiliser la dose inférieure contre le **pissenlit,** le **chardon des champs,** le **laiteron des champs,** le **cranson dravier,** l'**asclépiade,** l'**herbe à puce** et la **linaire.** · Utiliser la dose supérieure contre la **prêle** et l'**euphorbe feuillue.** · Le traitement doit mouiller la mauvaise herbe visée avant la floraison. · Éloigner les animaux des zones traitées pendant 6–8 mois.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	1,25 L/ha *0,6 kg/ha*	0,5 L/ac	· **Pur toutes les doses de dicamba :** Les animaux de boucherie peuvent pâturer l'herbe traitée ou manger du foin traité 30 jours après l'application du dicamba sans restrictions à l'abattage. Dans le cas où des animaux de boucherie auraient consommé du fourrage traité au cours des 30 jours qui suivent l'application de dicamba, les nourrir de fourrage non traité pendant 30 jours avant l'abattage. · Pour détruire la partie aérienne des **euphorbes feuillue et cyprès :** appliquer lorsque les euphorbes sont en croissance active. · Aucun délai d'attente n'est nécessaire entre le traitement et la récolte destinée au troupeau laitier ou le pâturage de celui-ci.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,1 L/ha *1,01 kg/ha*	0,84 L/ac	· Contre le **séneçon jacobée :** Appliquer quand il est en croissance active. · Après le traitement, attendre 7 jours avant de récolter le fourrage destiné au troupeau laitier ou de laisser celui-ci brouter le fourrage. · Les animaux de boucherie peuvent paître l'herbe traitée ou consommer du fourrage traité 30 jours après l'application du dicamba sans problème à l'abattage.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,29 L/ha *1,1 kg/ha*	0,92 L/ac	· Contre la **verge d'or** : appliquer quand elle est en croissance active. · Après le traitement, attendre 14 jours avant de récolter le fourrage destiné au troupeau laitier ou de laisser celui-ci brouter le fourrage. · Les animaux de boucherie peuvent paître l'herbe traitée ou consommer du fourrage traité 30 jours après l'application du dicamba sans problème à l'abattage.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,5 L/ha *1,2 kg/ha*	1 L/ac	· Contre le **chardon des champs** et le **liseron des champs** : traiter lorsque les chardons sont au stade bouton floral et le liseron en fleurs. · Après le traitement, attendre 14 jours avant de récolter le fourrage destiné au troupeau laitier ou de laisser celui-ci brouter le fourrage. · Les animaux de boucherie peuvent paître l'herbe traitée ou consommer du fourrage traité 30 jours après l'application du dicamba sans problème à l'abattage.
BANVEL II (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	4,6 L/ha *2,212 kg/ha*	1,84 L/ac	· Contre le **salsifis majeur** : appliquer quand il est en croissance active. · Après le traitement, attendre 14 jours avant de récolter le fourrage destiné au troupeau laitier ou de laisser celui-ci brouter le fourrage. · Les animaux de boucherie peuvent paître l'herbe traitée ou consommer du fourrage traité 30 jours après l'application du dicamba sans problème à l'abattage.
EMBUTOX (625 g/L) **ou** CALIBER 625 (625 g/L) **ou** COBUTOX 625 (625 g/L) *2,4-DB*	2,75 L/ha *1,72 kg/ha*	1,1 L/ac	· Contre le **chardon penché,** le **chardon vulgaire,** le **laiteron des champs** et la **chicorée sauvage,** appliquer au stade de la rosette. · Contre la **barbarée vulgaire,** appliquer à l'automne. · Contre les **plantains,** appliquer avant la floraison. · Contre la **patience crépue,** appliquer sur les plantules. · **Destruction de la partie aérienne seulement des plantes suivantes :** – **chardon des champs :** appliquer quand les chardons ont 15 cm de haut jusqu'au début du stade du bouton. – **liseron des champs :** appliquer vers la fin de l'été. – **pissenlit :** appliquer avant le stade du bouton. – **prêle :** appliquer quand les prêles ont 10–12 cm de haut. · **NE PAS** donner en pâturage ni récolter de fourrage dans l'année du traitement.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/ HECTARE *matière active/ha*	PRODUIT/ACRE	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA*	4,25 L/ha *1,7 kg/ha*	1,7 L/ac	· Détruit uniquement la partie aérienne des mauvaises herbes. · **Chardon des champs :** Traiter à partir du moment où il a 15 cm de haut jusqu'au début du stade du bouton. · **Patience crépue, plantains et laiteron des champs :** Traiter au stade de la rosette. · **Renoncule et liseron des champs :** Appliquer au printemps. · **Prêle :** Traiter quand elle a 15 cm de haut. · Ce traitement est passablement sûr pour les légumineuses. · Appliquer TOPSIDE après que les cultures ont été pâturées ou récoltées et à un stade où les mauvaises herbes y sont sensibles. · **NE PAS** appliquer TOPSIDE ni TROPOTOX PLUS dans moins de 150 L d'eau/ha (60 L/ac). · **NE PAS** appliquer CLOVITOX PLUS dans moins de 175 L d'eau/ha (70 L/ac). · **NE PAS** appliquer CLOVITOX PLUS lorsque les températures dépassent 27 °C. · En ce qui concerne CLOVITOX PLUS et TOPSIDE : – **NE PAS** appliquer s'il y a sécheresse. – **NE PAS** donner en pâturage ni récolter de fourrage dans l'année du traitement.
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L) *glyphosate**	4,75–12 L/ha 3,8–8 L/ha 3,56–9 L/ha 3,42–8,64 L/ha 3,17–8 L/ha *1,71–4,32 kg/ha*	1,9–4,8 L/ac 1,52–3,2 L/ac 1,42–3,6 L/ac 1,37–3,46 L/ac 1,27–3,2 L/ac	· **EN TRAITEMENT LOCALISÉ SEULEMENT.** · Contre le **chardon des champs,** le **liseron des champs** et l'**asclépiade.** · Toujours utiliser la dose supérieure contre l'asclépiade. · Faire un traitement localisé sur le chardon et l'asclépiade entre le stade bouton floral et la pleine floraison, et sur le liseron en fleurs. · Contre le **tussilage :** faire un traitement localisé quand le tussilage a déployé ses feuilles. · Contre la **tanaisie** : faire un traitement localisé lorsque la tanaisie est entre le stade bouton floral et la pleine floraison. · Attendre que les zones traitées aient viré au brun avant d'y laisser brouter un troupeau.
MCPA (500 g/L) *MCPA**	2,2 L/ha *1,1 kg/ha*	0,88 L/ac	· Contre la **renoncule,** faire deux traitements, l'un en juin, l'autre au début de septembre. · Après le traitement, attendre 7 jours pour faire paître les animaux.
MILESTONE (240 g/L) *aminopyralide*	0,25–0,5 L/ha *60–120 g/ha*	0,10–0,20 L/ac	· Appliquer en postlevée. · Maîtrise : armoise absinthe (bisannuelle), verge d'or, centaurée, matricaire inodore, chardon des champs, chardon doré, chardon penché, potentille dressée et *Solanum viarum.* · Détruit la partie aérienne de la tanaisie vulgaire et du pissenlit.
MILESTONE (240 g/L) + 2,4-D Amine (564 g/L) *aminopyralide* plus *2,4-D amine*	0,25–0,5 L/ha 1,49–2,55 L/ha *60–120 g/ha* 840–1440 g/ha	0,10–0,20 L/ac 0,596–1,02 L/ac	· Appliquer en postlevée. · Pour maîtriser un plus large éventail de mauvaises herbes, le 2,4-D amine peut être ajouté au MILESTONE à raison de 1 partie de m.a. de MILESTONE/ha et 12 parties de m. a. de 2,4-D amine/ha.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

Soya

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 11–1. Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire

	Graminées								Dicotylédones annuelles												Vivaces							
Nom commercial	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	Tolérance de la culture
Herbicides de contact de présemis — Voir le tableau 11–3, *Évaluation des herbicides pour le soya tolérant le glyphosage*, p. 203, pour la liste des herbicides et leurs cotes d'efficacité.																											
Anti-graminées radiculaires																											
DUAL II MAGNUM	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	2	0	2	7	2	**8**	**8**	4	3	2	0	0	0	**8**[c]	0	0	0	B
FRONTIER, FRONTIER MAX	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	4	2	2	0	2	7	2	**8**	**8**	4	3	2	0	0	0	**8**[c]	0	0	0	B
TREFLAN, BONANZA, RIVAL	**9**	**9**	**8**	9	**9**	**9**	9	6	5	2	0	2	**8**	2	2	**8**	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	B
Anti-dicotylédones radiculaires																											
FIRSTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**9**[R]	**9**	-	**9**[R]	-	2	**9**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	-	2	-	-	2	6	-	E
LOROX	5	**5**	5	**5**	**5**	**5**	**5**	5	**8**	5	5	**9**	**9**	9	9	**9**[R]	**8**	6	**6**	2	2	2	2	2	2	2	B

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

[c] Un traitement par IPS est nécessaire pour obtenir ce degré d'efficacité.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–1. Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire (suite)

Nom commercial	Graminées								Dicotylédones annuelles											Vivaces							Tolérance de la culture
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
SENCOR	**7**	**6**	**7**	**5**	**5**	**5**	**8**	3	7	7	5	**9**	**9^{R}**	**9^{R}**	3	**9^{R}**	**8^{R}**	**7**	**7**	2	2	2	2	2	2	2	B
VALTERA	3	3	3	5	**5**	5	3	-	-	4	8	7	**9**	-	**9**	**9**	**7**	3	7	-	-	-	-	-	-	-	B
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																											
BOUNDARY	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	5	7	7	5	**9**	**9^{R}**	**9^{R}**	**8**	**9**	**7^{R}**	**7**	**7**	2	2	2	7	2	2	2	B
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM	9	9	8	8	9	9	9	6	7	**7**	**9**	**9**	**9^{R}**	**9**	**9**	**9**	**8^{R}**	7	**9**	2	**8**	-	**8^{c}**	0	3	4	E
COMMAND 360 ME	**9**	9	-	-	**9**	**9**	-	-	-	-	-	-	**9**	-	**9**	6	8/9	-	**9**	-	-	-	-	-	-	-	E
CONQUEST[1]	**8**	7	7	9	**9**	9	8	7	8	8	2	**9**	**9^{R}**	9	**9^{R}**	**9^{R}**	**9^{R}**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
PURSUIT	**8**	7	7	9^{R}	**9^{R}**	**9**	**8**	**7**	8	**7^{R}**	2	**9**	**9^{R}**	**9**	**9^{R}**	**9^{R}**	**8^{R}**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	E
VALOR	**9**	9	9	9	**9**	**9**	9	8	8	**7^{R}**	2	9	**9**	9	9	**9**	**8^{R}**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	E
Mélanges en cuve d'herbicides radiculaires																											
COMMAND 360 ME + SENCOR	**9**	**9**	-	-	**9**	**9**	-	-	-	-	-	-	**9**	-	**9**	**9^{R}**	**9**	-	**9**	-	-	-	-	-	-	-	B
COMMAND 360 ME + LOROX	**9**	**9**	-	-	**9**	**9**	-	-	-	-	-	-	**9**	-	**9**	**9^{R}**	**9**	-	**9**	-	-	-	-	-	-	-	B
COMMAND 360 ME + PURSUIT	**9**	**9**	7	9	**9**	**9**	**8**	**7**	8	7	-	9	**9**	**9**	**9**	**9^{R}**	8/9	6	**9**	-	-	-	7	-	-	-	E
COMMAND 360 ME + DUAL II MAGNUM	9	**9**	8	**9**	**9**	**9**	**9**	4	-	-	-	-	**9**	-	**9**	8/9	8/9	-	**9**	-	-	-	8	-	-	-	E
DUAL + LOROX + SENCOR	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	5	**8**	7	5	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**	**7**	**7**	2	2	2	7	2	2	2	B
DUAL II MAGNUM + LOROX	9	9	8	8	9	**9**	**9**	5	**8**	5	5	**9**	**9**	9	**8**	**9**	**8**	6	**6**	2	2	2	7	2	2	2	B
DUAL II MAGNUM + SENCOR	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	5	7	7	5	**9**	**9^{R}**	**9^{R}**	**8**	**9**	**8^{R}**	**7**	**7**	2	2	2	7	2	2	2	B
DUAL II MAGNUM+ PURSUIT	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	7	8	7^{R}	-	**9**	**9^{R}**	**9**	**9**	**9**	**8^{R}**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
FRONTIER + SENCOR	9	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	5	7	7	5	**9**	**9^{R}**	**9^{R}**	**8**	**9**	**8^{R}**	**7**	**7**	2	2	2	**8^{c}**	2	2	2	B

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

^{c} Un traitement par IPS est nécessaire pour obtenir ce degré d'efficacité.

· Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

^{R} Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–1. Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire (suite)

	Graminées								Dicotylédones annuelles											Vivaces							
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**Tolérance de la culture**
FRONTIER MAX + PURSUIT	**9**	**9**	**8**	9	**9**	**9**	**9**	7	8	7[R]	-	**9**	**9**[R]	**9**	**9**	**9**	**8**[R]	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
PURSUIT + FIRSTRATE	**8**	7	7	9[R]	**9**[R]	**9**	**8**	**7**	8	**9**[R]	9	**9**	**9**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**9**[R]	9	**9**	2	2	2	7	6	2	2	E
PURSUIT + LOROX	**8**	7	7	9[R]	**9**[R]	**9**	**8**	7	**8**	7[R]	5	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
PURSUIT + SENCOR	**8**	7	7	9[R]	**9**[R]	**9**	**8**	5	8	7	5	**9**	**9**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	**7**	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
PURSUIT + TREFLAN, BONANZA, RIVAL	9	**9**	8	9	**9**	**9**	**9**	7	8	**7**[R]	-	**9**	**9**[R]	**9**	**9**	**9**[R]	**8**[R]	6	**9**	2	2	2	7	6	2	2	B
TREFLAN, BONANZA, RIVAL + SENCOR	**9**	**9**	**8**	9	**9**	**9**	**9**	6	7	7	5	**9**	**9**	**9**	3	**9**	**8**	**7**	**8**	2	2	2	2	2	2	2	B
Anti-graminées de postlevée																											
ASSURE II	**9**	8	**9**	9	**9**	**9**	**9**	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0	E
EXCEL SUPER	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	E
POAST ULTRA	9	8	9	9	9	9	9	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0	E
SELECT	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0	E
VENTURE L	**9**	**8**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	0	0	E
Anti-dicotylédones de postlevée																											
BASAGRAN FORTÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	**9**	**5**	2	2	**8**	0	5	**7**	B
BLAZER	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**6**	2	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	**9**	7	7	**7**	6	**5**	2	2	6	**6**	P
CLASSIC	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8[R]	8	8	3	9	3	**9**	**8**[R]	8	**8**	2	2	8	**8**	2	8	4	B
FIRSTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**[R]	**9**	-	2	9	2	2	**9**[R]	**9**	**9**	-	2	-	-	2	7	7	E
PINNACLE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5	2	**8**	**9**[R]	**8**	3	**9**[R]	5	2	**8**	2	2	2	2	2	2	2	B
REFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	8	**7**	2	**8**	**6**	**9**	**8**	**9**	**9**	**7**	**6**	3	6	2	-	0	5	3	B

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

[c] Un traitement par IPS est nécessaire pour obtenir ce degré d'efficacité.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–1. Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire (suite)

Nom commercial	Graminées								Dicotylédones annuelles											Vivaces							Tolérance de la culture
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																											
CLEAN SWEEP[1]	**9**	**8**	6	9[R]	**9**[R]	**9**	**9**	**7**	**8**	**9**	5	**9**	**8**	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**	6	**9**	5	2	2	**8**	2	5	**7**	B
PURSUIT	**9**	**8**	6	9[R]	**9**[R]	**9**	**9**	**7**	**8**	**8**[R]	2	9	**8**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**[R]	6	**9**	2	2	2	**7**	2	2	2	B
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée																											
ASSURE II + BASAGRAN FORTÉ + PINNACLE	**9**	8	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**9**	**5**	**9**	**9**	**9**	7	**9**[R]	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	**9**	5	**7**	B
ASSURE II + PINNACLE	**9**	8	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	5	2	**8**	**9**[R]	**8**	3	**9**[R]	5	2	**8**	2	2	2	2	**9**	2	2	B
ASSURE II + CLASSIC	**9**	8	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	4	9[R]	8	8	3	9	3	**9**[R]	**8**[R]	8	**8**	2	2	8	8	**9**	8	4	B
BLAZER + BASAGRAN FORTÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**	**5**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	**9**	**6**	**9**	**7**	6	**5**	**8**	2	6	**7**	P
EXCEL SUPER + BASAGRAN FORTÉ	9	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**9**	**5**	**9**	**8**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	4	5	**7**	B
EXCEL SUPER + BASAGRAN FORTÉ + PINNACLE	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**9**	**5**	**9**	**9**	**9**	7	**9**[R]	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	4	5	**7**	B
EXCEL SUPER + PINNACLE	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	5	2	**8**	**9**[R]	**8**	3	**9**[R]	5	2	**8**	2	2	2	2	4	2	2	B
PINNACLE + BASAGRAN FORTÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**	**5**	**9**	**9**	**9**	7	**9**[R]	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	1	5	**7**	B
PINNACLE + REFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	8	**7**	2	**8**	**9**[R]	**9**	**8**	**9**	**9**	**7**	**8**	-	-	-	-	-	-	-	B
PURSUIT + FIRSTRATE	9	**8**	**6**	9[R]	**9**[R]	**9**	**9**	**7**	**8**	**9**[R]	**9**	**9**	**8**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**9**[R]	**9**	**9**	2	2	-	**7**	2	7	7	B
PURSUIT + REFLEX	**9**	**8**	6	9[R]	**9**[R]	**9**	**9**	**7**	**8**	**8**[R]	2	9	**8**[R]	**9**	**9**[R]	**9**	**8**	**7**	**9**	2	2	2	**7**	2	2	2	B
REFLEX + VENTURE L	9	8	9	8	8	**9**	**9**	**9**	8	**7**	2	**8**	**6**	**9**	**8**	**9**	**9**	**7**	**6**	3	6	2	-	0	5	3	B
VENTURE L + BASAGRAN	**9**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**8**	7	**9**	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	**9**	5	**7**	B

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

[c] Un traitement par IPS est nécessaire pour obtenir ce degré d'efficacité.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le soya ordinaire

	Graminées		Dicotylédones annuelles et bisannuelles											Vivaces		
Nom commercial	*Cenchrus*	repousse de maïs[2]	bident penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de la Caroline	muhlenbergie feuillée
Mélanges en cuve pour la destruction chimique et une action rémanente																
GARDIEN[1,2] (glyphosate + CLASSIC)	9	3	8	8	8	9	8	7/8	8	9	8	-	-	**8**	**8**	**8**
glyphosate + BOUNDARY[1]	-	0	-	8	-	-	4	8	7	-	5	-	-	**7/8***	**7/8***	**7/8**
glyphosate + BROADSTRIKE DUAL II MAGNUM	-	0	-	6	-	-	7	8	8	-	8	-	-	**8***	**8***	**8**
glyphosate + CONQUEST[1]	-	3	-	7	-	-	8	8	7	-	7	-	-	**7/8***	**7/8***	**7/8**
glyphosate + FIRST RATE	-	3	-	7	-	-	9	7	9	-	6	-	-	**8***	**8***	**8**
glyphosate + LOROX	-	0	-	8	-	-	4	8	6	-	1	-	-	**8***	**8***	8
glyphosate + PURSUIT	-	3	-	5	-	-	8	7	5	-	7	-	-	**8***	**8***	**8**
glyphosate + SENCOR	-	0	-	8	-	-	4	**8/9**	8	-	5	-	-	**7/8***	**7/8***	**7/8**
Anti-graminées radiculaires																
AXIOM	2	0	-	5	-	-	-	-	3	6	3	-	-	-	-	-
DUAL II MAGNUM	1	0	3	-	-	-	-	-	1	**6**	-	-	-	-	-	-
FRONTIER	1	0	-	-	-	-	-	-	1	**6**	-	-	-	-	-	-
Anti-dicotylédones radiculaires																
FIRSTRATE	-	3	9	6	-	-	-	-	8	1	6	9	-	-	-	-
LOROX	-	0	9	7	-	-	-	-	5	8	3	8	-	-	-	-
SENCOR	-	0	7	7	4	-	-	-	7	4	5	6	-	-	-	-
VALTERA	-	0	-	-	-	-	-	-	-	**9**	-	-	-	-	-	-
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																
BOUNDARY[1]	-	0	-	7	-	-	-	-	-	**6**	4	6	-	-	-	-
BROADSTRIKE DUAL II MAGNUM	-	0	9	5	-	-	-	-	8	6	6	8	-	-	-	-
PURSUIT	7	3	8	2	-	-	-	-	-	0	5	6	-	-	-	-

* De plus fortes doses de glyphosate (c.-à-d. de 1,35 à 1,8 kg/ha) sont nécessaires pour maîtriser ces vivaces.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[2] Ce traitement est sans effet contre le maïs spontané « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate).

[3] Pour obtenir ce degré d'efficacité, les pissenlits doivent avoir moins de 15 cm de diamètre.

TABLEAU 11–2. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le soya ordinaire (suite)

	Graminées		Dicotylédones annuelles et bisannuelles											Vivaces		
Nom commercial	*Cenchrus*	repousse de maïs[2]	bident penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de la Caroline	muhlenbergie feuillée
Anti-graminées de postlevée																
ASSURE II	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	6
EXCEL SUPER	8	**8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	2
POAST ULTRA	7	**7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	3
SELECT	7	**7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	3
VENTURE L	8	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	7
Anti-dicotylédones de postlevée																
BASAGRAN FORTÉ	0	0	9	6	-	8	2	4	5	2	4	3	5	-	-	-
BLAZER	0	5	4	-	-	6	4	-	6	9	2	0	6	-	-	-
CLASSIC	0	3	9	6	5	7	6	-	7	0	8	5	6	8[3]	-	-
FIRSTRATE	0	3	9	6	-	8	6	-	7	1	6	8	9	6	**6**	-
PINNACLE	0	0	8	-	3	8	3	6	5	2	2	3	6	-	-	-
REFLEX	0	5	4	-	-	7	6	-	7	**9**	2	-	7	-	-	-
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																
CLEANSWEEP[1]	6	3	9	7	-	8	1	5	6	2	5	6	-	-	-	-
PURSUIT	7	3	9	-	-	7	1	-	5	0	5	6	-	-	-	-

* De plus fortes doses de glyphosate (c.-à-d. de 1,35 à 1,8 kg/ha) sont nécessaires pour maîtriser ces vivaces.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[2] Ce traitement est sans effet contre le maïs spontané « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate).

[3] Pour obtenir ce degré d'efficacité, les pissenlits doivent avoir moins de 15 cm de diamètre.

FIGURE 11–1. Stades de croissance foliaire du soya



Soya

Sauf indication contraire, appliquer tous les traitements à raison de 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).

Tout l'équipement ayant été utilisé pour appliquer ACCENT, ACCENT TOTAL, BANVEL II, BATTALION, DISTINCT, LONTREL, MARKSMAN, MCPA, ORACLE, PEAKPLUS, SHOTGUN, 2,4-D ou les herbicides du même type, doit être nettoyé à fond immédiatement après usage, et également avant de traiter le soya. Voir la section *Nettoyage du pulvérisateur, p. 14*.

Système de désherbage total intégré — Bien que les herbicides aient leur efficacité, on a intérêt à appliquer toutes les méthodes de lutte pour obtenir le meilleur résultat possible : rotation des cultures, diversification des herbicides, passage d'une houe rotative, d'une herse ou d'un cultivateur, afin de tuer les jeunes mauvaises herbes et de les empêcher de proliférer. Voir le chapitre 9, *Maïs sucré, de semence et de grande culture*, p. 119, pour des détails sur chacune de ces méthodes.

Mauvaises herbes résistantes — On a découvert que des biotypes d'un certain nombre de mauvaises herbes sont résistants aux herbicides du groupe 5 (triazines) et du groupe 2. Voir la section *Lutte contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides*, p. 4, pour connaître les stratégies de gestion et de lutte préconisées.

Mauvaises herbes en particulier — Pour toute information sur des mauvaises herbes en particulier, voir le tableau 11–1, *Évaluation des herbicides pour le soya ordinaire*, p. 181, puis revenir à la section appropriée pour les détails sur les traitements.

Moments des traitements herbicides :

- **Présemis (PP) —** Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

- **Incorporation en présemis (IPS) —** Sauf indication contraire, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Veiller à la propreté de la machinerie et/ou traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

- **Prélevée (PRÉ) —** De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas.

- **Postlevée (POST) —** Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques anti-dérive appropriées.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Destruction chimique en présemis — Voir également le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85.			
• Des herbicides non sélectifs tels que le glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide rémanent avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. • Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE à utiliser en présemis. • Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel que SENCOR, LOROX L) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
CLEANSTART PLUS[1] CREDIT PLUS (360 g/L) + AIM EC (240 g/L) *glyphosate +* *carfentrazone-éthyle*	2,5 L/ha + 73 mL/ha *0,9 +* *0,0175 kg/ha*	1,0 L/ac + 30 mL/ac	• Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. • Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes pour assurer l'efficacité du traitement. • Seules les mauvaises herbes levées au moment du traitement seront détruites. • CLEANSTART PLUS[1] ne procure aucune action rémanente. • CLEANSTART PLUS[1] est un emballage combiné de CREDIT PLUS et d'AIM EC.
GARDIEN[1] TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L) + CLASSIC (25 DF) *glyphosate +* *chlorimuron-éthyle*	1,8 L/ha + 36 g/ha *0,9 kg/ha +* *9 g/ha*	0,72 L/ac + 14 g/ac	• Utiliser pour la destruction chimique en présemis. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette de CLASSIC et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67. • GARDIEN est un emballage combiné de TOUCHDOWN TOTAL + CLASSIC.
glyphosate plus VALTERA (51,1 %) *glyphosate +* *flumioxazine*	**Voir tableau 11–5** 114 g/ha *0,9 kg/ha +* *71,4 g/ha*	**Voir tableau 11–5** 56 g/ac	• Appliquer sur des sols de texture allant de grossière à moyenne. • Appliquer avant les semis du soya ou dans les 3 jours suivant le semis mais avant la levée du soya. • Toute application effectuée après que les jeunes pousses de soya ont commencé à fendiller le sol ou à lever endommagera gravement la culture. • **NE PAS** appliquer à moins de 100 mètres de poiriers qui ne sont pas en dormance. • **NE PAS** mélanger en cuve avec DUAL II MAGNUM, BOUNDARY ni FRONTIER MAX. • Toute opération de travail du sol effectuée après l'application réduira l'efficacité du traitement. • Appliquer une seule fois par saison de croissance.

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,15–1,75 L/ha *1,05–1,6 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac	· Appliquer en PP, avec ou sans incorporation, ou en PRÉ. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. · Le DUAL II MAGNUM maîtrise le souchet comestible lorsqu'il est appliqué par IPS. · Contre la morelle, on obtient de meilleurs résultats quand on applique DUAL II MAGNUM en PRÉ. · **NE PAS** utiliser sur les terres noires, les sols tourbeux, ni les sols riches en matière organique. · Utiliser la dose supérieure de DUAL II MAGNUM si l'infestation est forte. · Régler le matériel d'incorporation pour qu'il travaille tout au plus à 10 cm de profondeur.
FRONTIER (900 g/L) *diméthénamide*	1,1–1,4 L/ha *1–1,25 kg/ha*	0,44–0,56 L/ac	· Appliquer en PP, avec ou sans incorporation, ou en PRÉ. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. · Utiliser la dose supérieure si l'infestation est forte ou pour combattre morelles et amarantes (par IPS ou en PRÉ seulement) ou encore sur des sols à texture fine ou des sols riches en matière organique. · FRONTIER appliqué par IPS assure la maîtrise du souchet. · La dose minimale pour les traitements par IPS est de 0,5 L/ac. · Régler le matériel d'incorporation pour qu'il travaille tout au plus à 10 cm de profondeur.
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide*	756–963 mL/ha *544–693 g/ha*	302–385 mL/ac	· Voir les précautions relatives à FRONTIER. · La dose minimale pour les traitements par IPS est de 344 mL/ac. · Le soya doit être semé à au moins 4 cm de profondeur, sinon des dommages à la culture pourraient survenir.
TREFLAN (480 g/L) ou RIVAL (500 g/L) ou BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. · Incorporer une première fois aussitôt que possible après l'application (au plus tard au cours des 8–24 heures qui suivent). Le deuxième passage peut se faire n'importe quand avant le semis.
Anti-dicotylédones radiculaires			
FIRSTRATE (84 WG) *cloransulame-méthyle*	41,7 g/ha *35 g/ha*	17 g/ac	· Appliquer en PRÉ. · Appliquer dans le cadre d'un système traditionnel de travail du sol et dans un système de conservation du sol. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LOROX L (480 g/L) *linuron*	2,25–4,5 L/ha *1,13–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 L/ac	• Appliquer en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. • **NE PAS** utiliser sur les sables (moins de 2–3 % de matière organique). • Semer le soya à au moins 4 cm de profondeur. • La culture peut souffrir temporairement si les précipitations sont importantes ou les conditions météorologiques défavorables. • Utiliser les doses supérieures sur les sols organiques et les sols argileux.
SENCOR 75 DF (75 WG) *métribuzine*	0,75–1,5 kg/ha *0,56–1,12 kg/ha*	0,3–0,6 kg/ac	• Appliquer en PP, avec ou sans incorporation, ou en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. • **NE PAS** appliquer sur des sols sableux ni de texture grossière renfermant moins de 2 % de matière organique. • Utiliser la dose recommandée pour chaque type de sol (voir l'étiquette), sous peine d'endommager la culture. • S'il pleut beaucoup ou s'il fait mauvais, la culture peut subir des dégâts. • Semer le soya à au moins 4 cm de profondeur. • PP : – appliquer au plus tard 30 jours avant le semis; – utiliser la dose supérieure si l'infestation est forte et si le sol est riche en matière organique (plus de 4 %) ou riche en argile; – si les mauvaises herbes ont plus de 4 cm de haut, faire un mélange en cuve avec du glyphosate. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
VALTERA (51,1 %) *flumioxazine*	114 g/ha *71,4 g/ha*	56 g/ac	• Appliquer sur des sols de texture allant de grossière à moyenne. • Appliquer avant les semis du soya ou dans les 3 jours suivant le semis mais avant la levée du soya. • Toute application effectuée après que les jeunes pousses de soya ont commencé à fendiller le sol ou à lever endommagera gravement la culture. • **NE PAS** appliquer à moins de 100 mètres de poiriers qui ne sont pas en dormance. • **NE PAS** mélanger en cuve avec DUAL II MAGNUM, BOUNDARY ni FRONTIER MAX. • Toute opération de travail du sol effectuée après l'application réduira l'efficacité du traitement. • Appliquer une seule fois par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
BOUNDARY[1] (DUAL MAGNUM SOJA + SENCOR DF SOJA) *s-métolachlore* *+ métribuzine*	1,15–1,75 L/ha + 0,575–0,87 kg/ha *1,05–1,60 kg/ha* *+ 0,43–0,653 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac + 0,233–0,53 kg/ac	• Appliquer en PP ou en PRÉ. • Si le traitement est fait en PP, le mélange en cuve peut comprendre du glyphosate pour maîtriser les mauvaises herbes levées. • **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière qui renferment moins de 2 % de matière organique. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
BROADSTRIKE DUAL MAGNUM (924,7 g/L) *flumetsulam/métolachlore*	1,56 L/ha *1,44 kg/ha*	0,624 L/ac	• Appliquer en PP, avec ou sans incorporation, ou en PRÉ. Pour les traitements par IPS, régler le matériel pour qu'il travaille à 5–8 cm de profondeur. • Pour les traitements de présemis dans les systèmes de travail réduit du sol ou de semis direct, faire le traitement au plus tard 21 jours avant le semis. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. • **NE PAS** appliquer sur les sols qui présentent un pH supérieur à 7,8 et une teneur en matière organique inférieure à 2 %. • **NE PAS** appliquer sur des sols qui renferment plus de 5 % de matière organique. • Une pluie humectant le sol jusqu'à une profondeur de 5 cm est nécessaire dans les 7–10 jours suivant le traitement pour donner une efficacité optimale. • Cette préparation se sépare en deux phases avec le temps. Bien agiter le contenant avant l'emploi. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
COMMAND 360 ME (360 g/L) *clomazone*	1,6–2,35 L/ha *0,576–0,846 kg/ha*	0,64–0,94 L/ac	• **NE PAS** utiliser sur le soya Natto. • Appliquer en PRÉ. • **NE PAS** incorporer au sol. • Sur sols légers — appliquer COMMAND à raison de 1,6 L/ha. • Sur sols à texture moyenne — appliquer COMMAND à raison de 2,3 L/ha. • Sur sols lourds — appliquer COMMAND à raison de 2,35 L/ha. • Les doses de 2,3 à 2,35 L de COMMAND/ha permettent de maîtriser la sétaire glauque. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CONQUEST LQ[1] (PURSUIT [240 g/L] + SENCOR 480 F [480 g/L]) *imazéthapyr* *+ métribuzine*	0,312–0,42 L/ha + 0,625–0,833 L/ha *0,075–0,1 kg/ha* *+ 0,3–0,4 kg/ha*	0,125–0,168 L/ac + 0,25–0,33 L/ac	• Appliquer par IPS ou en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. • Convient aux sols à texture moyenne et lourde. • Utiliser la dose supérieure si l'infestation est forte ou sur des sols à texture fine ou encore sur des sols riches en matière organique. • Voir sous PURSUIT, ci dessous, pour plus de détails.
PURSUIT (240 g/L) *imazéthapyr*	0,312–0,42 L/ha *0,075–0,1 kg/ha*	0,125–0,168 L/ac	• Appliquer en PP, avec ou sans incorporation, ou en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67. • Ajouter un surfactant non ionique et un engrais liquide en présence de mauvaises herbes levées au moment de l'application. • PP : – appliquer PURSUIT à raison de 0,168 L/ac; – appliquer au plus tard 30 jours avant les semis; – dans le système de travail réduit du sol, il est conseillé de travailler le sol une seule fois après l'application pour préparer le lit de semence, en prenant soin de régler la machinerie à au plus 10 cm de profondeur et de ne pas ramener de sol non traité à la surface. • IPS : appliquer PURSUIT à raison de 0,125 L/ac. • PRÉ : utiliser un mélange en cuve en cas de forte infestation d'herbe à poux et d'échinochloa pied-de-coq. • IPS : un mélange en cuve peut être nécessaire en cas de forte infestation par le chénopode blanc, l'herbe à poux ou l'échinochloa pied-de-coq. • **NE PAS** incorporer ce produit en PP deux années de suite dans le même champ. • Utiliser seulement une fois par saison de croissance.
VALOR ([1:14,5] 342 g/L) *imazéthapyr/pendiméthaline*	3,4 L/ha *1,165 kg/ha*	1,36 L/ac	• Appliquer par IPS. • Laisser s'écouler 24 heures entre les applications. • Voir ci-dessus les précautions relatives à PURSUIT pour plus de détails. • Voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67, pour les restrictions relatives aux cultures comprises dans la rotation.

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Choix de mélanges en cuve d'herbicides radiculaires			
BOUNDARY[1] (DUAL MAGNUM SOJA + SENCOR DF SOJA) plus LOROX L (480 g/L) *s-métolachlore* *+ métribuzine* *plus linuron*	1,15–1,33 L/ha + 0,565–0,665 kg/ha 1,75–2 L/ha *1,05–1,60 kg/ha +* *0,43–0,653 kg/ha* *0,84–0,96 kg/ha*	0,46–0,55 L/ac + 0,23–0,27 kg/ac 0,71–0,81 L/ac	· Appliquer en PRÉ. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture grossière qui renferment moins de 2 % de matière organique.
COMMAND 360 ME (360 g/L) plus DUAL II MAGNUM (915 g/L) *clomazone* *plus s-métolachlore/benoxacor*	1,6–2,35 L/ha 1,75 L/ha *0,576–0,846 kg/ha* *1,6 kg/ha*	0,64–0,94 L/ac 0,7 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur le soya Natto. · Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** incorporer au sol. · Sur sols légers — appliquer COMMAND à raison de 1,6 L/ha. · Sur sols à texture moyenne — appliquer COMMAND à raison de 2,3 L/ha. · Sur sols lourds — appliquer COMMAND à raison de 2,35 L/ha. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
COMMAND 360 ME (360 g/L) plus LOROX L (480 g/L) *clomazone* *plus linuron*	1,6–2,35 L/ha 2–2,25 L/ha *0,576–0,846 kg/ha* *0,96–1,080 kg/ha*	0,64–0,94 L/ac 0,8–0,9 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur le soya Natto. · Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** incorporer au sol. · Sur sols légers — appliquer COMMAND à raison de 1,6 L/ha et LOROX L à raison de 2 L/ha. · Sur sols à texture moyenne — appliquer COMMAND à raison de 2,3 L/ha et LOROX L à raison de 2,25 L/ha. · Sur sols lourds — appliquer COMMAND à raison de 2,35 L/ha et LOROX L à raison de 2,25 L/ha. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
COMMAND 360 ME (360 g/L) plus PURSUIT (240 g/L) *clomazone* *plus imazéthapyr*	1,6–2,35 L/ha 0,312 L/ha *0,576–0,846 kg/ha* *0,075 kg/ha*	0,64–0,94 L/ac 0,125 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur le soya Natto. · Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** incorporer au sol. · Sur sols légers — appliquer COMMAND à raison de 1,6 L/ha. · Sur sols à texture moyenne — appliquer COMMAND à raison de 2,3 L/ha. · Sur sols lourds — appliquer COMMAND à raison de 2,35 L/ha. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
COMMAND 360 ME (360 g/L) plus SENCOR 75 DF (75 WG) *clomazone* *plus métribuzine*	1,6–2,35 L/ha 0,375–0,530 kg/ha *0,576–0,846 kg/ha* *0,281–0,398 kg/ha*	0,64–0,94 L/ac 0,15–0,212 kg/ac	• **NE PAS** utiliser sur le soya Natto. • Appliquer en PRÉ. • **NE PAS** incorporer au sol. • Sur sols légers — appliquer COMMAND à raison de 1,6 L/ha et SENCOR à raison de 0,375 kg/ha. • Sur sols à texture moyenne — appliquer COMMAND à raison de 2,3 L/ha et SENCOR à raison de 0,530 kg/ha. • Sur sols lourds — appliquer COMMAND à raison de 2,35 L/ha et SENCOR à raison de 0,530 kg/ha. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LOROX L (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus linuron*	1,15–1,75 L/ha 1,77–2,39 L/ha *1,05–1,6 kg/ha* *0,85–1,15 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac 0,71–0,96 L/ac	• Appliquer en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus SENCOR 75 DF (75 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,15–1,75 L/ha 0,55–1,5 kg/ha *1,05–1,6 kg/ha* *0,41–1,13 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac 0,22–0,6 kg/ac	• Appliquer par IPS ou en PRÉ. • Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate ou GRAMOXONE pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PURSUIT (240 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus imazéthapyr*	1,15–1,75 L/ha 0,312–0,42 L/ha *1,05–1,6 kg/ha* *0,075–0,1 kg/ha*	0,46–0,7 L/ac 0,125–0,168 L/ac	• Appliquer en PP ou en PRÉ. • Pour les traitements par IPS, la dose maximale de PURSUIT est de 0,312 L/ha.
FRONTIER (900 g/L) plus SENCOR 75 DF (75 WG) *diméthénamide* *plus métribuzine*	1,25–1,4 L/ha 0,55–0,75 kg/ha *1,125–1,25 kg/ha* *0,4–0,502 kg/ha*	0,5–0,56 L/ac 0,22–0,3 kg/ac	• Appliquer par IPS.
FRONTIER (900 g/L) plus PURSUIT (240 g/L) *diméthénamide* *plus imazéthapyr*	1,1–1,4 L/ha 0,312–0,42 L/ha *1–1,25 kg/ha* *0,075–0,1 kg/ha*	0,44–0,56 L/ac 0,125–0,168 L/ac	• Appliquer en PRÉ.
FRONTIER MAX (720 g/L) plus PURSUIT (240 g/L) *diméthénamide* *plus imazéthapyr*	756–963 mL/ha 0,312–0,42 L/ha *544–693 g/ha* *0,075–0,1 kg/ha*	302–385 mL/ac 0,125–0,168 L/ac	• Appliquer en PRÉ.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PURSUIT (240 g/L) plus FIRST RATE (84 WG) *imazéthapyr* *plus cloransulame-méthyl*	0,312 L/ha 20,8 g/ha *75 g/ha* *17,5 g/ha*	0,125 L/ac 8,5 g/ac	· Appliquer en PRÉ. · Peut être mélangé en cuve avec du glyphosate pour une destruction chimique en présemis des mauvaises herbes annuelles et vivaces déjà levées; voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour plus de détails.
PURSUIT (240 g/L) LOROX L (480 g/L) *imazéthapyr* *plus linuron*	0,312–0,42 L/ha 1,77–2,39 L/ha *0,075–0,1 kg/ha* *0,85–1,15 kg/ha*	0,125–0,168 L/ac 0,71–0,96 L/ac	· Appliquer en PRÉ.
PURSUIT (240 g/L) plus SENCOR 75 DF (75 WG) *imazéthapyr* *plus métribuzine*	0,31–0,42 L/ha 0,53–1,5 kg/ha *0,075–0,1 kg/ha* *0,4–1,13 kg/ha*	0,125–0,168 L/ac 0,21–0,6 kg/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · Pour les applications en PP, la dose maximale de SENCOR est de 1,3 kg/ha.
PURSUIT (240 g/L) plus TREFLAN (480 g/L) ou RIVAL (500 g/L) ou BONANZA 400 (400 g/L) *imazéthapyr* *plus trifluraline*	0,312 L/ha 1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,075 kg/ha* *0,6–1,155 kg/ha*	0,125 L/ac 0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus LOROX L (480 g/L) *métribuzine* *plus linuron*	0,44–1 kg/ha 1,04–2,5 L/ha *0,33–0,75 kg/ha* *0,5–1,2 kg/ha*	0,18–0,4 kg/ac 0,42–1 L/ac	· Appliquer en PRÉ.
TREFLAN EC (480 g/L) ou RIVAL (500 g/L) ou BONANZA 400 (400 g/L) plus SENCOR 75 DF (75 WG) *trifluraline* *plus métribuzine*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha 0,56–0,73 kg/ha *0,6–1,155 kg/ha* *0,42–0,55 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac 0,22–0,29 kg/ac	· Appliquer par IPS.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus concentré d'huile*	0,38–0,75 L/ha 5 L/1000 L *0,036–0,072 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	• Appliquer sur les céréales spontanées et les graminées annuelles entre le stade 2 feuilles et le tallage et sur le maïs spontané et le chiendent au stade 2–6 feuilles. • Utiliser la dose de 0,38 L d'ASSURE II/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales, le cenchrus épineux et la sétaire verte. • La dose de 0,5 L de ASSURE II/ha (0,2 L/ac) stoppe la croissance du chiendent et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. • Utiliser la dose de 0,75 L de ASSURE II/ha (0,3 L/ac) pour détruire le chiendent. • **NE PAS** appliquer sur le soya à moins de 80 jours de la récolte.
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	• Appliquer sur les graminées annuelles levées en croissance active qui possèdent 1–6 feuilles, quand la culture est assez petite pour que le traitement atteigne toutes les mauvaises herbes. • Une deuxième application peut être nécessaire pour maîtriser les graminées qui lèvent plus tard.
POAST ULTRA (450 g/L) plus ASSIST ou MERGE *séthoxydime* *plus concentré d'huile* *ou plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 2 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *2 L/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,8 L/ac 0,4 L/ac	• Employer la dose de 0,47 L/ha (0,19 L/ac) contre la folle avoine ou les céréales spontanées. • Appliquer POAST ULTRA sur les graminées levées en croissance active qui possèdent 1–6 feuilles, quand la culture est assez petite pour que le traitement atteigne toutes les mauvaises herbes. • Le désherbage est normalement complet au bout de 7–21 jours. Une deuxième application peut être nécessaire pour maîtriser les graminées qui lèvent après le traitement. • Utiliser MERGE lorsque les conditions ou les mauvaises herbes commandent des doses de moyennes à fortes de POAST ULTRA. • On obtient de meilleurs résultats en appliquant POAST ULTRA dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer dans 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac) sur le chiendent commun en croissance active qui possède 1–3 feuilles. • Une préparation soignée du sol en PP favorise une levée plus uniforme du chiendent. • La compétition de la culture et un sarclage entre les rangs 7–14 jours après l'application tiendra le chiendent en échec pendant 6–8 semaines.
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus surfactant*	0,125–0,375 L/ha 5–10 L/1000 L *0,03–0,09 kg/ha* *0,5–1 % v/v*	0,05–0,15 L/ac 5–10 L/1000 L	• Le soya est tolérant à tous les stades de sa croissance. • Appliquer lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées ont 2–6 feuilles. • Utiliser la dose supérieure contre le chiendent commun. Appliquer sur le chiendent ayant 2–5 feuilles. • Ajouter le surfactant AMIGO à raison de 5 L/1000 L de solution, pour la dose inférieure d'herbicide, et à raison de 10 L/1000 L de solution, pour la dose supérieure destinée à contrer le chiendent commun.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6 L/ha *0,075 kg/ha*	0,243 L/ac	· Cette dose s'emploie uniquement pour lutter contre le maïs spontané. · Appliquer au stade 2–5 feuilles du maïs spontané.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	1–2 L/ha *0,125–0,25 kg/ha*	0,4–0,8 L/ac	· Appliquer au stade 2–4 feuilles des graminées annuelles et au stade 3–5 feuilles du chiendent commun ou de la muhlenbergie feuillée. Utiliser la dose de 2 L de VENTURE/ha pour combattre la muhlenbergie feuillée.
Anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *bentazone*	1,75–2,25 L/ha *0,84–1,08 kg/ha*	0,7–0,9 L/ac	· Appliquer lorsque le soya est entre le stade feuille unifoliée et 4 feuilles trifoliées et que les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. · Le soya peut souffrir temporairement du traitement lorsqu'il fait anormalement chaud et humide. · Un temps froid ou sec peut retarder l'action de l'herbicide. · Pour renforcer la lutte contre l'abutilon et le chénopode blanc, et obtenir des résultats plus constants, on peut ajouter dans la bouillie du nitrate d'ammonium et urée en solution aqueuse (NAU) (28 %) à raison de 10 L/ha ou du sulfate d'ammonium liquide à raison de 6 L/ha. L'ajout de l'une ou l'autre de ces solutions azotées peut brûler légèrement les feuilles, mais la nouvelle pousse est normale et la vigueur du soya n'est pas compromise. · Utiliser la dose supérieure de BASAGRAN FORTÉ si la pression exercée par les mauvaises herbes est forte, si les mauvaises herbes sont grosses ou si les conditions sont défavorables aux opérations culturales.
BLAZER (240 g/L) *acifluorfène*	2,5 L/ha *0,6 kg/ha*	1 L/ac	· Traiter lorsque les mauvaises herbes ont levé avant qu'elles n'atteignent 10 cm (consulter l'étiquette pour connaître la hauteur selon la mauvaise herbe) et lorsque le soya est au stade 1–3 feuilles trifoliées. · **NE PAS** traiter avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya. · Un bon recouvrement des mauvaises herbes est important pour une lutte efficace. · Des taches peuvent apparaître sur les feuilles de soya. Elles peuvent aussi brunir ou brûler. La feuille trifoliée émergeant au moment du traitement peut être déformée. Le soya résiste normalement à ces conditions et continue de croître au rythme normal sans qu'il y ait de répercussions sur sa vigueur, sur sa maturation ni sur le rendement de la récolte. · **NE PAS** employer le BLAZER sur du soya ayant subi un stress (voir l'étiquette du produit). · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant si le BLAZER est employé seul à raison de 2,5 L/ha.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BLAZER (240 g/L) plus ASSIST *acifluorfène* *plus concentré d'huile*	1,25 L/ha 5 L/1000 L *0,3 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,5 L/ac 5 L/1000 L	• Pulvériser sur les plants d'amarante réfléchie levés, au plus tard au stade de la 4e feuille et sur la petite herbe à poux au plus tard au stade de la 8e feuille, lorsque le soya est au stade 1–3 feuilles trifoliées. • **NE PAS** traiter avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya. • Un bon recouvrement des mauvaises herbes est important pour une lutte efficace. • Des taches peuvent apparaître sur les feuilles de soya. Elles peuvent aussi brunir ou brûler. La feuille trifoliée émergeant au moment du traitement peut être déformée. Le soya résiste normalement à ces conditions et continue de croître au rythme normal sans qu'il y ait de répercussions sur sa vigueur, sur sa maturation ni sur le rendement de la récolte.
CLASSIC (25 DF) plus surfactant non ionique *chlorimuron-éthyle* *plus surfactant non ionique*	36 g/ha 2 L/1000 L *9 g/ha* *0,2 % v/v*	14 g/ac 2 L/1000 L	• Le stade 1–3 feuilles trifoliées du soya est le meilleur moment pour combattre les dicotylédones. Les traitements peuvent se faire avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya si les espèces de mauvaises herbes ciblées ont atteint le stade foliaire maximal pour leur maîtrise. • **NE PAS** traiter avant que la 1re feuille trifoliée soit entièrement déployée ou passé la mise à fleurs. • Il est recommandé d'ajouter du NAU 28 % pour une meilleure maîtrise de l'abutilon. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4-4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
FIRSTRATE (84 WG) plus surfactant non ionique plus engrais liquide (28-0-0 ou 32-0-0) *cloransulame-méthyle* *plus surfactant non ionique* *plus engrais liquide*	20,8 g/ha 2,5 L/1000 L 25 L/1000 L *17,5 g/ha* *0,25 % v/v* *2,5 % v/v*	8,5 g/ac 2,5 L/1000 L 25 L/1000 L	• Appliquer jusqu'au stade 8 feuilles de la petite herbe à poux et de la lampourde glouteron, 6 feuilles de la grande herbe à poux, et 4 feuilles de l'abutilon. • Appliquer en tout temps avant la floraison du soya. • Un traitement avant que la 1re feuille trifoliée ne soit pleinement déployée peut causer un jaunissement temporaire du soya.
PINNACLE (75 DF) plus surfactant non ionique *thifensulfuron-méthyl* *plus surfactant*	5,5–8 g/ha 1 L/1000 L *4,1–6 g/ha* *0,1 % v/v*	2,2–3,2 g/ac 1 L/1000 L	• Appliquer sur les mauvaises herbes levées ayant jusqu'à 10 cm de hauteur lorsque la 1re feuille trifoliée du soya est complètement déployée. Les traitements peuvent se faire avant le stade de la 1re feuille trifoliée si les espèces de mauvaises herbes ciblées ont atteint le stade foliaire maximal pour leur maîtrise. • **NE PAS** traiter lorsque le soya a ébauché sa tige florale. • Contre le chénopode blanc et l'abutilon, utiliser la dose supérieure. • Pour renforcer la lutte contre l'abutilon, ajouter du NAU (28-0-0) à raison de 4 % v./v. dans la bouillie.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
REFLEX (240 g/L) plus TURBOCHARGE *fomésafène* *plus huile minérale/surfactant*	1 L/ha 5 L/1000 L *0,24 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,4 L/ac 5 L/1000 L	· Appliquer peu après la levée au stade 1–2 feuilles trifoliées de la culture lorsque les mauvaises herbes sont petites et en croissance active (stade 2–4 feuilles). · Utiliser 200–350 L d'eau/ha (80–140 L/ac). Utiliser davantage d'eau et de pression si l'infestation est forte ou si le feuillage est dense. · Les feuilles de soya peuvent prendre une coloration bronze, mais le soya résiste normalement à ces conditions sans qu'il y ait de répercussions sur sa maturation ni sur le rendement de la récolte. · **NE PAS** traiter un champ au REFLEX plus d'une fois tous les 2 ans. · **NE PAS** appliquer sur du soya soumis à un stress. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
PURSUIT (240 g/L) plus surfactant non ionique plus engrais liquide 28-0-0, 10-34-0 ou 32-0-0 *imazéthapyr* *plus surfactant non ionique* *plus engrais liquide*	0,312–0,42 L/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *0,075–0,1 kg/ha* *0,25 % v/v* *2 L/ha*	0,125–0,168 L/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	· Appliquer au plus tard lorsque les mauvaises herbes sont au stade 2 feuilles vraies. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67. · Utiliser seulement une fois par saison de croissance.
CLEAN SWEEP[1] (PURSUIT [240 g/L] + BASAGRAN FORTÉ [480 g/L]) plus engrais liquide 28-0-0, 10-34-0 ou 32-0-0 *imazéthapyr/ bentazone* *plus engrais liquide*	 0,312 + 1,75 L/ha 2 L/ha *0,075 + 0,84 kg/ha* *2 L/ha*	 0,125 + 0,7 L/ac 0,8 L/ac	· Vendu en emballage combiné renfermant PURSUIT et BASAGRAN FORTÉ. · Appliquer en POST sur des mauvaises herbes en croissance active, aux stades 2–6 feuilles. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
Choix de mélanges en cuve de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus PINNACLE (75 DF) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus thifensulfuron-méthyl* *plus bentazone* *plus concentré d'huile*	0,63 L/ha 5,5–8 g/ha 1,75–2,25 L/ha 5 L/1000 L *0,06 kg/ha* *4,1–6 g/ha* *0,84–1,08 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,25 L/ac 2,2–3,2 g/ac 0,7–0,9 L/ac 5 L/1000 L	· Appliquer sur le soya au stade 1–4 feuilles trifoliées. Les traitements peuvent se faire avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya si les espèces de mauvaises herbes ciblées ont atteint le stade foliaire maximal pour leur maîtrise. · **NE PAS** traiter lorsque le soya a ébauché sa tige florale. · Si les stades foliaires des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, une application séquentielle des herbicides contre les graminées et dicotylédones s'impose pour des résultats satisfaisants.

[1] Indique que l'herbicide est offert en emballage combiné sous ce nom commercial.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ASSURE II (96 g/L) plus PINNACLE (75 DF) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus thifensulfuron-méthyl* *plus concentré d'huile*	0,5 L/ha 5,5–8 g/ha 5 L/1000 L *0,048 kg/ha* *4,1–6 g/ha* *0,5 % v/v*	0,2 L/ac 2,2–3,2 g/ac 5 L/1000 L	· Appliquer sur le soya au stade 1–3 feuilles trifoliées. Les traitements peuvent se faire avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya si les espèces de mauvaises herbes ciblées ont atteint le stade foliaire maximal pour leur maîtrise. · **NE PAS** appliquer sur le soya ayant amorcé sa floraison. · Si les stades foliaires des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, une application séquentielle des herbicides contre les graminées et dicotylédones s'impose pour des résultats satisfaisants. · Un mélange en cuve peut donner de moins bons résultats contre l'abutilon. · Pour un maximum de résultats, faire des applications distinctes de PINNACLE et de ASSURE.
ASSURE II (96 g/L) plus CLASSIC (25 DF) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus chlorimuron-éthyl* *plus concentré d'huile*	0,38–0,63 L/ha 36 g/ha 5 L/1000 L *0,036–0,060 kg/ha* *9,0 g/ha* *0,5–1,0 %*	0,15–0,255 L/ac 14 g/ac 5 L/1000 L	· Appliquer sur le soya au stade 1–3 feuilles trifoliées. Les traitements peuvent se faire avant le stade de la 1re feuille trifoliée du soya si les espèces de mauvaises herbes ciblées ont atteint le stade foliaire maximal pour leur maîtrise. · **NE PAS** traiter lorsque le soya a ébauché sa tige florale. · Si les stades foliaires des graminées et des dicotylédones ne coïncident pas, une application séquentielle des herbicides contre les graminées et dicotylédones s'impose pour des résultats satisfaisants. · Contre la sétaire glauque ou le chiendent commun, employer une dose d'ASSURE II de 0,63 L/ha.
BLAZER (240 g/L) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *acifluorfène* *plus bentazone*	1,25 L/ha 1,25 L/ha *0,3 kg/ha* *0,6 kg/ha*	0,5 L/ac 0,5 L/ac	· Faire ce traitement lorsque la petite herbe à poux ou l'amarante réfléchie est la mauvaise herbe dominante.
BLAZER (240 g/L) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *acifluorfène* *plus bentazone*	0,63 L/ha 1,75 L/ha *0,15 kg/ha* *0,84 kg/ha*	0,25 L/ac 0,7 L/ac	· Faire ce traitement lorsque le chénopode blanc est la mauvaise herbe dominante.
EXCEL SUPER (80,5 g/L) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl* *plus bentazone*	0,67 L/ha 1,75–2,25 L/ha *0,054 kg/ha* *0,84–1,08 kg/ha*	0,27 L/ac 0,7–0,9 L/ac	· Si le stade des dicotylédones et des graminées annuelles ne permet pas de faire un mélange en cuve, faire un traitement fractionné au stade indiqué pour chaque produit.
EXCEL SUPER (80,5 g/L) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) plus PINNACLE (75 DF) *fénoxaprop-p-éthyl* *plus bentazone* *plus thifensulfuron-méthyl*	0,67 L/ha 1,75–2,25 L/ha 5,5–8 g/ha *0,054 kg/ha* *0,84–1,08 kg/ha* *4,1–6 g/ha*	0,27 L/ac 0,7–0,9 L/ac 2,2–3,2 g/ac	· Si le stade des dicotylédones et des graminées annuelles ne permet pas de faire un mélange en cuve, faire un traitement fractionné au stade indiqué pour chaque produit.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
EXCEL SUPER (80,5 g/L) plus PINNACLE (75 DF) *fénoxaprop-p-éthyl* *plus thifensulfuron-méthyl*	0,67 L/ha 5,5–8 g/ha *0,054 kg/ha* *4,1–6 g/ha*	0,27 L/ac 2,2–3,2 g/ac	· Si le stade des dicotylédones et des graminées annuelles ne permet pas de faire un mélange en cuve, faire un traitement fractionné au stade indiqué pour chaque produit.
PINNACLE (75 DF) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *thifensulfuron-méthyl* *plus bentazone*	5,5–8 g/ha 1,75–2,25 L/ha *4,1–6 g/ha* *0,84–1,08 kg/ha*	2,2–3,2 g/ac 0,7–0,9 L/ac	· Traiter lorsque les mauvaises herbes ont levé et que la 1re feuille trifoliée du soya est complètement déployée. · **NE PAS** traiter lorsque le soya a ébauché sa tige florale. · Contre le chardon des champs, le souchet comestible et le liseron des champs, il peut être nécessaire de faire un deuxième traitement.
REFLEX (240 g/L) plus PINNACLE (75DF) plus AGRAL 90 *fomésafène* *plus thifensulfuron-méthyl* *plus surfactant non ionique*	1 L/ha 8 g/ha 2.5 L/1000 L *0,24 kg/ha* *6 g/ha* *0,25 % v/v*	0,4 L/ac 3,2 g/ac 2.5 L/1000 L	· Appliquer peu après la levée aux stades 2–4 feuilles des mauvaises herbes et 1–2 feuilles trifoliées de la culture.
REFLEX (240 g/L) plus VENTURE L (125 g/L) plus TURBOCHARGE *fomésafène* *plus fluazifop-p-butyl* *plus surfactant*	1 L/ha 0,6–2,0 L/ha 5 L/1000 L *0,24 kg/ha* *6 g/ha* *0,5 % v/v*	0,4 L/ac 0,243–0,8 L/ac 5 L/1000 L	· Appliquer peu après la levée aux stades 2–4 feuilles des mauvaises herbes et 1–2 feuilles trifoliées de la culture. · Appliquer dans 200 L d'eau/ha (80 L/ac).
PURSUIT (240 g/L) plus FIRSTRATE (84 WG) plus surfactant non ionique plus engrais liquide (28-0-0 ou 32-0-0) *imazéthapyr* *plus cloransulame-méthyl* *plus surfactant non ionique* *plus engrais liquide*	0.312 L/ha 20,8 g/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *75 g/ha* *17,5 g/ha* *0,25 % v/v* *2 L/ha*	0,125 L/ac 8,5 g/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	· Appliquer jusqu'au stade 2 feuilles vraies des mauvaises herbes. · Maîtrise les graminées annuelles, le chénopode blanc et l'amarante réfléchie.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PURSUIT (240 g/L) plus REFLEX (240 g/L) plus AGRAL 90 plus engrais liquide *imazéthapyr* *plus fomésafène* *plus surfactant non ionique* *plus engrais liquide*	0,312 L/ha 0,8–1 L/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *0,075 kg/ha* *0,19–0,24 kg/ha* *0,25 % v/v* *2 L/ha*	0,125 L/ac 0,32–0,4 L/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	• Contre l'herbe à poux seulement, utiliser la dose inférieure de REFLEX. • Contre le chénopode blanc, utiliser la dose supérieure de REFLEX.
VENTURE L (125 g/L) plus BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *fluazifop-p-butyl* *plus bentazone* *plus concentré d'huile*	1–2 L/ha 1,75–2,25 L/ha 5 L/1000 L *0,125–0,25 kg/ha* *0,84–1,08 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,4–0,8 L/ac 0,7–0,9 L/ac 5 L/1000 L	• Appliquer entre le stade de la feuille uniforliée et le stade de la 3e feuille trifoliée du soya quand les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. • Utilier la dose de 0,8 L de VENTURE L/ac pour combattre la muhlenbergie feuillée. • Le soya peut souffrir temporairement du traitement lorsqu'il fait anormalement chaud et humide.
Traitements localisés — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour une liste des traitements possibles.			
Traitement par humectation avec applicateur à corde ou à rouleau — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour une liste des traitements possibles.			
Avant la récolte			
AIM EC (240 g/L) plus surfactant non ionique **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *MERGE*	0,073–0,117 L/ha 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L *0,0175–0,028 kg/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	30–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L	• Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. • Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes et de la culture pour assurer l'efficacité du traitement. • Respecter un délai d'attente de 3 jours avant la récolte.
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90 *diquat* *plus surfactant*	1,25–2,3 L/ha 1 L/1000 L *0,30–0,55 kg/ha* *0,1 % v/v*	0,5–0,92 L/ac 1 L/1000 L	• Appliquer dans 225 L d'eau/ha pour brûler les mauvaises herbes au moment où le pourcentage de défoliation naturelle de la culture atteint 80 % et où 80 % des gousses ont jauni. • Éviter les repousses en effectuant la pulvérisation dans les 7 jours de la date de maturité du cultivar, puis récolter 5–7 jours après le traitement. • Pour les applications terrestres, utiliser 1,25–1,7 L/ha (0,5–0,68 L/ac). • Pour les applications par aéronef, utiliser 1,7–2,3 L/ha (0,68–0,92 L/ac).
glyphosate* *glyphosate*	**Voir tableau 11–5** *0,9 kg/ha*	**Voir tableau 11–5**	• Appliquer dans 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) quand la teneur en eau de la culture est de 30 % ou moins. • **NE PAS** appliquer sur les cultures de semence. • Traiter au moins 7 jours avant la récolte lorsque les tissus des siliques sont secs et bruns et que 80–90 % des feuilles sont tombées.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les formulations. L'étiquette donne des renseignements sur les homologations et les doses.

SOYA « ROUNDUP READY » (TOLÉRANT LE GLYPHOSATE)

Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le soya tolérant le glyphosate

Au cours des essais menés à l'Université de Guelph, lorsque la concurrence exercée par les mauvaises herbes est forte, deux applications de glyphosate dans le soya tolérant ce produit ont permis sur 5 ans de maximiser les rendements et les produits d'exploitation en de multiples endroits en Ontario.

Moment des applications de glyphosate	Maîtrise apparente des m. h. (%)	Rendement (%)
Application en présemis suivie d'une application en postlevée au stade 1–3 feuilles trifoliées	96	100
Application au stade unifolié suivie d'une application en postlevée au stade 1–3 feuilles trifoliées	96	98
Application en postlevée au stade 1–3 feuilles trifoliées (sans destruction chimique des m. h. en présemis)	93	83

Source : Swanton et Deen, 1999, Université de Guelph.

TABLEAU 11–3. Évaluation des herbicides pour le soya tolérant le glyphosage

	Graminées								Dicotylédones annuelles											Vivaces							
Nom commercial	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	Tolérance de la culture
Destruction chimique en présemis																											
GARDIEN[1,2] *(m. h. levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	B[2]
Action rémanente	7	7	6	6[R]	6[R]	6	6	7	8	8	8	8	7[R]	9	2	7[R]	7	7	7	5	3	8	8	5	5	5	
glyphosate[2] + VALTERA *(m. h. levées)*	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	B[2]
Action rémanente	3	3	3	5	**5**	5	3	-	-	4	8	7	**9**	-	**9**	**9**	**7**	3	7	-	-	-	-	-	-	-	
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée uniquement pour cultivars « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)																											
glyphosate[2] *(m. h. levées)*	9	9	9	9	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	E[2]

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[2] N'utiliser que sur la semence de soya certifiée désignée « Roundup Ready ». Voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour une liste complète des produits homologués.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–3. Évaluation des herbicides pour le soya tolérant le glyphosage (suite)

Nom commercial	Graminées								Dicotylédones annuelles											Vivaces							Tolérance de la culture
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Mélanges en cuve de postlevée à action rémanente uniquement pour les cultivars de soya « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)																											
GARDIEN[1,2] *(m. h. levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	B[2]
Action rémanente	7	7	6	6[R]	6[R]	6	6	7	8	8	8	8	7[R]	9	2	7[R]	7	7	7	5	3	8	8	5	5	5	
glyphosate[2] + FIRSTRATE	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	E[2]
Action rémanente	0	0	0	0	0	0	0	0	7	**9**[R]	**9**	-	2	9	2	2	**9**[R]	**9**	**9**	-	2	-	-	2	7	7	
glyphosate[2] + PURSUIT	9	9	**9**	**9**	**9**	**9**	9	**9**	**8**	**9**	8	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7/8	5	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	E[2]
Action rémanente	-	-	**8**	-	-	-	-	**8**	-	-	-	-	**8**[R]	-	**9**	**9**[R]	-	-	**8**	0	0	0	-	0	0	0	

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[2] N'utiliser que sur la semence de soya certifiée désignée « Roundup Ready ». Voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour une liste complète des produits homologués.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–4. Efficacité contre d'autres mauvaises herbes des herbicides pour le soya « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)

Nom commercial	Graminées		Dicotylédones annuelles et bisannuelles											Vivaces		
	Cenchrus	repousse de maïs	bident penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit[3]	morelle de la Caroline	muhlenbergie feuillée
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																
glyphosate	9	9[2]	8	**8**	**8**	9	**8**	7/8	8	**9**	8*	-	-	**8***	**8***	**8**
GARDIEN[1,2] (glyphosate + CLASSIC)	9	9[2]	8	**8**	**8**	9	**8**	7/8	8	**9**	8*	-	-	**8**	**8***	**8**

* De plus fortes doses de glyphosate (c.-à-d. de 1,35 à 1,8 kg/ha) sont nécessaires pour maîtriser ces vivaces.
- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.
[1] Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.
[2] Ce traitement est sans effet contre le maïs spontané « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate).
[3] Pour obtenir ce degré d'efficacité, les pissenlits doivent avoir moins de 15 cm de diamètre.
Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 11–5. Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destiné au soya tolérant le glyphosate

	DOSE DE MATIÈRE ACTIVE :			ASSURE II	EXCEL SUPER	POAST ULTRA	SELECT	VENTURE L	BLAZER	CLASSIC	FIRSTRATE	PINNACLE	PURSUIT	REFLEX
	0,9 kg/ha	1,35 kg/ha	1,8 kg/ha											
	DOSE DE PRODUIT :													
CREDIT PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓						✓			✓	
CREDIT 45 (450 g/L)	0,8 L/ac	1,2 L/ac	1,6 L/ac							✓				
FACTOR 540 (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac	✓						✓			✓	
GLYFOS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓						✓			✓	
ROUNDUP ULTRA2 (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac	✓				✓		✓			✓	
ROUNDUP WEATHERMAX (540 g/L)	0,67 L/ac	1 L/ac	1,34 L/ac	✓				✓		✓	✓		✓	
SHARPSHOOTER PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac	✓						✓			✓	
TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L)	0,72 L/ac	1,1 L/ac	1,44 L/ac							✓			✓	
VANTAGE PLUS (360 g/L)	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac							✓	✓			
VANTAGE PLUS MAX (480 g/L)	0,75 L/ac	1,13 L/ac	1,5 L/ac	✓						✓			✓	
WISEUP	1 L/ac	1,5 L/ac	2 L/ac							✓				

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Destruction chimique en présemis — Voir également le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85.			
• Des herbicides non sélectifs tels que le glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide à action rémanente avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. • Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE à utiliser en présemis. • Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel que SENCOR, LOROX L) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
CLEANSTART PLUS[1] CREDIT PLUS (360 g/L) + AIM EC (240 g/L) *glyphosate +* *carfentrazone-éthyle*	2,5 L/ha + 73 mL/ha *0,9 kg/ha +* *0,0175 kg/ha*	1,0 L/ac + 30 mL/ac	• Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. • Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes pour assurer l'efficacité du traitement. • Seules les mauvaises herbes levées au moment du traitement seront détruites. • CLEANSTART PLUS[1] ne procure aucune action rémanente. • CLEANSTART PLUS[1] est un emballage combiné de CREDIT PLUS et d'AIM EC.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en obtenir une liste complète ainsi que pour la liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GARDIEN[1] TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L) + CLASSIC (25 DF) *glyphosate +* *chlorimuron-éthyle*	1,8 L/ha + 36 g/ha *0,9 kg/ha +* *9 g/ha*	0,72 L/ac + 14 g/ac	• Utiliser pour la destruction chimique en présemis. • Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette de CLASSIC et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67. • GARDIEN est un emballage combiné de TOUCHDOWN TOTAL + CLASSIC. • D'autres produits à base de glyphosate peuvent être mélangés en cuve avec CLASSIC; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en avoir une liste complète. • **NE PAS** appliquer CLASSIC plus d'une fois par saison de croissance.
glyphosate plus VALTERA (51,1 %) *glyphosate +* *flumioxazine*	**Voir tableau 11–5** 114 g/ha *0,9 kg/ha +* *71,4 g/ha*	**Voir tableau 11–5** 56 g/ac	• Appliquer sur des sols de texture allant de grossière à moyenne. • Appliquer avant les semis du soya ou dans les 3 jours suivant le semis mais avant la levée du soya. • Toute application effectuée après que les jeunes pousses de soya ont commencé à fendiller le sol ou à lever endommagera gravement la culture. • **NE PAS** appliquer à moins de 100 mètres de poiriers qui ne sont pas en dormance. • **NE PAS** mélanger en cuve avec DUAL II MAGNUM, BOUNDARY ni FRONTIER MAX. • Toute opération de travail du sol effectuée après l'application réduira l'efficacité du traitement. • Appliquer une seule fois par saison de croissance.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée et mélanges en cuve d'herbicides de postlevée — uniquement pour cultivars « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)			
glyphosate* *glyphosate*	**Voir tableau 11–5** *0,9 kg/ha*	**Voir tableau 11–5**	• Utiliser UNIQUEMENT avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ». • Appliquer entre le stade de la 1re feuille trifoliée et le stade de la pleine floraison du soya. • La maîtrise des mauvaises herbes est plus facile et la concurrence exercée par elles évitée lorsque les applications sont faites au moment où les mauvaises herbes sont petites. Les mauvaises herbes allant jusqu'à 25 cm de haut seront toutefois maîtrisées. • Un deuxième traitement peut être fait pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèveront par la suite. • Utiliser 100–200 L d'eau/ ha (40–80 L/ ac).
glyphosate* *glyphosate*	**Voir tableau 11–5** *1,8 kg/ha*	**Voir tableau 11–5**	• Utiliser UNIQUEMENT avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ». • Pour une efficacité optimale, appliquer lorsque l'asclépiade, le laiteron des champs et le chardon des champs sont hauts de 15–60 cm et le souchet, de 5–15 cm et que ces mauvaises herbes sont en croissance active.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en obtenir une liste complète ainsi que pour la liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	· Utiliser UNIQUEMENT avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ».
plus ASSURE II (96 g/L)	0,25 L/ha	0,1 L/ac	· Ajouter ASSURE II pour maîtriser la repousse spontanée de maïs « Roundup Ready ».
glyphosate	*0,9-1,8 kg/ha*		· Appliquer sur le maïs spontané ayant jusqu'à 30 cm (12 po) de haut.
plus quizalofop-p-éthyl	*0,024 kg/ha*		· **NE PAS** appliquer sur le soya à moins de 80 jours de la récolte.
			· L'ajout de SUREMIX à ce mélange en cuve est facultatif. Si l'on ajoute SUREMIX, le faire à une dose de 5 L/1000 L d'eau.
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	· Utiliser UNIQUEMENT avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ».
plus FIRSTRATE (84 WG)	20,8 g/ha	8,5 g/ac	· L'ajout de FIRSTRATE procure une action rémanente contre la petite herbe à poux, l'abutilon, la lampourde glouteron, la stramoine commune et la grande herbe à poux.
glyphosate	*0,45-0,9 kg/ha*		· **NE PAS** appliquer sur le soya à moins de 65 jours de la récolte.
plus cloransulame-méthyl	*17,5 g/ha*		
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	· Utiliser UNIQUEMENT avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ».
plus VENTURE (125 g/L)	0,6 L/ha	0,243 L/ac	· Ajouter VENTURE pour maîtriser la repousse spontanée de maïs « Roundup Ready ».
glyphosate	*0,9-1,8 kg/ha*		· Appliquer sur le maïs spontané au stade 2–5 feuilles.
plus fluazifop-p-butyl	*0,075 kg/ha*		
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	· Utiliser uniquement avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ».
plus PURSUIT (240 g/L)	0,16–0,21 L/ha	0,065–0,085 L/ac	· Appliquer jusqu'au stade de la 3e feuille trifoliée du soya.
glyphosate	*0,9-1,8 kg/ha*		· Utiliser seulement une fois par saison de croissance.
plus imazéthapyr	*0,038–0,05 kg/ha*		· Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette de PURSUIT et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
GARDIEN[1]			· Utiliser uniquement avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ».
TOUCHDOWN TOTAL (500 g/L) +	1,8 L/ha +	0,72 L/ac +	· Appliquer jusqu'au stade de la 3e feuille trifoliée du soya.
CLASSIC (25 DF)	36 g/ha	14 g/ac	· Utiliser seulement une fois par saison de croissance.
glyphosate	*0,9 kg/ha*		· D'autres produits à base de glyphosate peuvent être mélangés en cuve avec CLASSIC; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en avoir une liste complète.
plus chlorimuron-éthyl	*9 g/ha*		· Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation; voir l'étiquette de CLASSIC et le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en obtenir une liste complète ainsi que pour la liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée et mélanges en cuve d'herbicides de postlevée — uniquement pour cultivars « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)			
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	• Utiliser uniquement avec de la semence de soya sélectionnée (certifiée) « Roundup Ready ». • Des applications séquentielles sont souhaitables en présence de mauvaises herbes dont la levée s'étend sur une longue période (comme c'est le cas du laiteron des champs et du chardon des champs). • Pour un maximum de résultats, faire le second traitement 14 jours après le premier. • Pour une efficacité optimale, appliquer lorsque l'asclépiade, le laiteron des champs et le chardon des champs sont hauts de 15–60 cm et le souchet, de 5–15 cm et que ces mauvaises herbes sont en croissance active.
glyphosate	*0,9 + 0,9 kg/ha*		
Avant la récolte			
glyphosate*	**Voir tableau 11–5**	**Voir tableau 11–5**	• Appliquer dans 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) quand la teneur en eau de la culture est de 30 % ou moins. • **NE PAS** appliquer sur des cultures de semence. • Traiter au moins 7 jours avant la récolte lorsque les tissus des siliques sont secs et bruns et que 80–90 % des feuilles initiales sont tombées.
glyphosate	*0,9 kg/ha*		

[1] Indique que le produit est vendu en emballage combiné.

* Il existe de nombreux produits; voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour en obtenir une liste complète ainsi que pour la liste des produits pouvant être ajoutés aux mélanges en cuve.

SOYA « LIBERTY LINK » (TOLÉRANT LE GLUFOSINATE)

Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le soya tolérant le glufosinate

Les stratégies de lutte contre les mauvaises herbes dans le soya tolérant le glufosinate sont semblables à celles qui sont décrites sous *Soya « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)*, p. 203.

TABLEAU 11–6. Évaluation des herbicides pour le soya « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)

Nom commercial	Graminées								Dicotylédones annuelles												Vivaces							Tolérance de la culture
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs	
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée et mélanges en cuve d'herbicides de postlevée — uniquement pour cultivars « Liberty Link » (tolérant le glufosinate)																												
LIBERTY *(m. h. levées)*	9	9	9	9	9	8/9	**9**	**9**	**8**	**9**	7	**8/9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	8	**8**	**6**	6	-	6	**6/7**	**8**	**7**	E
LIBERTY + BASAGRAN FORTÉ *(m. h. levées)*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8/9**	**9**	**9**	**8**	**9**	7	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**6**	**8**	**6**	6	-	8	**6/7**	**8**	**7**	B
LIBERTY + PURSUIT *(m. h. levées)*	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	7	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	6	**8**	**6**	6	-	7	**6/7**	**8**	**7**	B
Action rémanente	**8**	7	7	**9**[R]	**9**[R]	**9**	**8**	**7**	8	7[R]	2	**9**	**8**[R]	**9**	**9**[R]	**9**[R]	**8**[R]	6	**9**	2	2	2	4	2	2	2	

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

[R] Un traitement par IPS est nécessaire pour obtenir ce degré d'efficacité.

· Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

‡ Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous cette appellation commerciale.

[R] Indique qu'on trouve en Ontario des peuplements résistant à cet herbicide qui, s'ils sont présents, ne seront pas maîtrisés convenablement.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Destruction chimique en présemis — Voir également le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85.			
· Des herbicides non sélectifs tels que le glyphosate et GRAMAXONE sont utilisés pour maîtriser les mauvaises herbes levées avant le semis direct. Un mélange en cuve d'un herbicide à action rémanente avec du glyphosate ou GRAMAXONE peut améliorer l'efficacité du traitement dans un programme de lutte contre les mauvaises herbes en un seul passage. · Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis et en postrécolte*, p. 85, pour connaître les doses de glyphosate et de GRAMAXONE à utiliser en présemis. · Il est également important de remarquer que dans la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, l'ajout d'un herbicide à base de triazines (tel que SENCOR, LOROX L) réduit l'efficacité du glyphosate. L'augmentation de la dose de glyphosate devrait remédier à cet antagonisme.			
Stratégies en un seul passage			
LIBERTY 200 SN (200 g/L) *glufosinate ammonium*	2,5 L/ha *0,5 kg/ha*	1 L/ac	· **Appliquer UNIQUEMENT** sur les cultivars de soya tolérant LIBERTY 200 SN. · LIBERTY 200 SN peut être appliqué entre le stade cotylédon et la floraison du soya. · LIBERTY 200 SN est un herbicide de contact qui n'a pas d'action rémanente. · On peut pulvériser du sulfate d'ammonium à raison de 6 L/ha (2,4 L/ac) (préparation liquide) ou de 3,3 kg/ha (1,3 kg/ac) (préparation sèche) si l'on veut une action plus radicale contre certaines mauvaises herbes en particulier. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *glufosinate ammonium* *plus bentazone*	2,5 L/ha 1,75 L/ha *0,5 kg/ha* *0,84 kg/ha*	1 L/ac 0,7 L/ac	· **Appliquer UNIQUEMENT** sur les cultivars de soya tolérant LIBERTY 200 SN. · Ce mélange en cuve peut être appliqué entre le stade cotylédon et la floraison du soya. · Ce mélange en cuve renferme des herbicides de contact non rémanents. · Les mauvaises herbes ciblées doivent être petites et en croissance active (stade 8 feuilles ou moins).
LIBERTY 200 SN (200 g/L) plus PURSUIT(240 g/L) *glufosinate ammonium* *imazéthapyr*	2,5 L/ha 0,312 L/ha *0,5 kg/ha* *0,075 kg/ha*	1 L/ac 0,125 L/ac	· **Appliquer UNIQUEMENT** sur les cultivars de soya tolérant LIBERTY 200 SN. · Ce mélange en cuve peut être appliqué entre le stade cotylédon et la floraison du soya. · Ajouter PURSUIT pour une action rémanente contre les graminées et dicotylédones indiquées sur l'étiquette. · Les mauvaises herbes ciblées doivent être petites et en croissance active (stade 8 feuilles ou moins).
Stratégies en deux passages			
LIBERTY 200 SN (200 g/L) suivi de LIBERTY 200 SN (200 g/L) *glufosinate ammonium* *glufosinate ammonium*	2.5 L/ha 2 L/ha *0,5 kg/ha* *0,4 kg/ha*	1 L/ac 0.8 L/ac	· **Appliquer UNIQUEMENT** sur les cultivars de soya tolérant LIBERTY 200 SN. · LIBERTY 200 SN peut être appliqué entre le stade cotylédon et la floraison du soya. · **NE PAS** appliquer plus de 4,5 L/ha (1,8 L/ac) par saison de croissance. · Idéalement, faire la première application entre le stade unifolié et le stade de la 2e feuille trifoliée du soya, et la seconde application, entre les stades de la 4e et de la 6e feuilles trifoliées.

TABLEAU 11–7. Stade foliaire maximal des mauvaises herbes[2] pour les applications d'herbicides de postlevée dans le soya

Nom commercial	Plage d'application (stade du soya)[1]	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles											Vivaces		
		échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	maïs spontané	blé spontané	renouée liseron	lampourde glouteron	stramoine commune	renouée persicaire	chénopode blanc	moutarde des champs	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	maîtrise du chiendent	destruction de la partie aérienne du chiendent*	muhlenbergie feuillée
ASSURE II		**2-DT**		**2-DT**	**2-DT**	**2-DT**	**2-DT**	**2-DT**	**2–6**	**2-DT**														
dose en mL/ac		200		200	150	200	200	200	150	150												300	200	
EXCEL SUPER		**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**															
dose en mL/ac		268	268	268	268	268	268	268	268															
POAST ULTRA		**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**	**1–6**														**1–3**	
dose en mL/ac		130–190	130–190	130–190	130–190	130–190	130–190	130–190	130–190														450	
SELECT		**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–6**	**2–4**														
dose en mL/ac		75	75	75	75	75	75	75	75	50												150	75	
VENTURE L		**2–5**	**2-5**	**2-5**	**2–4**	**2–4**	**2-5**	**2–4**	**2–4**	**2-5**												**3–5**	**3–5**	**3–5**
dose en mL/ac		320	400	400	400	400	400	400	240	320												800	400	800
BASAGRAN[2]	uni à 2-tri											**10**	**10**	**10**	**8**	**10**		**4**	**6**	**4**	**6**			
dose en L/ac												0,9**	0,9	0,9**	0,9	0,9**		0,9	0,9	0,9	0,9**			
BLAZER	1 à 3-tri											**4**	**10**	**8**	**2**	**10**	**6**	**4–6**	**8**					
dose en L/ac												1	1	1	1	1	1	0,5-1	0,5-1					
CLASSIC	1 à 3-tri																	**2–8**	**2–6**		**2–4**			
CLEANSWEEP	uni à 2-tri	**6**			**4**	**4**						**6**		**6**	**6**	**6**	**4**	**12**	**6**		**4**			
FIRSTRATE	avant floraison											**4–8**	**2–4**						**4–8**	**4–6**	**2–4**			
dose en g/ac												8,5	8,5						8,5	8,5	8,5			
PINNACLE	1-tri à floraison													**2–8**	**2–6**	**2–8**		**2–8**			**2–4**			
dose en g/ac														2,2	3,2	2,2		2,2			3,2			
PURSUIT		**6**			**4**	**4**	**2**				**2**	**2**				**2**	**2**	**12**	**2**		**8**			

Abréviations des stades foliaires : DT = début du tallage des graminées; c = cotylédon; uni = feuille unifoliée; tri = feuille trifoliée.

* Destruction de la partie aérienne seulement.

** Les doses inférieures s'appliquent aux premiers stades foliaires.

[1] Exprimés en stades foliaires, à moins d'indication différente.

[2] Stade foliaire maximal pour la maîtrise.

[3] Utiliser uniquement sur les cultivars « Liberty Link ».

[4] Utiliser uniquement sur les cultivars « Roundup Ready ». Voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour une liste complète.

TABLEAU 11–7. Stade foliaire maximal des mauvaises herbes[2] pour les applications d'herbicides de postlevée dans le soya (suite)

Nom commercial	Plage d'application (stade du soya)[1]	Graminées annuelles									Dicotylédones annuelles											Vivaces		
		échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	maïs spontané	blé spontané	renouée liseron	lampourde glouteron	stramoine commune	renouée persicaire	chénopode blanc	moutarde des champs	morelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	maîtrise du chiendent	destruction de la partie aérienne du chiendent*	muhlenbergie feuillée
REFLEX	1 à 2-tri											4		4	3*	4	4	4	4		3*			
LIBERTY[3]	jusqu'à floraison	5	5	4	5	4	4	5			4	4		6	6	4	5	6	5		4		4	
glyphosate[4]	jusqu'à floraison	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			4+		

Abréviations des stades foliaires : DT = début du tallage des graminées; c = cotylédon; uni = feuille unifoliée; tri = feuille trifoliée.

* Destruction de la partie aérienne seulement.

**Les doses inférieures s'appliquent aux premiers stades foliaires.

[1] Exprimés en stades foliaires, à moins d'indication différente.

[2] Stade foliaire maximal pour la maîtrise.

[3] Utiliser uniquement sur les cultivars « Liberty Link ».

[4] Utiliser uniquement sur les cultivars « Roundup Ready ». Voir le tableau 11–5, *Produits à base de glyphosate et mélanges en cuve (2 herbicides) de postlevée destinés au soya tolérant le glyphosate*, p. 206, pour une liste complète.

12. AUTRES GRANDES CULTURES

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 12–1. Évaluation des herbicides pour le canola, le lin, le millet, la moutarde, le sorgho et le tournesol

	Cultures					**Graminées annuelles**											**Dicotylédones annuelles**												**Vivaces**						
Nom commercial	**canola**	**lin**	**moutarde**	**sorgho et millet**	**tournesol**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**folle avoine**	**repousse de maïs**	**repousse de blé**	**repousse d'orge**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutarde des champs**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
Anti-graminées radiculaires																																		
EPTAM		✓			✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**8**	-	-	-	**4**	2	0	**7**	**7**	5	**7**	**7**	5	3	5	-	-	-	8	5	-	-
TREFLAN ou BONANZA ou RIVAL	✓		✓		✓	**9**	**9**	9	9	**9**	**9**	9	7	**8**	-	-	-	**5**	2	0	2	**8**	2	2	**8**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anti-graminées de postlevée																																		
ASSURE II	✓	✓				**9**	8	**9**	9	**9**	8	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0
EXCEL SUPER	✓					**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
POAST ULTRA	✓	✓	✓		✓	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0
SELECT	✓	✓			✓	**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0
VENTURE L	✓					**9**	8	**9**	8	**8**	**8**	9	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Liberty Link ».

[2] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Pursuit tolerant ».

[3] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Roundup Ready ». Voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66, pour une liste complète des produits homologués.

TABLEAU 12–1. Évaluation des herbicides pour le canola, le lin, le millet, la moutarde, le sorgho et le tournesol (suite)

Nom commercial	Cultures					Graminées annuelles											Dicotylédones annuelles												Vivaces						
	canola	lin	moutarde	sorgho et millet	tournesol	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaire géante	sétaire verte	sétaire glauque	panic capillaire	panic millet	folle avoine	repousse de maïs	repousse de blé	repousse d'orge	renouée liseron	lampourde glouteron	vergerette du Canada	renouée persicaire	chénopode blanc	moutarde des champs	morelles annuelles	amarantes	petite herbe à poux	grande herbe à poux	abutilon	liseron des champs	prêle	asclépiade	souchet	chiendent commun	laiteron des champs	chardon des champs
Anti-dicotylédones de postlevée																																			
BASAGRAN		✓		✓		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**9**	**5**	**9**	**7**	**9**	7	**7**	**8**	**6**	**9**	**6**	2	2	**8**	0	6	**7**
BUCTRIL M ou BADGE ou LOGIC M ou MEXTROL		✓				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**8**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	6	0	0	0	**7**	**7**
LONTREL	✓					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	-	-	3	5	0	-	5	8	-	-	3	-	-	0	0	**8**	**8**
MCPA		✓				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**7**	-	**2**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	-	**8**	7	7	0	0	0	7	7
MUSTER	✓					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	2	0	-	0	2	**9**	2	**8**	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PARDNER, BROTEX, KORIL				✓		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**8**	-	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	0	0	0	0	7	7
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée — uniquement pour cultivars de canola tolérant les herbicides																																			
glyphosate[3]	✓[3]					**9**	9	9	9	**9**	9	9	9	9	9	**9**	**9**	**8**	9	**9**	**8**	**9**	**9**	9	**9**	9	8	9	7/8	5	**8**	6	**9**	**8**	**9**
LIBERTY1	✓[1]					**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	**8**	-	-	-	**8**	**9**	7	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**8**	**6**	6	-	6	**6**	**8**	**7**
PURSUIT[2]	✓[2]					**8**	7	7	9	**9**	**9**	8	7	8	-	-	-	8	7	2	9	**9**	9	**9**	**9**	**8**	6	**9**	2	2	2	4	5	2	2
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée																																			
POAST ULTRA + BUCTRIL M ou BADGE ou LOGIC M ou MEXTROL		✓				**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**9**	**8**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	7	-	-	6	7	7
POAST ULTRA + LONTREL	✓					**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**8**	-	-	3	5	0	-	5	8	-	-	3	-	-	0	**6**	**8**	**8**
POAST ULTRA + MCPA*		✓				**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	2	**7**	-	**2**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	-	**8**	7	8	0	0	**6**	7	7
POAST ULTRA + MUSTER	✓					**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	2	0	-	0	2	**9**	2	**8**	2	-	0	0	0	0	0	**6**	0	0
SELECT + BUCTRIL M ou BADGE ou LOGIC M ou MEXTROL		✓				**9**	**8**	**9**	9	**9**	**9**	**9**	**9**	-	-	-	-	**9**	**8**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	7	7	-	-	**7**	**7**	**7**

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Liberty Link ».

[2] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Pursuit tolerant ».

[3] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Roundup Ready ». Voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66, pour une liste complète des produits homologués.

TABLEAU 12–1. Évaluation des herbicides pour le canola, le lin, le millet, la moutarde, le sorgho et le tournesol (suite)

	Cultures					Graminées annuelles											Dicotylédones annuelles												Vivaces						
Nom commercial	**canola**	**lin**	**moutarde**	**sorgho et millet**	**tournesol**	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaire géante**	**sétaire verte**	**sétaire glauque**	**panic capillaire**	**panic millet**	**folle avoine**	**repousse de maïs**	**repousse de blé**	**repousse d'orge**	**renouée liseron**	**lampourde glouteron**	**vergerette du Canada**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutarde des champs**	**morelles annuelles**	**amarantes**	**petite herbe à poux**	**grande herbe à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
VENTURE + LONTREL	✓					**9**	8	**9**	8	**8**	**8**	9	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	-	-	3	5	0	-	5	8	-	-	3	-	-	0	**9**	**8**	**8**
VENTURE + MUSTER	✓					**9**	8	**9**	8	**8**	**8**	9	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	2	0	-	0	2	**9**	2	**8**	2	-	0	0	0	0	0	**9**	0	0

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

✓Peut être utilisé sur cette culture.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[1] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Liberty Link ».

[2] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Pursuit tolerant ».

[3] N'utiliser que sur des cultures parties avec de la semence de canola certifiée, désignée canola « Roundup Ready ». Voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66, pour une liste complète des produits homologués.

Moments des traitements herbicides :

- **Présemis (PP) —** Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits, les doses et des remarques.

- **Incorporation en présemis (IPS) —** Sauf indication contraire, enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

- **Prélevée (PRÉ) —** De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas.

- **Postlevée (POST) —** Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
ARACHIDES			
Présemis (PP) — Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits, les doses et des remarques.			
Arachides — anti-graminée de prélevée			
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide*	756–860 mL/ha *544–619 g/ha*	302–344 mL/ac	· Appliquer par IPS. · Enfouir les graines d'arachide à au moins 4 cm de profondeur, sans quoi la culture pourrait être endommagée. · **Attendre** 80 jours avant la récolte.
Arachides — anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	2,25 L/ha 2 L/ha *1,08 kg/ha* *2 L/ha*	0,9 L/ac 0,8 L/ac	· Traiter quand les arachides sont entre le stade unifolié et le stade 4 feuilles trifoliées et que les mauvaises herbes sont petites et en pleine croissance. · De nombreuses dicotylédones annuelles, y compris l'abutilon (15 cm/jusqu'à 6 feuilles), la renouée (20 cm/jusqu'à 10 feuilles) et la lampourde glouteron (30 cm/jusqu'à 10 feuilles) sont détruites. · La partie aérienne du souchet et du chardon est détruite et parfois celle du liseron, mais deux traitements au BASAGRAN à raison de 1,75 L/ha (0,7 L/ac), à 10 jours d'intervalle, peuvent être nécessaires. · Une 2e levée de mauvaises herbes peut survenir après la destruction de la 1re. · Par temps anormalement froid ou chaud et humide, les plants d'arachides peuvent souffrir temporairement du traitement. Réduire alors la dose de concentré d'huile à 1 L/ha (0,4 L/ac). Une période de temps frais ou sec peut retarder l'action de l'herbicide ou en réduire l'efficacité.
CANOLA SEMÉ À L'AUTOMNE ET AU PRINTEMPS			
Canola — anti-graminées radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,147 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,4–0,76 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. · Fortement absorbé par les particules de sol; lessivage négligeable.
Canola — anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus concentré d'huile*	0,375–0,75 L/ha 5 L/1000 L *0,036–0,072 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	· Traiter les repousses de céréales et les graminées annuelles entre le stade 2 feuilles et le tallage, et le chiendent commun au stade 2–6 feuilles. · Le canola est tolérant à tous les stades de croissance. · **Attendre** 64 jours avant de récolter le canola.
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· Appliquer sur les graminées annuelles au stade 1–6 feuilles. · Le canola est tolérant à tous les stades de croissance. · Ce traitement ne maîtrise pas les repousses de blé d'automne.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer au stade 1–6 feuilles des graminées annuelles. • Le canola est tolérant à tous les stades de croissance.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Une préparation minutieuse du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. • Traiter lorsque le chiendent commun est au stade 1–3 feuilles.
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus surfactant*	0,13–0,19 L/ha 5 L/1000 L *0,03–0,045 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,05–0,08 L/ac 5 L/1000 L	• Le canola est tolérant à tous les stades de croissance. • Pulvériser quand les mauvaises herbes annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2–6 feuilles. • La dose supérieure détruit la partie aérienne du chiendent commun.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,8 L/ha *0,100 kg/ha*	0,32 L/ac	• Contre les céréales spontanées. • Appliquer au stade 2–5 feuilles des céréales spontanées.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	1,0–1,4 L/ha *0,125–0,175 kg/ha*	0,4–0,57 L/ac	• Appliquer quand les graminées annuelles sont au stade 2–5 feuilles et que le chiendent commun est au stade 3–5 feuilles. • Utiliser la dose de 1,4 L/ha (0,57 L/ac) contre un peuplement mixte de graminées annuelles et de chiendent commun. • **NE PAS** appliquer VENTURE L sur le canola passé le stade 5 feuilles de la culture.
Canola — anti-dicotylédones de postlevée			
LONTREL 360 (360 g/L) *clopyralide*	0,42–0,56 L/ha *0,15–0,2 kg/ha*	0,17–0,22 L/ac	• Recommandé **uniquement** sur les cultivars Cyclone, Ebony, Jewel, 46A65 et Hyola 401. • Faire une application de postlevée par saison au stade 2–6 feuilles du canola. • Appliquer sur le chardon des champs entre le stade rosette à pré-bouton.
MUSTER (75 DF) plus AGRAL 90 *éthametsulfuron-méthyl* *plus surfactant*	15 g/ha 2 L/1000 L *11 g/ha* *0,2 % v/v*	6 g/ac 2 L/1000 L	• **NE PAS** appliquer MUSTER sur les cultivars polonais de canola, sous peine d'endommager la culture. • Traiter lorsque la moutarde des champs est entre le stade cotylédon et le stade 6 feuilles, avant que le canola ne forme sa tige florale. • **NE PAS** appliquer sur du canola semé l'automne. • **NE semer AUCUNE** autre culture que le blé d'automne dans l'année du traitement. • **NE PAS** servir la culture traitée aux animaux ni la donner en pâture aux animaux dans les 60 jours qui suivent le traitement.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Canola — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus LONTREL 360 (360 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus clopyralide* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 0,42–0,56 L/ha 0,75–1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *0,15–0,2 kg/ha* *0,75–1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,17–0,22 L/ac 0,3–0,4 L/ac	• Traiter lorsque le canola est au stade 2–6 feuilles. • Utiliser LONTREL **uniquement** sur les cultivars suivants : Cyclone, Ebony, Jewel, 46A65 et Hyola 401. • Verser la moitié de la quantité d'eau dans le réservoir, ajouter la quantité voulue de POAST ULTRA, puis ajouter la quantité nécessaire de LONTREL. Ajouter MERGE en dernier avec la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MUSTER (75 DF) plus MERGE *séthoxydime* *plus éthametsulfuron-méthyl* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 15 g/ha 0,75–1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *11 g/ha* *0,75–1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 6 g/ac 0,3–0,4 L/ac	• **NE PAS** appliquer sur du canola semé l'automne. • Traiter quand le canola est entre le stade 2 feuilles et la montaison. • Mettre MUSTER dans la cuve en premier et agiter. Une fois que MUSTER est en suspension, ajouter la quantité nécessaire de POAST ULTRA, suivie de la bonne quantité de MERGE.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MUSTER (75 DF) plus LONTREL 360 (360 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus éthametsulfuron-méthyl* *plus clopyralide* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 15 g/ha 0,42 L/ha 0,75–1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *11 g/ha* *0,15 kg/ha* *0,75–1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 6 g/ac 0,17 L/ac 0,3–0,4 L/ac	• **NE PAS** appliquer sur du canola semé l'automne. • Traiter quand le canola est entre le stade 2 feuilles et la montaison. • Mettre MUSTER dans la cuve en premier et agiter. Une fois que MUSTER est en suspension, ajouter la quantité nécessaire de POAST ULTRA, suivie de la bonne quantité de MERGE.
VENTURE L (125 g/L) plus LONTREL 360 (360 g/L) *fluazifop-p-butyl* *plus clopyralide*	1,0–1,4 L/ha 0,42–0,56 L/ha *0,125–0,175 kg/ha* *0,15–0,2 kg/ha*	0,4–0,57 L/ac 0,17–0,22 L/a	• **NE PAS** appliquer VENTURE L sur le canola passé le stade 5 feuilles de la culture. • N'utiliser LONTREL que sur les cultivars suivants : Cyclone, Ebony, Jewel, 46A65 et Hyola 401. • Ajouter d'abord VENTURE L au mélange en cuve et faire circuler avant d'ajouter LONTREL.
VENTURE L (125 g/L) plus MUSTER (75 DF) *fluazifop-p-butyl* *plus éthametsulfuron-méthyl*	1,0–1,4 L/ha 15 g/ha *0,125–0,175 kg/ha* *11 g/ha*	0,4–0,57 L/ac 6 g/ac	• **NE PAS** appliquer sur du canola semé l'automne. • **NE PAS** appliquer VENTURE L sur le canola passé le stade 5 feuilles de la culture. • **NE PAS** appliquer le mélange en cuve MUSTER sur les cultivars polonais de canola, sous peine d'endommager la culture. • Ajouter d'abord MUSTER au mélange en cuve et faire circuler avant d'ajouter VENTURE L.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Canola — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée (uniquement pour cultivars de canola tolérant les herbicides)			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	0,825–1,875 L/ha 0,67–1,5 L/ha 0,6–1,4 L/ha 0,6–1,35 L/ha 0,55–1,27 L/ha *0,297–0,45 kg/ha*	0,33–0,75 L/ac 0,27–0,6 L/ac 0,24–0,56 L/ac 0,24–0,54 L/ac 0,22–0,51 L/ac	· Utiliser uniquement avec de la semence de canola sélectionnée (certifiée) désignée « Roundup Ready ». · Appliquer jusqu'au stade 6 feuilles du canola. Un deuxième traitement peut être fait contre les poussées de mauvaises herbes qui lèvent par la suite et pour mieux maîtriser les mauvaises herbes vivaces. · Utiliser la dose supérieure lorsque les mauvaises herbes sont plus grosses, que l'infestation est forte et en présence de mauvaises herbes vivaces.
LIBERTY 200 SN (200 g/L) *glufosinate ammonium*	2,5 L/ha *0,50 kg/ha*	1 L/ac	· LIBERTY 200SN peut être appliqué entre le stade cotylédon et le stade début montaison du canola. · À utiliser uniquement avec la semence de canola désignée « Liberty Link ». · On peut pulvériser du sulfate d'ammonium à raison de 6 L/ha (2,4 L/ac) (préparation liquide) ou de 3,3 kg/ha (1,3 kg/ac) (préparation sèche) si l'on veut une action plus radicale contre certaines mauvaises herbes en particulier. · **NE PAS** ajouter d'huile ni de surfactant.
PURSUIT (240 g/L) plus surfactant non ionique plus engrais liquide 10-34-0, 28-0-0 ou 32-0-0 *imazéthapyr* *plus surfactant non ionique* *plus engrais liquide*	0,312 L/ha 2,5 L/1000 L 2 L/ha *0,075 kg/ha* *0,25 % v/v* *2 L/ha*	0,125 L/ac 2,5 L/1000 L 0,8 L/ac	· À utiliser uniquement sur les cultivars de canola tolérant l'imazéthapyr. · Appliquer peu après la levée lorsque la culture est au moins au stade 1 feuille entièrement déployée et avant que les mauvaises herbes atteignent le stade 2 vraies feuilles. · PURSUIT a une activité rémanente dans le sol. · Certaines restrictions s'appliquent aux cultures comprises dans la rotation. Voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* plus LONTREL 360 (360 g/L) *glyphosate* *plus clopyralide*	1,25 L/ha 1 L/ha 0,94 L/ha 0,9 L/ha 0,83 L/ha 0,28 L/ha *0,45 kg/ha* *0,10 kg/ha*	0,5 L/ac 0,4 L/ac 0,38 L/ac 0,36 L/ac 0,33 L/ac 0,11 L/ac	· Utiliser uniquement avec de la semence de canola sélectionnée (certifiée) désignée « Roundup Ready ». · Ce traitement maîtrise la renouée liseron et élimine la partie aérienne du chardon des champs pendant toute la saison. · Traiter quand le canola est au stade 2–6 feuilles. · Utiliser 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · Pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues et les doses, se reporter aux étiquettes de LONTREL et des produits à base de glyphosate.
Canola — avant la récolte			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	2,5 L/ha 2 L/ha 1,875 L/ha 1,8 L/ha 1,67 L/ha *0,9 kg/ha*	1 L/ac 0,8 L/ac 0,75 L/ac 0,72 L/ac 0,67 L/ac	· Traiter à raison de 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) quand les graines de canola font au maximum 30 % d'humidité et quand les gousses sont au stade vert ou jaune et les graines, au stade jaune ou brun. Traiter 7–14 jours avant la récolte, à l'aide de matériel terrestre seulement. · **NE PAS** utiliser sur les cultures de semence.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Canola — pour faciliter la récolte			
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90	1,25–1,7 L/ha 1 L/1000 L	0,5–0,68 L/ac 1 L/1000 L	· Traiter quand la culture est mûre à 60–75 % (stade vert ou brun). · Récolter au plus tard 14 jours après le traitement pour éviter que les cosses ne s'égrènent.
diquat *plus surfactant*	*0,3–0,408 kg/ha* *0,1 % v/v*		· Utiliser la dose supérieure lorsque le feuillage est dense. · Utiliser un volume minimal de bouillie de 225 L/ha. · La dérive de l'herbicide est dommageable pour les cultures ou plantes adjacentes.

CHANVRE INDUSTRIEL CULTIVÉ POUR LA PRODUCTION DE FIBRES

Préparation du terrain avant les semis — Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Chanvre industriel — anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX	0,38–0,75 L/ha 5 L/1000 L	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	· Faire une application par année. Traiter les repousses de céréales et les graminées annuelles quand la culture est au stade 2–6 feuilles (6–25 cm de haut). · Utiliser la dose de 0,38 L de ASSURE II/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales et la sétaire verte.
quizalofop-p-éthyl *plus concentré d'huile*	*0,036–0,07 kg/ha* *0,5 % v/v*		· La dose de 0,5 L de ASSURE II/ha (0,2 L/ac) stoppe la croissance du chiendent commun et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. · Utiliser la dose de 0,75 L de ASSURE II/ha (0,3 L/ac) pour détruire le chiendent commun. · Utiliser un minimum de 100 L d'eau/ha et régler la pression à 210–275 kPa.

LIN

Présemis (PP) — Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits, les doses et des remarques.

Lin — anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX	0,375–0,75 L/ha 5 L/1000 L	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	· Traiter lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées sont entre le stade 2 feuilles et le tallage, et le chiendent commun au stade 2–6 feuilles. · Utiliser la dose de 0,375 L/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales et la sétaire verte.
quizalofop-p-éthyl *plus concentré d'huile*	*0,036–0,072 kg/ha* *0,5 % v/v*		· La dose de 0,5 L/ha (0,2 L/ac) retarde la croissance du chiendent commun et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. · Utiliser la dose de 0,75 L/ha (0,3 L/ac) pour détruire le chiendent commun. · **Attendre** 82 jours avant de récolter le lin.
POAST ULTRA (450 g/L) plus ASSIST **ou** MERGE	0,32–0,47 L/ha 2 L/ha 1 L/ha	0,13–0,19 L/ac 0,8 L/ac 0,4 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur les cultivars à faible teneur en acide linolénique. · Traiter au stade 1–6 feuilles des graminées annuelles. · Contre les graminées annuelles et les repousses de céréales · Utiliser la dose supérieure en présence de repousses de céréales.
séthoxydime *plus concentré d'huile* **ou** *surfactant/solvant*	*0,15–0,2 kg/ha* *2 L/ha* *1 L/ha*		· Utiliser MERGE lorsque les conditions ou les mauvaises herbes commandent des doses de moyennes à fortes de POAST ULTRA. · Le lin tolère le séthoxydime à tous les stades de sa croissance. · Utiliser 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac).

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• **NE PAS** utiliser sur les cultivars à faible teneur en acide linolénique. • Contre le chiendent commun. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. • Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus surfactant*	0,13–0,38 L/ha 5–10 L/1000 L *0,03–0,09 kg/ha* *0,5–1 % v/v*	0,05–0,15 L/ac 5–10 L/1000 L	• Pulvériser quand les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2–6 feuilles. • Appliquer sur le chiendent commun lorsqu'il est au stade 2–5 feuilles. Utiliser la dose la plus forte pour lutter contre le chiendent commun. • Le lin est tolérant à tous les stades de la croissance.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6 L/ha *0,075 kg/ha*	0,24 L/ac	• Traiter au stade 2–4 feuilles des graminées annuelles.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	2 L/ha *0,25 kg/ha*	0,8 L/ac	• Appliquer au stade 3–5 feuilles du chiendent commun.
Lin — anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,8 L/ac	• Appliquer lorsque le lin fait au moins 5 cm et que les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. • Ce traitement détruit la partie aérienne du souchet et du chardon des champs et peut arrêter temporairement la croissance du liseron des champs. Deux applications de 1,75 L/ha (0,7 L/ac) (0,84 kg de matière active/ha) à intervalle de 10 jours peuvent être nécessaires. • Une nouvelle vague de mauvaises herbes peut lever après que la première vague a été maîtrisée. • Un temps frais ou la sécheresse risque de réduire l'effet désherbant. • Réduire la dose du concentré d'huile à 1 L/ha (0,4 L/ac) par temps anormalement chaud et humide. Sinon, le lin risque de souffrir temporairement.
BUCTRIL M ([1:1] 560 g/L) **ou** BADGE, LOGIC M, MEXTROL ([1:1] 450 g/L) *bromoxynil/MCPA*	1 L/ha 1,25 L/ha *0,56 kg/ha*	0,4 L/ac 0,5 L/ac	• Appliquer lorsque le lin a entre 5 et 10 cm de hauteur, avant que les mauvaises herbes n'aient dépassé le stade 4 feuilles. • **NE PAS** utiliser si la température pendant la journée dépasse 29 °C.
MCPA AMINE (500 g/L)* *MCPA**	1 L/ha *0,5 kg/ha*	0,4 L/ac	• On peut traiter lorsque le lin a 5 cm de hauteur et jusqu'au stade bouton floral. • Le traitement est plus efficace s'il est effectué lorsque les mauvaises herbes sont petites (environ 5 cm).

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Lin — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus BUCTRIL M ([1:1] 560 g/L) **ou** BADGE, LOGIC M, MEXTROL ([1:1] 450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus bromoxynil/MCPA* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 1 L/ha 1,25 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *0,56 kg/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac 0,4 L/ac	· Traiter lorsque le lin fait entre 5 et 10 cm et que les mauvaises herbes n'ont pas encore atteint le stade 4 feuilles. · **NE PAS** appliquer si la température pendant la journée dépasse 29 °C. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MCPA AMINE (500 g/L)* plus MERGE *séthoxydime* *plus MCPA** *plus surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 0,84–1,1 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *0,42–0,55 kg/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,34–0,44 L/ac 0,4 L/ac	· Le lin peut être traité à partir de 5 cm de hauteur jusqu'au stade bouton. · Le désherbage est meilleur quand le traitement est effectué sur des mauvaises herbes encore jeunes (environ 5 cm de haut). · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
SELECT (240 g/L) plus BUCTRIL M ([1:1] 560 g/L) **ou** BADGE, LOGIC M, MEXTROL ([1:1] 450 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus bromoxynil/MCPA* *plus surfactant*	0,19 L/ha 1 L/ha 1,25 L/ha 5 L/1000 L *0,045 kg/ha* *0,56 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,076 L/ac 0,4 L/ac 0,5 L/ac 5 L/1000 L	· Pour un maximum de résultats, appliquer lorsque le lin fait 5–10 cm de hauteur et que les mauvaises herbes sont au stade de plantule. · **NE PAS** appliquer si la température pendant la journée dépasse 25 °C.
Lin — avant la récolte			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate** 	2,5 L/ha 2 L/ha 1,875 L/ha 1,8 L/ha 1,67 L/ha *0,9 kg/ha*	1 L/ac 0,8 L/ac 0,75 L/ac 0,72 L/ac 0,67 L/ac	· Traiter à raison de 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac) quand les graines de canola font au maximum 30 % d'humidité et quand la majorité des pieds de lin sont bruns (75–80 %). Traiter 7–14 jours avant la récolte. · **NE PAS** utiliser sur les cultures de semence.
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90 *diquat* *plus surfactant non ionique*	1,25–1,7 L/ha 1 L/1000 L *0,3–0,408 kg/ha* *0,1 % v/v*	0,5–0,68 L/ac 1 L/1000 L	· Appliquer lorsque 75 % de la culture est au stade de pied de lin. · **NE PAS** appliquer sur une culture qui n'est pas à maturité. · Ce traitement réduit le temps de séchage sur pied et élimine le besoin d'andainage.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
MOUTARDE			
Présemis (PP) — Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits, les doses et des remarques.			
Moutarde — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,147 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,4–0,76 L/ac 0,6–1,1 L/ac	• Appliquer par IPS. • Fortement absorbé par les particules de sol; lessivage négligeable. • **NE PAS** appliquer sur des sols sableux. • Peut être appliqué immédiatement avant les semis ou jusqu'à 3 semaines avant les semis.
Moutarde — anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus ASSIST **ou** MERGE *séthoxydime* *plus concentré d'huile* ***ou*** *surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 2 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *2 L/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,8 L/ac 0,4 L/ac	• Traiter au stade 1–6 feuilles des graminées annuelles. • Contre les graminées annuelles et les repousses de céréales. • Utiliser la dose supérieure en présence de repousses de céréales. • Utiliser MERGE lorsque les conditions ou les mauvaises herbes commandent des doses de moyennes à fortes de POAST ULTRA. • Le lin tolère le séthoxydime à tous les stades de sa croissance. • Utiliser 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Contre le chiendent commun. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. • Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
Moutarde — avant la récolte			
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90 *diquat* *plus surfactant*	1,25–1,7 L/ha 1 L/1000 L *0,3–0,408 kg/ha* *0,1 % v/v*	0,5–0,68 L/ac 1 L/1000 L	• Traiter quand la culture est mûre à 60–75 % (stade vert ou brun). • Récolter au plus tard 14 jours après le traitement pour éviter que les cosses ne s'égrènent. • Utiliser la dose supérieure lorsque le feuillage est dense. • Utiliser un volume minimal de bouillie de 225 L/ha. • La dérive de l'herbicide est dommageable pour les cultures ou plantes adjacentes.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
SORGHO ET MILLET (GRAINS)			
Présemis (PP) — Voir *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits, les doses et des remarques.			
Sorgho et Millet (grains) — Anti-dicotylédones de postlevée			
BASAGRAN FORTÉ (480 g/L) *bentazone*	1,75–2,25 L/ha *0,84–1,08 kg/ha*	0,7–0,9 L/ac	· Traiter lorsque la culture est au stade 3–6 feuilles. · Cibler les mauvaises herbes annuelles lorsqu'elles sont au stade 4–6 feuilles. · Une 2e levée de mauvaises herbes peut survenir après la destruction de la 1re. · Un temps frais ou sec peut réduire l'efficacité du traitement. · Réduire la dose du concentré d'huile à 1 L/ha (0,4 L/ac par temps anormalement chaud et humide, sinon la culture pourrait souffrir temporairement du traitement. · **Attendre** 100 jours avant la récolte.
PARDNER (280 g/L) **ou** BROTEX (240 g/L) *bromoxynil*	1 L/ha 1,2 L/ha *0,28 kg/ha*	0,4 L/ac 0,48 L/ac	· Appliquer lorsque la culture est au moins au stade 4 feuilles et avant qu'elle atteigne 20 cm de hauteur. · Effectuer une application par année. · **Attendre** 100 jours avant la récolte.
TABAC			
Tabac — après le repiquage			
Appliquer dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha *1,125–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· Après le repiquage, appliquer immédiatement, en bande de 25–30 cm sur les plants. · Utiliser les doses inférieures sur les sols légers. · Pour obtenir de meilleurs résultats, incorporer peu profondément ou irriguer si aucune pluie ne tombe dans les deux jours qui suivent. · Après la récolte, le sol devrait être travaillé en sens perpendiculaire aux rangs pour éviter les risques de dommages aux récoltes suivantes. Pour empêcher l'érosion du sol, on peut semer des céréales à paille à l'automne. Les céréales risquent d'accuser un retard de croissance, mais elles se remettent ensuite.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–1 L/ha *0,075–0,125 kg/ha*	0,24–0,4 L/ac	· On peut traiter au plus tard 45 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
TOURNESOL			
On peut désherber avec succès le tournesol par des façons culturales, mais seulement si on fait de même dans les autres cultures de la rotation. Il y a plusieurs méthodes de travail du sol dans les champs de tournesol. La préparation du lit de semence élimine une ou deux levées de mauvaises herbes hâtives. Semer immédiatement après le dernier travail du sol. Le passage d'une houe rotative réglée pour travailler le sol en surface élimine bien les annuelles qui viennent de lever, mais peu les plantules déjà bien enracinées.			On peut passer une herse à dents flexibles pour détruire les jeunes mauvaises herbes lorsque le tournesol possède entre 4 à 6 feuilles Mais le tournesol peut en souffrir quelque peu et les mauvaises herbes développées survivent. Le désherbage mécanique consiste principalement en un ou deux passages de sarcleuse ou de bineuse. Les jeunes plants de tournesol doivent être assez développés pour ne pas être ensevelis. Les racines latérales du tournesol sont peu profondes, il faut donc éviter de sarcler trop profondément ou trop près des plantes.
Tournesol — anti-graminées radiculaires			
EPTAM (800 g/L) *EPTC*	4,25 L/ha *3,4 kg/ha*	1,7 L/ac	· Appliquer par IPS. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux légers renfermant moins de 3 % de matière organique.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL (500 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac	· Appliquer par IPS.
Tournesol — anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus ASSIST **ou** MERGE *séthoxydime* *plus concentré d'huile* **ou** *surfactant/solvant*	0,32–0,47 L/ha 2 L/ha 1 L/ha *0,15–0,2 kg/ha* *2 L/ha* *1 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,8 L/ac 0,4 L/ac	· Traiter au stade 1–6 feuilles des graminées annuelles. · Contre les graminées annuelles et les repousses de céréales. · Utiliser la dose supérieure en présence de repousses de céréales. · Utiliser MERGE lorsque les conditions ou les mauvaises herbes commandent des doses de moyennes à fortes de POAST ULTRA. · Le lin tolère le séthoxydime à tous les stades de sa croissance. · Utiliser 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,5 kg/ha*	0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Contre le chiendent commun. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus surfactant*	0,13–0,38 L/ha 5–10 L/1000 L *0,03–0,09 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,05–0,15 L/ac 5–10 L/1000 L	· Pulvériser quand les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2–6 feuilles. · Appliquer sur le chiendent commun lorsqu'il est au stade 2–5 feuilles. Utiliser la dose la plus forte pour lutter contre le chiendent commun. · Laisser s'écouler 72 jours entre l'application et la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6 kg/ha *0,075 kg/ha*	0,24 L/ac	· Cette dose ne maîtrise que le maïs spontané. · Appliquer au stade 2–5 feuilles du maïs spontané.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
VENTURE L (125 g/L)	1,0–1,4 L/ha	0,4–0,57 L/ac	• Appliquer au stade 2–4 feuilles des graminées annuelles et au stade 3–5 feuilles du chiendent commun.
fluazifop-p-butyl	*0,125–0,18 kg/ha*		
Tournesol — pour faciliter la récolte			
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) plus AGRAL 90	1,25 L/ha 1 L/1000 L	0,5 L/ac 1 L/1000 L	• REGLONE peut être utilisé pour raccourcir la période de temps entre la maturité et la récolte, pour accélérer cette dernière et diminuer la teneur en eau du grain à la récolte. • Traiter lorsque les graines ont atteint la maturité (20–50 % d'humidité). • Récolter 15–20 jours après le traitement. • Se méfier de la dérive du brouillard herbicide vers d'autres plantes ou cultures. • Voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, au sujet des traitements par aéronef.
diquat *plus surfactant*	*0,3 kg/ha* *0,1 % v/v*		

13. CULTURES LÉGUMIÈRES

En avril 2009, le ministère de l'Environnement (MEO) modifiait sa *Loi sur les Pesticides* avec l'adoption de la *Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques* et du Règlement de l'Ontario 63/09. Les pesticides sont maintenant classés aux fins de vente et d'utilisation dans onze catégories différentes. Des exemptions sont prévues pour les usages agricoles (notamment pour la production de matériel de pépinière). Pour plus d'information sur les dispositions législatives, voir la page Web du MEO qui y est consacrée à www.ontario.ca/interdictiondespesticides.

Plus de 50 légumes sont cultivés à l'échelle commerciale en Ontario. Tantôt semées, tantôt repiquées, tantôt annuelles, tantôt vivaces, ces cultures présentent des situations fort diverses pour ce qui a trait à la gestion des mauvaises herbes. La gestion des mauvaises herbes intègre tous les aspects de la lutte contre les mauvaises herbes dans les productions légumières, y compris le dépistage, le désherbage chimique, le désherbage mécanique (cultivateur, houe rotative), l'utilisation de paillis, etc.

Les mauvaises herbes vivaces sont souvent plus problématiques dans les cultures pérennes comme celle des asperges, d'où l'importance de les maîtriser avant d'installer la culture.

Pour les haricots mange-tout et le maïs sucré, on se référera à la section sur les grandes cultures (*Haricots*, p. 95, et *Maïs*, p. 119), car les recommandations sont sensiblement les mêmes que pour les haricots et le maïs de grande culture, les différences étant signalées, le cas échéant.

Les traitements recommandés dans ce guide pour les productions horticoles sont le fruit de nombreux essais dans un cadre de recherche. Ne pas utiliser d'herbicides dans des couches froides ou des serres, à moins que ces usages ne soient spécifiquement précisés.

Les productions horticoles ont souvent une grande valeur à l'hectare. Aussi, la concurrence exercée par les mauvaises est-elle coûteuse. Des traitements chimiques inadéquats peuvent également être coûteux. Ne pas utiliser de pulvérisateurs ayant servi à épandre des herbicides de type hormonal (tels que 2,4-D) pour appliquer des insecticides, des fongicides ou des herbicides sur des cultures horticoles sensibles.

Moments des traitements herbicides

Traitements de présemis (PP)

On effectue ces traitements avant que la culture soit semée ou plantée. Certains de ces traitements tuent les plantules de mauvaises herbes peu après la la germination, alors que d'autres tuent aussi les graines de mauvaises herbes. La plupart des herbicides servant à ces traitements doivent être incorporés au sol par un travail du sol effectué peu après l'application. Consulter l'étiquette du produit utilisé. Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Destruction des cultures couvre-sol et des mauvaises herbes en préplantation (PP)

Détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées avant de semer ou de repiquer une culture légumière. Voir le tableau 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85. Une autre méthode consiste à détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées tout juste avant le semis ou le repiquage de la culture légumière, avec ou sans travail du sol.

Incorporation en présemis (IPS)

Sauf indication contraire, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

Prélevée (PRÉ)

De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 7–10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas. Ces produits empêchent la levée des plantules de nombreuses mauvaises herbes sans réduire la densité de la culture. Épandre immédiatement après le semis ou au plus tard avant la levée des plantes cultivées. Ces herbicides ont peu d'effet sur les mauvaises herbes déjà levées, et ne donnent les meilleurs résultats que lorsque les conditions sont favorables à la germination des graines de mauvaises herbes.

Postlevée (POST)

Ces produits sont utilisés après la levée ou le repiquage. Utilisés selon le mode d'emploi, ils tuent les mauvaises herbes sans nuire à la plante cultivée. Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides, pourvu qu'elles présentent une surface foliaire suffisante pour assimiler l'herbicide. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

Désherbage des entrerangs

L'herbicide est alors dirigé sur les mauvaises herbes levées entre les rangs, si les autres méthodes ont échoué. On utilise alors un appareil à faible pression (7–15 kPa) comme la barre d'aspersion ou la buse oscillante vibrajet munie d'un écran de protection empêchant les plantes cultivées d'être mouillées. Voir *Désherbage des entrerangs et techniques de semis sur sol rassis*, p. 90.

Technique du semis sur sol rassis

La technique du semis sur sol rassis est utile quand le sol peut être travaillé bien avant les semis et que les mauvaises herbes ont plusieurs semaines pour lever. Appliquer l'un des herbicides non sélectifs énumérés sous *Désherbage des entrerangs et techniques de semis sur sol rassis*, p. 90. Le fait de faire les semis ou les plantations à travers les mauvaises herbes mortes, en dérangeant le sol le moins possible, permet à la culture de s'établir avant la nouvelle vague de mauvaises herbes. Pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite, recourir au sarclage, au binage ou à des traitements de postlevée ou dirigés. Quand ils sont homologués, certains herbicides peuvent être appliqués après les semis, pourvu que ce soit avant la levée de la culture.

Désherbage sélectif par humectation

Les humecteurs à cordes, à rouleaux ou à brosses sont largement employés pour appliquer le glyphosate (ROUNDUP). En ce qui concerne les autres herbicides, vérifier sur le mode d'emploi si ces produits peuvent aussi être appliqués par humectation.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en caractères gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 13–1. Évaluation des herbicides pour les légumes

	Graminées					Dicotylédones annuelles								Vivaces						
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaires**	**panic capillaire**	**renouée liseron**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**herbes à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
Anti-graminées radiculaires																				
DEVRINOL	**8**	**9**	**8**	8	8	5	6	**8**	5	5	**8**	**7**	5	5	5	5	6	5	5	5
DUAL II MAGNUM	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	2	2	7	2	**8**	**7/8**	4	2	0	0	0	**8**	4	0	0
EPTAM	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	4	7	**7**	5	7	**7**	5	5	-	-	-	**8**	**5**	-	-
FRONTIER	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	2	2	7	2	**8**	**8**	4	2	0	0	0	**8**	0	0	0
Anti-dicotylédones radiculaires																				
ALANAP	5	7	5	7	-	5	9	9	6	5	8	5	-	-	5	-	5	5	5	5
GESAGARD	-	-	-	**9**	-	-	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	6	-	-	-	-	-	-	-	-
LOROX DF	7	**5**	**5**	**7**	**7**	**8**	**9**	**9**	**9**	8	**9**	**8**	**6**	2	2	2	2	2	2	2
PYRAMIN	**5**	**5**	5	**5**	5	**8**	**8**	**8**	8	**8**	**8**	**8**	6	5	5	-	5	5	5	5
SENCOR	**7**	**6**	**7**	**8**	**8**	7	**9**	**9**	**9**	3	**9**	**8**	**8**	2	2	2	2	2	2	2
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																				
COMMAND 360 ME	**9**	9	-	**9**	-	-	-	**9**	-	**9**	6	8/9	**9**	-	-	-	-	-	-	-
DACTHAL W-75	6	**8**	8	**8**	8	0	0	**8**	0	0	**7**	0	0	-	-	-	-	0	0	0

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario, p. 25.*

· Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[a] Pour venir à bout des vivaces, il faut souvent effectuer deux traitements à 7 ou 10 jours d'intervalle.

[b] Entraîne seulement un ralentissement de la croissance chez la sétaire glauque.

[c] Homologué pour la maîtrise de la morelle poilue.

[d] Il faut parfois répéter le traitement si la mauvaise herbe repousse.

TABLEAU 13–1. Évaluation des herbicides pour les légumes (suite)

	Graminées					Dicotylédones annuelles								Vivaces						
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaires**	**panic capillaire**	**renouée liseron**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**herbes à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
KARMEX **ou** DIUREX 80WDG	9	**8**	7	**8**	-	8	8	**9**	8	7	**8**	**9**	-	-	5	-	5	5	5	5
KERB	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	-	6	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORTRON SC	**7**	**6**	7	**7**	7	**8**	**8**	**8**	8	**7**	**8**	8	7	5	5	5	6	5	5	5
PURSUIT	**8**	7	7	**9**	9	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	-	-	7	5	-	-
PRINCEP NINE-T	**9**	**8**	7	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	9	9	**8**	5	2	0	0	5	5	2	2
PROWL	**9**	**9**	9	**8**	-	-	6	**9**	-	8	**8**	2	6	-	-	-	-	-	-	-
PURSUIT	**8**	7	7	**9**	9	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	-	-	-	7	5	-	-
SINBAR	**8**	**7**	8	**8**	8	-	7	**8**	**8**	7	**7**	**7**	7	-	5	6	6	6	-	6
TREFLAN **ou** RIVAL **ou** BONANZA	**9**	**9**	9	**9**	9	**5**	7	**8**	2	2	**8**	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Anti-graminées de postlevée																				
ASSURE II	**9**	8	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0
EXCEL SUPER	9	8	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
KERB	**8**	**8**	**6**	**8**	-	-	0	0	0	-	6	0	0	0	0	0	0	**8**	0	0
POAST ULTRA	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0
SELECT	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0
VENTURE L	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	0	0
Anti-dicotylédones de postlevée																				
2,4-D*	0	0	0	0	0	7	**4**	**4**	**9**	7	**9**	**8**	8	**7**	**0**	0	0	0	**8**	**8**
AIM EC (pulvérisateur muni d'écrans anti-dérive)	0	0	0	0	0	-	-	**8**	**8**	**8**	**8**	-	**8**	-	-	-	-	-	-	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[a] Pour venir à bout des vivaces, il faut souvent effectuer deux traitements à 7 ou 10 jours d'intervalle.

[b] Entraine seulement un ralentissement de la croissance chez la sétaire glauque.

[c] Homologué pour la maîtrise de la morelle poilue.

[d] Il faut parfois répéter le traitement si la mauvaise herbe repousse.

TABLEAU 13–1. Évaluation des herbicides pour les légumes (suite)

	Graminées					Dicotylédones annuelles								Vivaces						
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaires**	**panic capillaire**	**renouée liseron**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**morelles**	**amarantes**	**herbes à poux**	**abutilon**	**liseron des champs**	**prêle**	**asclépiade**	**souchet**	**chiendent commun**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**
BASAGRAN FORTÉ	0	0	0	0	0	7	**9**	**8**	**7**	7	**8**	**8**	**9**	**6**[a]	2	2	**8**[a]	0	6[a]	**7**[a]
BETAMIX	5	5	5	**7**	5	**6**	6	**8**	**7**	**6**	**8**	**8**	5	5	-	-	5	5	5	5
GOAL 2XL	5	5	5	5	5	**9**	8	**8**	9	**9**	**9**	8	7	5	5	5	5	5	5	5
huile herbicide*	-	-	-	-	-	-	6	7	7	-	7	5	-	5	5	5	5	5	5	5
LONTREL	5	5	5	5	5	-	7	5	-	5	5	**8**	5	5	-	-	5	5	**7**	**7**
MCPA*	0	0	0	0	0	**4**	0	**9**	**9**	-	**9**	**8**	**9**	7	**7**	0	0	0	**7**	**7**
PARDNER	0	0	0	0	0	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	**9**	7	0	0	0	0	7	7
PINNACLE	0	0	0	0	0	-	**8**	**9**	**8**	3	**9**	5	**8**	2	2	2	2	2	2	2
PYRAMIN	**5**	5	-	5	-	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	-	-	5	-	5	5	5	5
TROPITOX PLUS **ou** CLOVITOX PLUS **ou** TOPSIDE	0	0	0	0	0	8	8	**7**	**8**	7	**9**	**9**	9	**8**	0	0	0	0	**8**	**8**
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																				
LOROX DF	9	**7**	9	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	8	8	**8**	**8**	**8**	7	8	7	8	7	8	7
PRISM	**9**	8	**9**	**8**[b]	**9**	-	7	**7**	9	4[c]	**9**	3	6	-	-	-	-	**7**	-	-
SENCOR	**8**	**7**	**9**	**8**	**9**	**7**	**9**	**8**	**9**	-	**8**	**8**	**7**	-	-	-	-	7	-	-
Choix de mélanges en cuve de postlevée																				
PRISM + PINNACLE	**9**	8	**9**	**8**[b]	**9**	-	**8**	**9**	9	4[c]	**9**	5	8	2	2	2	2	**7**	2	2
Avant et après la récolte																				
IGNITE	9	9	9	**9**	9	-	9	**9**	**9**	-	**9**	9	9	8[d]	7d	6[d]	0	8[d]	-	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[a] Pour venir à bout des vivaces, il faut souvent effectuer deux traitements à 7 ou 10 jours d'intervalle.

[b] Entraîne seulement un ralentissement de la croissance chez la sétaire glauque.

[c] Homologué pour la maîtrise de la morelle poilue.

[d] Il faut parfois répéter le traitement si la mauvaise herbe repousse.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
AIL			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–18 kg/ha *6,75–13,5 kg/ha*	3,6–7,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · Appliquer à raison de 18 kg/ha (7,2 kg/ac) sur des argiles lourdes. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · Appliquer immédiatement après les semis ou directement sur les plants repiqués, avant la levée des mauvaises herbes. · Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,24–4,5 kg/ha *1,12–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· PRÉ — Ne faire qu'une application par année avant la levée de la culture et des mauvaises herbes. · Utiliser la dose inférieure dans des sols légers (sols sableux à texture grossière et loams sableux). · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la récolte. · Travailler le sol après la récolte (en travers des rangs) afin de prévenir les dommages aux cultures subséquentes. Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 50 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
PARDNER (280 g/L) ou BROTEX (240 g/L) *bromoxynil*	1 L/ha 1,2 L/ha *0,28 kg/ha* *0,29 kg/ha*	0,4 L/ac 0,48 L/ac	· Appliquer sur les dicotylédones en croissance active au stade 1–4 feuilles. · Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha (80–100 L d'eau/ac). · Utiliser une pression de 275 kPa. · Faire **UNIQUEMENT** une application terrestre par année. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir. · **NE PAS** appliquer à des températures dépassant 25°C. · **Respecter** un délai d'attente de 58 jours avant la récolte.

ASPERGE

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Présemis (technique du semis sur sol rassis)			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,55–1,75 L/ha *1,42–1,67 kg/ha*	0,6–0,8 L/ac	· **Appliquer avant la levée des turions dans les asperges semées en place ou les aspergeraies établies.** · La culture risque de souffrir du traitement (diminution de la densité de peuplement, retard de maturité et même perte de rendement). · Utiliser du matériel d'application terrestre uniquement. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 1 % ni plus de 10 % de matière organique.
GRAMOXONE (200 g/L) *seul ou* *suivi de* DEVRINOL DF (50 DF) *paraquat* *suivi de napropamide*	3–5,5 L/ha 4,5–9 kg/ha *0,6–1,1 kg/ha* *2,25–4,5 kg/ha*	1,2–2,2 L/ac 1,8–3,6 kg/ac	· **Appliquer avant la levée des turions dans les asperges semées en place ou les aspergeraies établies.** · Traiter à raison de 300–1100 L d'eau/ha (120–440 L/ac). Utiliser le volume d'eau supérieur dans les zones très infestées. · GRAMOXONE sert à faucher chimiquement les plantules de mauvaise herbe apparaissant avant que les premiers plants d'asperge commencent à lever. · Faire un traitement distinct au DEVRINOL juste avant la seconde flambée de mauvaises herbes.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· **Appliquer avant la levée des turions dans les asperges semées en place ou les aspergeraies établies.** · Diluer dans 110–330 d'eau/ha (44–132 L/ac). · Appliquer uniformément, après la levée des mauvaises herbes, mais avant celle de la culture. · Sans effet sur les mauvaises herbes non encore levées.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1,25–2,5 L/ha 0,94–1,875 L/ha 0,9–1,8 L/ha 0,83–1,67 L/ha *0,45–0,9 kg/ha*	0,5–1 L/ac 0,38–0,75 L/ac 0,36–0,72 L/ac 0,33–0,67 L/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · Contre le seigle semé l'automne et les mauvaises herbes levées. · Appliquer au printemps avant la levée des turions, mais au moins 7 jours avant la récolte. · **Faire SEULEMENT** une application par année.
Anti-graminées radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	2–4,2 L/ha 2–4 L/ha 2,5–5 L/ha *1-2 kg/ha*	0,81–1,68 L/ac 0,8–1,6 L/ac 1–2 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · IPS — Comme il faut incorporer le produit dans les 5–10 premiers centimètres du sol, la pulvérisation doit être faite suffisamment tôt pour que l'incorporation n'endommage pas les turions. · Traiter après la dernière coupe d'asperges de l'année (après le passage du pulvériseur en postrécolte) et incorporer. · Ce traitement NE convient QU'À des plantations établies depuis au moins 3 ans.
Anti-dicotylédones radiculaires			
LOROX DF (50 DF) *linuron*	3,3–4,3 kg/ha *1,6-2,15 kg/ha*	1,32–1,72 kg/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Passer le pulvériseur avant la sortie des turions au printemps dans les aspergeraies établies. · On peut faire un 2e traitement après le passage du pulvériseur en postrécolte. · Utiliser les doses inférieures dans les sols légers. · Les doses correspondent à des traitements de pleine surface; réduire proportionnellement les doses pour les traitements en bande.
SENCOR 75 DF (75 WG) *métribuzine*	1,46–3 kg/ha *1,1-2,25 kg/ha*	0,58–1,2 kg/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Passer le pulvériseur avant la sortie des turions au printemps dans les aspergeraies établies. · On peut faire un 2e traitement après le passage du pulvériseur en postrécolte. · Utiliser les doses inférieures dans les sols légers. · Les doses correspondent à des traitements de pleine surface; réduire proportionnellement les doses pour les traitements en bande.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Griffes de 1 an et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · Appliquer une seule fois par saison de croissance sur des asperges en dormance établies depuis au moins un an. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser la dose inférieure sur les sols sableux (à texture grossière) renfermant moins de 5 % de matière orgnaique, et la dose supérieure sur les sols argileux (à texture moyenne) renfermant moins de 5 % de matière organique. · Des dommages sont à craindre si les turions lèvent avant que de l'eau ait activé le traitement. · Appliquer à l'aide de matériel d'application terrestre seulement.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	4,5–9 kg/ha *2,25–4,5 kg/ha*	1,8–3,6 kg/ac	· **Griffes de 1 an et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · IPS — L'incorporation par pluie ou irrigation est indispensable. · Traiter au moment de la mise en place ou peu après, avant l'apparition des plantules de mauvaises herbes. · Utiliser la dose inférieure en sols sableux et la dose supérieure en sols argileux.
KARMEX (80 DF) **ou** DIUREX 80WDG *diuron*	2,19–2,81 kg/ha 2,19–2,81 kg/ha *1,75–2,25 kg/ha*	0,88–1,12 kg/ac 0,88–1,12 kg/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Passer le pulvériseur avant la sortie des turions au printemps dans les aspergeraies établies. · On peut faire un 2e traitement après le passage du pulvériseur en postrécolte. · Utiliser les doses inférieures dans les sols légers. · Les doses correspondent à des traitements de pleine surface; réduire proportionnellement les doses pour les traitements en bande. · **NE PAS** appliquer si la zone traitée doit servir à une autre culture après la récolte.
PRINCEP NINE-T (90 WG) plus DEVRINOL DF (50 DF) *simazine* *plus napropamide*	1,5–2,75 kg/ha 9–13,4 kg/ha *1,35–2,48 kg/ha* *4,5–6,7 kg/ha*	0,6–1,1 kg/ac 3,6–5,36 kg/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Passer le pulvériseur avant la sortie des turions au printemps dans les aspergeraies établies. · Utiliser les doses inférieures dans les sols légers. · Ne faire qu'une seule application par saison de croissance. · **NE PAS** traiter à moins de 6 jours de la récolte.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	2,5–3,75 kg/ha 4,5–6,7 L/ha 4,7–7 L/ha *2,25–3,4 kg/ha*	1–1,5 kg/ac 1,8–2,68 L/ac 1,88–2,8 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter avant la levée des asperges, 7 jours avant la première coupe. · On peut faire un 2e traitement après le passage du pulvériseur en postrécolte. · Utiliser les doses inférieures dans les sols légers. · Les doses correspondent à des traitements de pleine surface; réduire proportionnellement les doses pour les traitements en bande. · **NE PAS** appliquer si la zone traitée doit servir à une autre culture après la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
SINBAR (80 WP) *terbacile*	0,375 kg/ha *0,3 kg/ha*	0,15 kg/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer avant la levée des turions ou immédiatement après une coupe propre. · Traiter une fois **SEULEMENT** dans toute la saison de croissance. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes ou sur des mauvaises herbes petites (jusqu'à 5 cm) et en croissance active. · **NE PAS** utiliser ce produit sur des sols renfermant moins de 1 % de matière organique, ou dans des zones où le sous-sol ou les racines sont à nu. · **NE PAS** utiliser sur des plants affaiblis, malades ou peu vigoureux (croissance ralentie). · **NE PAS** récolter dans les 5 jours qui suivent le traitement. · On peut à nouveau l'année suivante planter des asperges dans les zones traitées. · **NE PAS** cultiver d'autre culture pendant les 2 années qui suivent le traitement.
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · Traiter seulement après que les turions d'asperges ont été récoltés. · **NE PAS** traiter les turions avant ou durant la récolte. · Traiter lorsque la majorité des graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles ou tant que le maïs spontané ne dépasse pas 25 cm de hauteur. · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Appliquer sur les asperges semées en place, les griffes de 1 an, les griffes de 2 ans et les aspergeraies établies.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 40 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L)	0,6–2 L/ha	0,24–0,8 L/ac	· **Appliquer sur les asperges semées en place, les griffes de 1 an et les aspergeraies établies.**
fluazifop-p-butyl	*0,075–0,25 kg/ha*		· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Une seule application par saison de croissance. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent commun avant les semis rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)*	2,75 L/ha	1,1 L/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.**
ou 2,4-D (564 g/L)*	2,29 L/ha	0,92 L/ac	· Traiter après la dernière coupe, immédiatement après la récolte ou 3 semaines après le passage du pulvériseur suivant la dernière coupe. Faire un traitement dirigé pour éviter de mouiller les parties aériennes des pieds d'asperges. · Traiter à raison de 50–200 L d'eau/ha (20–80 L/ac). · Peut être appliqué tôt dans la saison immédiatement après une coupe. · Appliquer tout de suite après avoir coupé les turions au ras du sol pour éviter d'endommager les plants. · Les turions en train de sortir peuvent être tordus. Éliminer les turions tordus. Les turions qui sortiront par la suite seront normaux.
ou 2,4-D (660 g/L)*	1,96 L/ha	0,78 L/ac	
*2,4-D**	*1,293 kg/ha*		
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
SINBAR (80 WP)	0,38 kg/ha	0,15 kg/ac	· **Appliquer avant la levée des asperges semées en place UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en pleine surface dans les 2 jours qui suivent les semis. · Enfouir la semence à une profondeur de 4 cm dans les sols à texture grossière (sableux) ou à 2,5 cm dans les sols à texture fine (argileux) dans des champs fraîchement travaillés.
terbacile	*0,3 kg/ha*		
Herbicides de postlevée			
DUAL II MAGNUM (915 g/L)	1,55–1,75 L/ha	0,6–0,8 L/ac	· **Traiter après la dernière coupe d'asperges établies.** · La culture risque de souffrir du traitement (diminution de la densité de peuplement, retard de maturité et même perte de rendement). · Appliquer à l'aide de matériel d'application terrestre seulement. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 1 % ni plus de 10 % de matière organique.
s-métolachlore/benoxacor	*1,42–1,67 kg/ha*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) *seul ou* *suivi de* DEVRINOL DF (50 DF) *paraquat* *suivi de napropamide*	3–5,5 L/ha 4,5–9 kg/ha *0,6–1,1 kg/ha* *2,25–4,5 kg/ha*	1,2–2,2 L/ac 1,8–3,6 kg/ac	· **Traiter après la dernière coupe d'asperges établies.** · Traiter à raison de 300–1100 L d'eau/ha (120–440 L/ac). Utiliser le volume d'eau supérieur dans les zones très infestées.
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· **Traiter après la dernière coupe d'asperges établies.** · Diluer dans 110–330 d'eau/ha (44–132 L/ac).
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1,25–2,5 L/ha 0,94–1,875 L/ha 0,9–1,8 L/ha 0,83–1,67 L/ha *0,45–0,9 kg/ha*	0,5–1 L/ac 0,38–0,75 L/ac 0,36–0,72 L/ac 0,33–0,67 L/ac	· **Griffes de 2 ans et aspergeraies établies UNIQUEMENT.** · **Faire SEULEMENT** une application par année.
BETTERAVE À SUCRE — Voir *Betterave à sucre de transformation*, ci-dessous.			
BETTERAVE À SUCRE DE TRANSFORMATION			
Mise en garde concernant les résidus d'herbicides — La betterave à sucre est l'une des cultures les plus sensibles aux résidus d'herbicides venant de la culture précédente. Elle est particulièrement sensible à de nombreux produits du groupe 2 dont PURSUIT, BROADSTRIKE, CLASSIC et PEAK. Un pH du sol faible (inférieur à 6,0) ou élevé (supérieur à 7,5) peut contribuer à retarder la dégradation de ces herbicides, augmentant ainsi les dommages causés aux cultures de la rotation. Pour plus d'information, voir le tableau 4–4, *Restrictions (rotation des cultures et pH du sol)*, p. 67, les étiquettes des produits, les vendeurs d'herbicides et les représentants d'acheteurs de betteraves à sucre.			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-dicotylédones radiculaires			
PYRAMIN FL (430 g/L) *pyrazone*	8,25–10,25 L/ha *3,55–4,41 kg/ha*	3,3–4,1 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · **NE PAS** incorporer à une profondeur de plus de 5 cm dans le sol. · **NE PAS** appliquer sur les sols renfermant moins de 3 % de matière organique.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
NORTRON SC (480 g/L) *éthofumésate*	3,2–8,25 L/ha *1,54–3,96 kg/ha*	1,28–3,3 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · **NE PAS** incorporer à une profondeur de plus de 5 cm dans le sol. · N'utiliser **QUE** sur des sols minéraux. · Utiliser la dose inférieure sur les sols renfermant moins de 3 % de matière organique. · **Attendre** 12 mois avant de passer à une autre culture.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Mélange en cuve d'herbicides radiculaires			
PYRAMIN FL (430 g/L) plus NORTRON SC (480 g/L) *pyrazone* *plus éthofumésate*	5,25 L/ha 3,65 L/ha *2,26 kg/ha* *1,75 kg/ha*	2,1 L/ac 1,46 L/ac	· Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** appliquer sur les sols renfermant moins de 3 % de matière organique. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · N'utiliser **QUE** sur des sols minéraux. · **Attendre** 12 mois avant de passer à une autre culture.
Anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus concentré d'huile*	0,38–0,75 L/ha 5 L/1000 L d'eau *0,036–0,072 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,30 L/ac 5 L/1000 L d'eau	· Appliquer en POST sur les graminées annuelles et les céréales spontanées entre le stade 2 feuilles et le tallage et sur le maïs spontané et le chiendent commun au stade 2–6 feuilles. · Appliquer avant que le couvert végétal se referme afin d'obtenir un recouvrement optimal. · Utiliser 0,38 L/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les graminées annuelles et les céréales spontanées. · Utiliser 0,75 L/ha (0,30 L/ac) pour maîtriser le chiendent commun. · Faire un deuxième traitement à raison de 0,38 L/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · **NE PAS** dépasser la dose cumulative de 0,75 L/ha (0,30 L/ac) par saison de croissance. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 80 jours avant la récolte.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,15–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ha	· Appliquer après la levée des betteraves à sucre, quand celles-ci sont au stade 2–4 feuilles, et avant la levée des mauvaises herbes. · NE PAS faire plus de un traitement par saison de croissance. · Respecter un délai d'attente de 120 jours. · **NE PAS** servir aux animaux de fanes de betteraves traitées.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer en POST sur les graminées annuelles en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · **NE PAS** faire pâturer les cultures traitées. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **NE PAS** appliquer d'herbicides autres que LONTREL 360 dans les 4 jours du traitement. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 85 jours avant la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou*** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8-28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
BETAMIX EC ([1:1] 153 g/L) *desmédiphame/phenmédiphame*	Consulter l'étiquette et le transformateur pour connaître les doses à utiliser.		· Appliquer en POST quand les betteraves à sucre ont au moins 2 feuilles vraies. · Appliquer avant que les mauvaises herbes aient 4 feuilles vraies (idéalement 2 feuilles vraies). · Attendre au moins 7 jours avant de faire un second traitement. · Consulter l'étiquette pour connaître les doses (réduites) correspondant aux applications fractionnées. · **NE PAS** utiliser plus de 16,5 L de BETAMIX au total/ha par année. · **NE PAS** utiliser en situations de sécheresse ou de températures extrêmes. · **NE PAS** utiliser en présence de rosée. · La culture peut jaunir temporairement, mais s'en remettra. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent. · Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
LONTREL 360 (360 g/L) *clopyralide*	Consulter l'étiquette et le transformateur pour connaître les doses à utiliser.		· Appliquer en POST lorsque les betteraves à sucre sont entre le stade cotylédons et le stade 8 feuilles. · Respecter un délai d'attente de 90 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PYRAMIN FL (430 g/L) *pyrazone*	Consulter l'étiquette et le transformateur pour connaître les doses à utiliser.		· Appliquer en POST une fois que les betteraves ont des feuilles de 2,5 cm. · **NE PAS** appliquer sur des betteraves au stade cotylédons. · Appliquer avant que les mauvaises herbes aient 3 feuilles vraies. · **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 3 % de matière organique. · Éviter les températures chaudes. · Utiliser au moins 300 L d'eau/ha.
UPBEET (50 DF) plus AGRAL 90 **ou** SURE-MIX *triflusulfuron-méthyl* *plus surfactant non ionique* ***ou** plus adjuvant*	35–70 g/ha 2,5 L/1000 L d'eau 2,5 L/1000 L d'eau *17,5–35 g/ha* *0,25 % v/v* *0,25 % v/v*	14–28 g/ac 2,5 L/1000 L d'eau 2,5 L/1000 L d'eau	· Appliquer en POST quand les betteraves à sucre sont en croissance active. · La culture peut jaunir temporairement, mais s'en remettra. · Faire 2 applications à 5–10 jours d'intervalle lorsque l'abutilon a moins de 2 feuilles. · Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes plus développées et les fortes infestations. · **NE PAS** utiliser plus de 100 g de UPBEET/ha (40 g/ac) au cours d'une saison de croissance. · **NE PAS** utiliser en situations de sécheresse ou de températures extrêmes. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent. · Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
Mélange en cuve de postlevée			
UPBEET (50 DF) BETAMIX ([1:1]150 g/L) *triflusulfuron-méthyl* *plus desmédiphame/* *phenmédiphame*	35–70 g/ha 1,75–3,5 L/ha *17,5–35 g/ha* *0,26–0,53 g/ha*	14–28 g/ac 0,7–1,4 L/ac	· Appliquer en POST quand les betteraves à sucre sont en croissance active. · La culture peut jaunir temporairement, mais s'en remettra. · Faire 2 applications à 5–10 jours d'intervalle, avant que les mauvaises herbes aient 4 feuilles vraies. Pour une efficacité optimale, faire le traitement quand les mauvaises herbes ont moins de 2 feuilles. · Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes plus développées et les fortes infestations. · Si l'abutilon est la mauvaise herbe dominante, il est préférable d'utiliser UPBEET seul avec un adjuvant. · **NE PAS** utiliser d'adjuvant avec ce mélange en cuve. · **NE PAS** utiliser plus de 100 g de UPBEET/ha (40 g/ac) au cours d'une saison de croissance. · **NE PAS** utiliser en situations de sécheresse ou de températures extrêmes. · **NE PAS** utiliser en présence de rosée. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent. · Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
Uniquement sur les cultivars « Roundup Ready » (tolérant le glyphosate)			
ROUNDUP ULTRA2 (540 g/L) **ou** ROUNDUP WEATHERMAX (540 g/L) *glyphsosate*	0,83–1,67 L/ha *0,432–0,9 kg/ha*	0,332–0,67 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** avec de la semence de betterave à sucre sélectionnée (certifiée) désignée « ROUNDUP READY ». · Appliquer sur les mauvaises herbes levées ayant jusqu'à 15 cm de hauteur. · NE PAS dépasser 4 applications par saison de croissance sur les betteraves à sucre tolérant le glyphosate. Attendre au moins 10 jours entre chaque traitement. · **NE PAS** récolter les betteraves à sucre à moins de 30 jours du dernier traitement au glyphosate.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BETTERAVE ROUGE			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-dicotylédones radiculaires			
PYRAMIN FL (430 g/L)	8,25–10,25 L/ha	3,3–4,1 L/ac	· PRÉ — Appliquer dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac). · **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 3 % de matière organique.
pyrazone	*3,54–4,4 kg/ha*		· De la pluie ou un arrosage est nécessaire à l'activation du produit.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L)	1,25 L/ha	0,5 L/ac	· Appliquer avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer à l'aide de matériel d'application terrestre **SEULEMENT** dans au moins 150 L d'eau/ha. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · Si aucune précipitation n'est prévue, irriguer après le traitement afin d'activer l'herbicide; cependant, n'utiliser que 1,27 cm (1/2 po) d'eau pour incorporer l'herbicide. Trop d'eau augmenterait les risques de dommages à la culture. L'incorporation mécanique de DUAL II MAGNUM augmente les risques de dommages à la culture. · NE PAS utiliser DUAL II MAGNUM si le matériel de semis crée un sillon ou une cuvette au-dessus de la raie de semis, où l'eau de pluie ou d'irrigation risque de s'accumuler et de concentrer l'herbicide sur le rang.
s-métolachlore/benoxacor	*1,14 kg/ha*		
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L)	36,5–117 mL/ha	14,8–47 mL/ac	· Appliquer en POST à l'aide d'un à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE** entre les rangs ou entre le paillis de plastique. · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
plus AGRAL 90	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	
ou AG-SURF	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	
ou MERGE	1 L/1000 L	1 L/1000 L	
carfentrazone-éthyle	*8,8–28,1 g/ha*		
plus surfactant non ionique	*0,25 % v/v*		
ou *surfactant/solvant*	*0,1 % v/v*		
PYRAMIN FL (430 g/L)	8,25 L/ha	3,3 L/ac	· Le traitement agit le mieux lorsqu'il est fait avant le stade 3e feuille vraie des betteraves ou des dicotylédones. · Traiter à raison de 300–400 L d'eau/ha (120–160 L/ac). · **NE PAS** employer d'autres huiles ou surfactants, y compris ASSIST ou MERGE, sous peine de nuire aux betteraves.
plus CITOWETT PLUS	2,5 L/1000 L d'eau	2,5 L/1000 L d'eau	
pyrazone	*3,54 kg/ha*		
plus surfactant	*0,25 % v/v*		

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CAROTTE			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Traitement radiculaire suivi d'un traitement anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) suivi de LOROX DF (50 DF) *trifluraline* *suivi de linuron*	1,25–2,4 L/ha 1,2–2,2 L/ha 1,5–2,75 L/ha 1,1–3,25 kg/ha *0,6–1,15 kg/ha* *0,55–1,625 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,94 L/ac 0,6–1,1 L/ac 0,44–1,3 kg/ac	· IPS suivi de POST. · Utiliser sur des sols minéraux. · Appliquer le linuron lorsque la culture a au moins 2 feuilles entièrement déployées (8–15 cm de haut). · Appliquer en POST avant que les graminées annuelles atteignent 5 cm de hauteur et les dicotylédones, 15 cm. · Les fanes des carottes vont jaunir ou pâlir, mais elles retrouveront vite leur couleur normale. · Régler la pression de la buse à 175–275 kPa. **NE PAS** dépasser 275 kPa. · **NE PAS** appliquer le linuron avec une huile herbicide. · **NE PAS** appliquer le linuron par temps chaud et sec (> 32 °C) ni quand la culture est soumise à un stress. · **NE PAS appliquer** le linuron si de fortes pluies sont prévues. · Utiliser la dose inférieure sur des sols sableux et contre les mauvaises herbes plus petites. · **NE PAS** utiliser sur des sols à texture grossière pauvres en matière organique.
GESAGARD 480 SC (480 g/L) suivi de LOROX DF (50 DF) *prométryne* *suivi de linuron*	3,75–7,08 L/ha 1,1–3,25 kg/ha *1,8–3,4 kg/ha* *0,55–1,625 kg/ha*	1,5–2,83 L/ac 0,44–1,3 kg/ac	· PRÉ suivi de POST — Utiliser **UNIQUEMENT** sur les terres noires. · POST — Appliquer quand les carottes ont au moins 2 feuilles entièrement déployées (8–15 cm de haut). · Appliquer avant que les graminées annuelles atteignent 5 cm de hauteur et les dicotylédones, 15 cm. · Les fanes des carottes vont jaunir ou pâlir, mais elles retrouveront vite leur couleur normale. · **NE PAS** appliquer par temps chaud et sec (> 32 °C) ni quand la culture est soumise à un stress. · **NE PAS appliquer** si de fortes pluies sont prévues. · Utiliser la dose inférieure contre les mauvaises herbes plus petites.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LOROX DF (50 DF) suivi de LOROX DF (50 DF) *linuron* *suivi de linuron*	1,1–2,25 kg/ha 2,25–4,5 kg/ha 0,55–1,125 kg/ha 1,125–2,25 kg/ha	0,44–0,9 kg/ac 0,9–1,8 kg/ac 0,44–0,9 L/ac 0,9–1,8 L/ac	· PRÉ suivi de POST. · **NE PAS** faire le 2e traitement moins de 2 semaines après le 1er. · **NE PAS** faire plus de 2 traitements par saison de croissance. · Appliquer en POST lorsque la culture a au moins 2 feuilles entièrement déployées (8–15 cm de haut). · Appliquer en POST avant que les graminées annuelles atteignent 5 cm de hauteur et les dicotylédones, 15 cm. · Les fanes des carottes vont jaunir ou pâlir, mais elles retrouveront vite leur couleur normale. · Régler la pression de la buse à 175–275 kPa. **NE PAS** dépasser 275 kPa. · **NE PAS** appliquer avec une huile herbicide. · **NE PAS** appliquer par temps chaud et sec (> 32 °C) ni quand la culture est soumise à un stress. · **NE PAS appliquer** si de fortes pluies sont prévues. · Utiliser la dose inférieure sur des sols sableux et contre les mauvaises herbes plus petites. · **NE PAS** utiliser sur des sols à texture grossière pauvres en matière organique.
Anti-dicotylédones radiculaires			
GESAGARD 480 SC (480 g/L) *prométryne*	3,75–7,08 L/ha 1,8–3,4 kg/ha	1,5–2,83 L/ac	· PRÉ — Appliquer tout de suite après les semis. · Appliquer à raison de 200–1000 L d'eau/ha (80–400 L/ac). · Utiliser la dose la plus faible sur les sols sableux et la dose la plus élevée sur les terres noires. · **NE PAS** utiliser au moment de la levée des carottes, ni dans les quelques jours qui précèdent ou qui suivent la levée. · **NE PAS** utiliser en POST.
LOROX DF (50 DF) *linuron*	1,1–3,25 kg/ha 0,55–1,625 kg/ha	0,44–1,3 kg/ac	· PRÉ — Faire un traitement en bande ou en pleine surface après le semis, mais avant la levée des carottes. · Diluer dans 200–350 L d'eau/ha (80–140 L/ac). · Appliquer la dose inférieure en terres sablonneuses. · Les carottes sont très sensibles à ce traitement au moment de la levée et peuvent alors subir de lourds dommages en cas de fortes pluies ou d'irrigation.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha 0,576–1,15 kg/ha	0,48–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· Traiter lorsque la majorité des graminées sont au stade 1–6 feuilles ou tant que le maïs spontané ne dépasse pas 25 cm de hauteur. · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 49 jours avant la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer avant que la culture dépasse 10 cm. · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent commun avant les semis rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement. · Tout autre herbicide de POST doit être appliqué à part au moins 3 jours après le traitement au VENTURE L.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
LOROX DF (50 DF) *linuron*	2,25–4,5 kg/ha *1,125–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· Traitement indiqué sur les carottes n'ayant pas été traitées au linuron en PRÉ. · Appliquer quand les carottes ont au moins 2 feuilles entièrement déployées (8–15 cm de haut). · Traiter avant que les graminées annuelles mesurent 5 cm de haut et les dicotylédones, 15 cm. · Les fanes des carottes vont jaunir ou pâlir, mais elles retrouveront vite leur couleur normale. · Régler la pression de la buse à 175–275 kPa. **NE PAS** dépasser 275 kPa. · **NE PAS** appliquer avec une huile herbicide. · **NE PAS** appliquer par temps chaud et sec (> 32 °C) ni quand la culture est soumise à un stress.
huile minérale herbicide traitement généralisé non diluée sur les rangs seulement	600–800 L/ha 300–400 L/ha	240–320 L/ac 120–160 L/ac	· Appliquer dès que les feuilles vraies se développent et avant que les racines des carottes dépassent 5 mm de diamètre. · Des traitements plus tardifs peuvent donner aux carottes un goût d'huile. · Les mauvaises herbes doivent avoir moins de 10 cm de haut. · Inefficace contre l'herbe à poux, l'armoise absinthe et la carotte sauvage.

CÉLERI

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
GESAGARD 480 SC (480 g/L) *prométryne*	3,75–4,58 L/ha *1,8–2,2 kg/ha*	1,5–1,83 L/ac	· **ATTENDRE** que les plants de céleri repiqués soient bien établis (au moins 21 jours après le repiquage). · Appliquer dans 200–1000 L d'eau/ha (80–400 L/ac) dans la culture repiquée. · **NE PAS** traiter des céleris semés en place. · Respecter un délai d'attente de 54 jours avant la récolte.
LOROX DF (50 DF) *linuron*	1,82–4,51 kg/ha *0,91–1,80 kg/ha*	0,73–1,8 kg/ac	· Appliquer sur les plants repiqués dès qu'ils recommencent à pousser. Peut altérer temporairement la couleur de la culture. · Toutes les doses indiquées correspondent à des traitements de pleine surface; réduire proportionnellement les doses pour les traitements en bande. · **NE PAS** appliquer sur des sols sableux ni de texture grossière renfermant moins de 1 % de matière organique, sous peine d'endommager la culture.
huile minérale herbicide traitement généralisé non diluée sur les rangs seulement	 600–800 L/ha 300–400 L/ha	 240–320 L/ac 120–160 L/ac	· Appliquer au moment où les feuilles vraies se développent sur les céleris, avant que les mauvaises herbes aient 10 cm de haut. · Utiliser **UNIQUEMENT** sur les planches de semis à l'extérieur et **UNIQUEMENT** si le sol est humide.
CHICORÉE À CAFÉ			
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
UPBEET (50 DF) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF *triflusulfuron-méthyl* *plus surfactant non ionique*	35–70 g/ha 2,5 L/1000 L *17,5–35 g/ha* *0,25 % v/v*	14–28 g/ac 2,5 L/1000 L	· Contre l'abutilon dans la chicorée. · Appliquer en POST après la levée de la chicorée et de l'abutilon, mais avant le stade 4 feuilles de l'abutilon. · Appliquer dans 300–1100 L d'eau/ha (120–440 L/ac). · **NE PAS** dépasser 70 g/ha par saison de croissance. · Si la dose inférieure a été utilisée et que l'abutilon continue de lever, répéter le traitement après 2–3 semaines.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.

CHOU, CHOU-FLEUR, BROCOLI, CHOU DE BRUXELLES

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-graminées radiculaires			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha *1,12–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· IPS ou PRÉ — Utiliser **UNIQUEMENT** sur des choux, choux-fleurs et brocolis repiqués. · Faire **SEULEMENT** une application par année. · Utiliser la dose inférieure dans des sols légers (sols sableux à texture grossière et loams sableux). · Appliquer sur des sols bien travaillés et assez secs pour permettre une incorporation à une profondeur de 2,5–5,0 cm. · Incorporer le même jour que l'application. · Après la récolte, il est conseillé de travailler le sol perpendiculairement aux rangs afin d'éviter d'endommager les cultures suivantes. Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon. · **NE PAS** récolter à moins de 60 jours du traitement.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· Appliquer dans les 2 jours qui suivent le repiquage, avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser la dose supérieure si l'infestation est forte. · Appliquer à l'aide de matériel d'application terrestre **SEULEMENT** en utilisant 300 L d'eau/ha. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **NE PAS** incorporer au sol et ne pas utiliser sur des semis de crucifères. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 1 % ni plus de 10 % de matière organique. · **Utiliser UNIQUEMENT** sur des choux, choux-fleurs et brocolis repiqués.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–15,5 kg/ka *6,75–11,625 kg/ha*	3,6–6,2 kg/ac	· IPS ou PRÉ. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · Appliquer immédiatement après les semis ou directement sur les plants repiqués, avant la levée des mauvaises herbes. · Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,5–0,92 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. · Utiliser **UNIQUEMENT** sur choux ou choux-fleurs semés en place ou sur choux, choux-fleurs, brocolis et choux de Bruxelles repiqués.
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· **Non homologué sur les choux de Bruxelles.** · Traiter lorsque la majorité des graminées sont au stade 1–6 feuilles ou tant que le maïs spontané ne dépasse pas 25 cm de hauteur. · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur le chou de Bruxelles. · **NE PAS** dépasser 0,45 L/ha sur le brocoli. · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles du chiendent commun. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 70 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L)	0,8–2 L/ha	0,32–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. • Une seule application par saison de croissance.
fluazifop-p-butyl	*0,1–0,25 kg/ha*		• Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. • Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. • Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). • Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. • Pour améliorer les chances de réussite, bien travailler le sol avant le semis, en prenant soin de sectionner les rhizomes de chiendent commun. • Traiter une seule fois par saison de croissance. • **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	• Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** • Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. • Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). • **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. • Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
carfentrazone-éthyle *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	*8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*		
LONTREL 360 (360 g/L)	0,56 L/ha	0,2 L/ac	• Appliquer **APRÈS LE REPIQUAGE** par application terrestre **SEULEMENT,** dans 300 L d'eau/ha. • **NE PAS** dépasser une application par année. Celle-ci ne doit pas se faire à moins de 30 jours de la récolte. • **Utiliser UNIQUEMENT** sur des choux, choux-fleurs et brocolis repiqués.
clopyralide	*0,20 kg/ha*		
CONCOMBRE			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Présemis (technique du semis sur sol rassis)			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)*	0,75–3,5 L/ha 0,56–2,6 L/ha 0,54–2,5 L/ha 0,5–2,3 L/ha	0,3–1,4 L/ac 0,22–1 L/ac 0,21–1 L/ac 0,2–0,92 L/ac	• Travailler et fertiliser le sol au début du printemps, puis laisser les mauvaises herbes pousser. • Appliquer sur les mauvaises herbes juste avant de semer la culture. • Utiliser la dose inférieure pour les petites mauvaises herbes (8 cm), une dose moyenne pour les mauvaises herbes de 8–15 cm de hauteur et la dose supérieure pour les mauvaises herbes hautes de plus de 15 cm. • Appliquer les herbicides de PRÉ ou de POST recommandés pour maîtriser de nouvelles flambées de mauvaises herbes ou désherber par une méthode mécanique.
*glyphosate**	*0,267-1,246 kg/ha*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées radiculaires			
PREFAR (480 g/L) *bensulide*	12–14 L/ha 5,75–6,75 kg/ha	4,8–5,6 L/ac	· IPS — pour sols minéraux **UNIQUEMENT**. · Bien incorporer dans le sol à une profondeur de 2,5–5 cm.
Anti-dicotylédones radiculaires			
ALANAP (240 g/L) *naptalame*	11–30 L/ha 2,64–7,19 kg/ha	4,4–12 L/ac	· PRÉ — Traiter après les semis de concombres, mais avant la levée des mauvaises herbes. · On peut aussi appliquer ALANAP en POST, environ un mois après le traitement de PRÉ, après un sarclage.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–15,5 kg/ka 6,75–11,625 kg/ha	3,6–6,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · Traiter uniquement lorsque les plants de concombre ont 4–5 feuilles vraies, qu'ils sont bien établis et que les conditions de croissance sont favorables à la bonne croissance des plants, sous peine de voir la culture souffrir temporairement du traitement. · Appliquer avant la germination des graines de mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
PREFAR (480 g/L) suivi d'ALANAP (240 g/L) *bensulide* *suivi de naptalame*	9,5–14 L/ha 9,5–19 L/ha 4,56–6,75 kg/ha 2,28–4,56 kg/ha	3,8–5,6 L/ac 3,8–7,7 L/ac	· **Appliquer PREFAR par IPS** (en l'incorporant à une profondeur de 2,5–5 cm), et faire suivre le traitement d'une application **d'ALANAP en PRÉ**. · Peut aussi être mélangé en cuve et être appliqué par IPS. **(NE PAS incorporer à plus de 2,5 cm dans le sol).** · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Utiliser la dose inférieure sur des sols légers et sableux.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L 8,8–28,1 g/ha 0,25 % v/v 0,1 % v/v	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1-2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Pour améliorer les chances de réussite, bien travailler le sol avant le semis, en prenant soin de sectionner les rhizomes de chiendent commun. · **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement. · **Ne faire qu'une** application par saison de croissance.
ÉPINARD			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1-2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. Une application par année. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 15 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

FINES HERBES

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,2–4,4 kg/ha *1,1–2,2 kg/ha*	0,88–1,76 kg/ac	· PRÉ ou IPS — Utiliser sur le basilic **UNIQUEMENT**. · Appliquer dans 200–900 L d'eau/ha (80–360 L/ac). · **Une SEULE** application par année. · **Pour éviter de les endommager, NE PAS** planter de cultures non mentionnées sur l'étiquette moins de 12 mois après le traitement. · L'utilisation de la dose supérieure peut ralentir momentanément la croissance de la culture. Cependant, les cultures se remettent de ce retard et le rendement n'est pas affecté.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	1,75 kg/ha *1,4 kg/ha*	0,7 kg/ac	· PRÉ — Utiliser sur la menthe poivrée et la menthe verte **UNIQUEMENT**. · Appliquer une seule fois par saison de croissance, fin septembre-début octobre. · **Respecter** un délai d'attente de 9–10 mois avant la récolte. · **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 1 % de matière organique.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–0,65 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,29 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,19 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Utiliser sur la menthe poivrée et la menthe verte **UNIQUEMENT**. · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Pour ralentir la croissance du chiendent commun, utiliser 0,65 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 110–200 L d'eau/ha (44–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GINSENG			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Traitement à faire en présemis ou avant la levée de la culture (technique du semis sur sol rassis)			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	2,5 L/ha 1,86 L/ha 1,8 L/ha 1,67 L/ha *0,75–0,9 kg/ha*	1,0 L/ac 0,75 L/ac 0,72 L/ac 0,67 L/ac	· Appliquer après la levée des mauvaises herbes au printemps mais avant que la culture ait levé de terre. · Appliquer dans 50–100 L d'eau/ha. · **NE PAS** dépasser la dose ni le volume de bouillie, sous peine d'endommager la culture. · **NE PAS** laisser la bouillie entrer en contact avec le feuillage en croissance active du ginseng. · **NE PAS** employer l'automne dans des jardins existants/établis.
Anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,8–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,32–0,8 L/ac	· Appliquer en POST jusqu'à 3 fois par année, soit début mai, fin juin et/ou mi-août. · Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active avant le tallage. · **NE PAS** faire ce traitement l'année de la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
HARICOTS DE LIMA ET MANGE-TOUT — Voir le chapitre 7, *Haricots*, p. 95.			
LAITUE			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
KERB (50 WSP) *propyzamide*	2,2 kg/ha *1,1 kg/ha*	0,83 kg/ac	· Dans la laitue semée en place, appliquer par IPS, en PRÉ ou en POST après la levée de la culture dans un sol exempt de mauvaises herbes. · Dans la laitue repiquée, appliquer 7–10 jours après le repiquage dans un sol exempt de mauvaises herbes. · Faire ce traitement une seule fois par année. · **NE PAS** ressemer de laitue dans des champs traités au KERB la même année. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · **Respecter** un délai d'attente de 55 jours avant la récolte.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

LÉGUMES DE SPÉCIALITÉ : BROCOLI DE CHINE, CHOU DE CHINE (PÉ-TSAI), CHOU-RAVE, MOUTARDE À FEUILLE DE CHOU, RADIS CHINOIS, COURGE CENDRÉE ET POIS CHINOIS

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha *1,12–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· PRÉ ou PRÉSEMIS — Utiliser **UNIQUEMENT** sur le brocoli de Chine, la moutarde, le chou, le radis chinois, la moutarde à feuilles de chou, le chou de Chine semés en place et sur le chou de Chine et le chou-rave repiqués. · Utiliser la dose inférieure dans des sols légers (sols sableux à texture grossière et loams sableux). · **Une SEULE** application par année. Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la récolte. · Après la récolte, il est conseillé de travailler le sol (perpendiculairement aux rangs si l'herbicide a été appliqué en bandes) afin d'éviter d'endommager les cultures suivantes. · Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	3 kg/ha *1,5 kg/ha*	1,2 kg/ac	· IPS — Utiliser **UNIQUEMENT** sur les plants repiqués de courge cendrée. · Pour que ce traitement soit efficace, il doit être rapidement suivi d'une pluie ou d'un arrosage qui mouille le sol sur une profondeur de 5–10 cm. · Ce traitement ralentit la croissance de la culture sans toutefois affecter les rendements.
PURSUIT (240 g/L) *imazéthapyr*	0,312 L/ha *0,075 kg/ha*	0,125 L/ac	· PRÉ — Traitement destiné aux pois mange-tout **SEULEMENT**. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Appliquer dans 200 L/ha (80 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** sur le brocoli de Chine, le chou de Chine, le chou-rave, la moutarde à feuille de chou, le radis chinois et les pois mange-tout. · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Appliquer à raison de 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac). · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser la dose de 0,32 L/ha **UNIQUEMENT** dans les pois mange-tout. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou*** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75 L/ha 1–2 L/ha *0,84 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Traitement destiné aux pois mange-tout **SEULEMENT**. · Appliquer après que la culture a atteint le stade 3 feuilles, quand les mauvaises herbes sont petites et en croissance active. · Faire **SEULEMENT** une application par année. · Appliquer dans 300 L d'eau/ha. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
LONTREL 360 (360 g/L) *clopyralide*	0,56 L/ha *0,20 kg/ha*	0,2 L/ac	· Ne faire ce traitement **QUE** sur le pé-tsai, le radis chinois, la moutarde à feuille de chou et le brocoli de Chine. · Traiter quand les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active. · Faire une application terrestre dans 300 L d'eau/ha. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte. · Inefficace contre les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
MELON BRODÉ, MELON D'EAU, COURGE ET CITROUILLE			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-dicotylédones radiculaires			
ALANAP (240 g/L) *naptalame*	11–30 L/ha *2,638–7,194 kg/ha*	4,4–12 L/ac	· **PRÉ** avant la levée de la culture et des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur les courges Butternut; le traitement risque aussi de nuire à la courge reine-de-table. · Peut être appliqué sur les melons (**PAS** sur les courges ni sur les citrouilles) environ 1 mois après le traitement de PRÉ, après la levée de la culture, mais avant celle des mauvaises herbes.
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1.15 L/ha *1,05 kg/ha*	0,46 L/ac	· Utiliser UNIQUEMENT sur la citrouille et la courge d'automne. · Appliquer en PRÉ avant la levée des mauvaises herbes dans des cultures semées directement au champ OU au stade 1–2 feuilles de la citrouille ou de la courge d'hiver, mais toujours avant la levée des mauvaises herbes. · Ne faire qu'une seule application par année. · **Respecter** un délai d'attente de 65 jours avant la récolte. · Prévoir une efficacité réduite du traitement si l'infestation est forte.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–15,5 kg/ka *6,75–11,625 kg/ha*	3,6–6,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** utiliser sur les citrouilles. · Traiter uniquement lorsque les plants ont 4–5 feuilles vraies, qu'ils sont bien établis et que les conditions de croissance sont favorables à la bonne croissance des plants, sous peine de voir la culture souffrir du traitement. · Appliquer avant la germination des graines de mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF)	2,24–4,5 kg/ha	0,9–1,8 kg/ac	· PRÉ — Une seule application par saison de croissance. · Utiliser **UNIQUEMENT** sur les citrouilles et courges semées en place.
napropamide	*1,12–2,25 kg/ha*		· Appliquer dans 200–900 L d'eau/ha (80–360 L/ac). · Utiliser la dose inférieure sur des sols légers (sols à texture grossière, sols sableux ou loams sableux). · À cette dose, la bourse-à-pasteur et la renouée persicaire peuvent échapper au traitement. · Appliquer avant la pluie si l'irrigation n'est pas disponible. · Travailler le sol après la récolte (en travers des rangs) afin de prévenir les dommages aux cultures subséquentes. Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Utiliser **UNIQUEMENT** sur les citrouilles et courges. · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles.
séthoxydime *plus surfactant/solvant*	*0,15–0,2 kg/ha* *1–2 L/ha*		· Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte.
carfentrazone-éthyle *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	*8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*		· Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
OIGNON			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
La plupart des traitements herbicides conseillés ci-dessous concernent les oignons de semis. Ils donnent aussi de bons résultats avec les oignons à repiquer. De même, les quelques essais effectués avec les oignons espagnols ont été concluants. En ce qui concerne les oignons verts à botteler, il est recommandé d'épandre (lorsque les feuilles sont sèches) des herbicides en granulés pour ne pas léser les feuilles.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,14 kg/ha *0,07 kg/ha*	0,05 kg/ac	· Traiter une fois par saison de croissance. · Appliquer entre les stades de 2 à 6 feuilles sur les oignons repiqués, et entre les stades de 3 à 6 feuilles sur les oignons semés directement en pleine terre, avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer sur tous les types de sol renfermant moins de 5 % de matière organique. · Utiliser du matériel d'application terrestre UNIQUEMENT. · **NE PAS** appliquer ce produit à l'aide d'un système d'irrigation. · La culture subira de graves dommages si le sol est inondé après l'application de l'herbicide ou si les applications sont effectuées dans des sols mal drainés et/ou dans des conditions froides et pluvieuses.
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–18 kg/ka *6,75–13,5 kg/ha*	3,6–7,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · Appliquer à raison de 18 kg/ha (7,2 kg/ac) sur des argiles lourdes. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · Appliquer immédiatement après les semis ou directement sur les plants repiqués, avant la levée des mauvaises herbes. · Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· Traiter lorsque la majorité des graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles ou tant que le maïs spontané ne dépasse pas 25 cm de hauteur. · Ce traitement est sans effet contre la deuxième flambée de graminées annuelles qui pourraient lever par la suite. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit.
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide*	1,29 L/ha *0,93 kg/ha*	0,52 L/ac	· Appliquer **UNIQUEMENT** quand les oignons sont au stade de la crosse. · S'il est appliqué avant la levée du souchet comestible, FRONTIER MAX maîtrise temporairement cette plante dans les oignons de garde cultivés en sols organiques. · Appliquer une seule fois par saison de croissance. · Ne pas appliquer dans les 60 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
FRONTIER (900 g/L) *diméthénamide*	1,87 L/ha *1,68 kg/ha*	0,75 L/ac	· Appliquer **UNIQUEMENT** quand les oignons sont au stade de la crosse. · FRONTIER freine la croissance du souchet comestible quand il est appliqué avant sa levée. · Appliquer une seule fois par saison de croissance. · Ne pas appliquer dans les 60 jours avant la récolte.
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· S'utilise sur les oignons de garde **SEULEMENT**. · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 50 jours avant la récolte.
SELECT (240 g/L) *cléthodime*	0,125–0,38 L/ha *0,03–0,09 kg/ha*	0,05–0,15 L/ac	· Contre le pâturin annuel, d'autres graminées annuelles et le chiendent commun. · Utiliser 0,38 L/ha pour maîtriser le chiendent commun. · Voir l'étiquette de SELECT pour de l'information détaillée sur les doses permettant de maîtriser toutes les graminées annuelles. · Appliquer au stade 1–4 feuilles de la culture lorsque les mauvaises herbes ont entre 2 et 6 feuilles.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Appliquer dans un volume maximal de 300 L/ha (120 L/ac). · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent commun avant les semis rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement. · **Respecter** un délai d'attente de 42 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou*** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
GOAL 2XL (240 g/L) *oxyfluorfène*	0,5 L/ha *0,12 kg/ha*	0,2 L/ac	· Appliquer **une fois que** les oignons **ont** 2 feuilles entièrement déployées. · Traiter à raison de 500 L d'eau/ha (200 L/ac). · **NE PAS** appliquer plus de 2,0 L/ha (0,8 L/ac) par année.
PARDNER (280 g/L) *bromoxynil*	0,5 L/ha *0,14 kg/ha*	0,2 L/ac	· Utiliser UNIQUEMENT sur les oignons de garde. · Appliquer en POST sur le séneçon vulgaire et des amarantes en croissance active jusqu'au stade 4 feuilles. · Appliquer quand les oignons sont au stade 2–3 feuilles et répéter le traitement quand ils sont au stade 4–5 feuilles. · Appliquer dans 200 L d'eau/ha (100 L/ac) à une pression de 170 kPa (25 psi). · **Respecter** un délai d'attente de 75 jours avant la récolte. · PARDNER risque de brûler gravement les feuilles d'oignons si les conditions météorologiques ne sont pas propices à la formation de la cuticule cireuse (couche cireuse externe) des feuilles.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
PROWL 400 (400 g/L) *pendiméthaline*	2,5–3,75 L/ha *1–1,5 kg/ha*	1–1,5 L/ac	· Dans les sols minéraux, on l'utilise sur les oignons de garde semés en place. · Appliquer lorsque les oignons sont au stade 2–6 feuilles pour maîtriser les mauvaises herbes pendant toute la saison de croissance. · Détruire les mauvaises herbes existantes avant le traitement.
PROWL 400 (400 g/L) *pendiméthaline*	7,5 L/ha *3 kg/ha*	3 L/ac	· Dans les terres noires, s'utilise sur les oignons de garde semés en place. · Appliquer lorsque les oignons sont au stade de la crosse et/ou au stade 2 feuilles pour maîtriser les mauvaises herbes pendant toute la saison de croissance. · Détruire les mauvaises herbes existantes avant le traitement.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PANAIS			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
LOROX DF (50 DF) *linuron*	1,25–2,4 kg/ha *0,625–1,2 kg/ha*	0,5–0,96 kg/ac	· Appliquer tout de suite après les semis. · Enfouir les semences à au moins 1,3 cm de profondeur. · Utiliser une dose de 1,25–1,82 kg/ha sur des sols loameux ou des sols argileux renfermant peu de matière organique. · Utiliser une dose de 1,82–2,4 kg/ha sur les terres noires ou dans des sols argileux ayant une teneur en matière organique moyenne. · Des pluies ou des arrosages abondants au moment de la levée peuvent endommager la culture. · Un traitement de postlevée supplémentaire peut être nécessaire. · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
LOROX DF (50 DF) suivi de LOROX DF (50 DF) *linuron* *suivi de linuron*	1,25–1,82 kg/ha 1,25–2,4 kg/ha *0,625–0,91 kg/ha* *0,625–1,2 kg/ha*	0,5–0,73 kg/ac 0,5–0,96 kg/ac	· PRÉ (maximum de 1,82 kg/ha), suivi de POST (maximum de 2,4 kg/ha). · Espacer ces traitements d'au moins 2 semaines, sous peine d'endommager la culture. · **NE PAS** faire plus de 2 traitements par saison de croissance et **NE PAS** utiliser de doses plus élevées. · Lire attentivement les directives concernant les applications en PRÉ et en POST avant de recourir à ce traitement.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou*** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
LOROX DF (50 DF) *linuron*	1,82–4,51 kg/ha *0,91–2,26 kg/ha*	0,73–1,80 kg/ac	· Appliquer quand la culture compte au moins 2 feuilles entièrement déployées. · Utiliser les doses inférieures sur les jeunes plantules de mauvaises herbes et les doses supérieures sur les mauvaises herbes établies. · Dans les terres noires, attendre que le panais fasse plus de 8 cm de hauteur avant de faire le traitement. · **NE PAS** mélanger avec de l'huile herbicide ou un autre surfactant. · Appliquer dans 220–440 L d'eau/ha (80–176 L/ac). · Appliquer avant que les graminées annuelles dépassent 5 cm et les dicotylédones, 15 cm. · Par temps chaud et sec, faire la pulvérisation au moment de la journée où les températures sont plus fraîches afin d'éviter d'endommager la culture. · Veiller à ce que la pression des buses ne dépasse pas 275 kPa (40 psi), sous peine d'endommager la culture. · LOROX DF peut être appliqué après un traitement à l'huile de carotte pourvu qu'il y ait un intervalle de 1 journée entre les traitements. · De l'huile de carotte peut être appliquée à la suite de LOROX L pourvu qu'il y ait un intervalle de 2 semaines entre les traitements. Des intervalles plus courts risquent de se traduire par des dommages à la culture. · **Si des pluies anormalement abondantes suivent le traitement, la culture peut en souffrir gravement.** · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
huile minérale herbicide traitement généralisé non diluée sur les rangs seulement	600–800 L/ha 300–400 L/ha	240–320 L/ac 120–160 L/ac	· Appliquer dès que les feuilles vraies se développent et avant que les racines des panais dépassent 5 mm de diamètre. · Des traitements plus tardifs peuvent donner aux panais un goût d'huile. · Les mauvaises herbes doivent avoir moins de 10 cm de haut.

PATATE DOUCE

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
COMMAND 360 ME (360 g/L) *clomazone*	1,55 L/ha *0,558 kg/ha*	0,62 L/ac	· Appliquer une seule fois à la surface du sol **après le repiquage** et avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer dans un minimum de 95 L d'eau/ha (38 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 95 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–18 kg/ka *6,75–13,5 kg/ha*	3,6–7,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · Appliquer à raison de 18 kg/ha (7,2 kg/ac) sur des argiles lourdes. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · Appliquer directement sur les plants repiqués, avant la levée des mauvaises herbes. · Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1,0–2,0 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Appliquer à raison de 110–200 L d'eau/ha (44–80 L/ac). · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.

POIREAU

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
GESAGARD 480 SC (480 g/L) *prométryne*	3,75 L/ha *1,8 kg/ha*	1,5 L/ac	· Faire 2 applications à 10 jours d'intervalle, avant que les mauvaises herbes atteignent 5 cm de hauteur. · Faire la première application après que les poireaux repiqués se seront bien établis et auront produit une nouvelle feuille entièrement déployée. · S'utilise dans des terres noires et des sols minéraux. · **NE PAS** faire plus de 2 applications par année. · Les feuilles inférieures de certains cultivars peuvent souffrir momentanément du traitement.

POIS

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· Appliquer en PRÉ. · **NE PAS** utiliser sur des terres noires, des sols tourbeux ni des sols qui sont riches en matière organique ou qui en renferment moins de 1 %. · Utiliser la dose supérieure en présence de fortes infestations. · Appliquer uniquement à l'aide de matériel d'application terrestre.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–1,7 L/ha 1,2–1,6 L/ha 1,5–2 L/ha *0,6–0,8 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,9–1,38 L/ac 0,6–0,8 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. · **NE PAS** dépasser la dose inférieure sur les sols à texture moyenne. · **NE PAS** appliquer sur des sols tourbeux ni sur des terres noires (renfermant plus de 15 % de matière organique). · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des champs qui ont reçu du fumier dans les 12 moins précédents. · **NE PAS** appliquer par aéronef.
Anti-dicotylédones radiculaires			
GESAGARD 480 (480 g/L) *prométryne*	3,75–4,58 L/ha *1,8–2,2 kg/ha*	1,5–1,83 L/ac	· Appliquer en PRÉ — Traiter avant la levée des mauvaises herbes, y compris la morelle noire de l'Est. · Appliquer à raison de 200–1000 L d'eau/ha (80–400 L/ac). · Faire une seule application par année. · Utiliser la dose inférieure sur les sols sableux. · Respecter un délai d'attente de 55 jours avant la récolte.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
PURSUIT (240 g/L) *imazéthapyr*	0,312 L/ha *0,075 kg/ha*	0,125 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. · Faire une seule application par année. · Laisser s'écouler au moins 24 mois entre deux applications par IPS. · Respecter un délai d'attente de 50 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur les graminées annuelles en croissance active. • Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). • Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). • Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. • Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). • Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. • **NE PAS** appliquer d'herbicides autres que MCPA SODIUM 300 ou PURSUIT dans les 4 jours qui suivent le traitement. • **NE PAS** faire pâturer les cultures traitées. • Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. • **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. • **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. • **Utiliser UNIQUEMENT** sur les pois frais ou secs de transformation, **MAIS NON** sur les pois frais à gousses comestibles. • Le délai d'attente avant la récolte est de 30 jours pour les pois frais de transformation. • Le délai d'attente avant la récolte est de 60 jours pour les pois secs.
séthoxydime *surfactant/solvant*	*0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*		
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	• Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** • Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. • Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). • **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. • Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
carfentrazone-éthyle *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	*8,8-28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*		

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BASAGRAN (480 g/L) plus SUPER SPREADER **ou** ASSIST *bentazone* *plus surfactant* **ou** *concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1,25–2,5 L/1000 L 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *0,125–0,25 % v/v*	0,7–0,9 L/ac 1,25–2,5 L/1000 L 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer en POST lorsque les pois ont au moins 3 paires de feuilles. · Sous des conditions chaudes et humides, réduire la dose de concentré d'huile ASSIST à 1 L/ha (0,4 L/ac). · Sur les pois mange-tout, utiliser la dose inférieure de 1,75 L/ha (0,7 L/ac) et faire le traitement une seule fois par année. · Voir l'étiquette de BASAGRAN pour des détails sur le stade de croissance et la hauteur des différentes mauvaises herbes. · Deux traitements à raison de 1,75 L/ha (0,7 L/ac) à 10 jours d'intervalle permettent de détruire la partie aérienne du souchet et du chardon et limitent la croissance du liseron des champs. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 6 heures qui suivent. · Le délai d'attente avant la récolte est de 30 jours pour les pois mange-tout.
MCPA SODIUM 300 (300 g/L)* **ou** MCPA AMINE (500 g/L)* *MCPA** **ou** *MCPA**	1,25 L/ha 0,7 L/ha *0,38 kg/ha* *0,35 kg/ha*	0,5 L/ac 0,28 L/ac	· Appliquer en POST lorsque les pois ont 10–15 cm de haut. · **NE PAS** appliquer après que les boutons se sont formés. · **NE PAS** traiter en cas de sécheresse ou de forte humidité ou sous des températures dépassant 27 °C. · **NE PAS** appliquer par aéronef.
TROPOTOX PLUS (400 g/L) **ou** CLOVITOX PLUS (400 g/L) **ou** TOPSIDE (400 g/L) *MCPB/MCPA*	2,75–4,25 L/ha *1,1–1,7 kg/ha*	1,1–1,7 L/ac	· Appliquer en POST lorsque les pois ont 3–6 feuilles déployées. · **NE PAS** appliquer passé le stade 6 feuilles, sous peine d'endommager la culture. · **NE PAS** traiter en cas de sécheresse ou de forte humidité ou sous des températures dépassant 27 °C. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **NE PAS** faire pâturer la culture traitée ni la servir comme fourrage. · **Partie aérienne seulement :** chardon des champs, renoncule rampante, liseron des champs, prêle, laiteron des champs, renoncule âcre.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
POIVRON			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Appliquer tous les traitements dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac). Voir la section *Tomate repiquée, p. 278*, pour de plus amples renseignements sur les méthodes culturales. Le désherbage des poivrons associe la lutte chimique et les méthodes culturales.			
Anti-graminées radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,58–1,15 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. · **NE PAS** dépasser la dose inférieure sur les sols à texture moyenne. · **NE PAS** appliquer sur des sols tourbeux ni sur des terres noires (renfermant plus de 15 % de matière organique). · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des champs qui ont reçu du fumier dans les 12 moins précédents. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **NE PAS** appliquer sur la même terre pendant 2 années consécutives.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,15–1,25 L/ha *1,05–1,14 kg/ha*	0,46–0,5 L/ac	· Appliquer dans les 48 heures suivant le repiquage des poivrons et AVANT LA LEVÉE des mauvaises herbes. · Le risque de dommage à la culture s'accroît si le repiquage est hâtif et que les températures du sol sont inférieures à 10°C. · Les applications faites plus de 48 heures après le repiquage risquent davantage d'endommager le feuillage. · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la récolte des poivrons. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 1 % ni plus de 10 % de matière organique. · Ne faire qu'une seule application par année. · Utiliser un minimum de 150 L d'eau/ha.
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	9–15,5 kg/ka *6,75–11,625 kg/ha*	3,6–6,2 kg/ac	· Appliquer en PRÉ. · Traiter 4–6 semaines après le repiquage. · Appliquer à raison de 9–13,5 kg/ha (3,6–5,4 kg/ac) sur des sables légers ou des loams sableux. · Appliquer à raison de 11–15,5 kg/ha (4,4–6,2 kg/ac) sur des loams limoneux moyens. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · Appliquer dans 250 L d'eau/ha (100 L/ac). · Si les mauvaises herbes sont déjà levées, travailler le sol avant le traitement. · De la pluie ou un arrosage (sur environ 1 cm) est nécessaire à l'activation du produit.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha *1,12–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant plus de 10 % de matière organique. · Après la récolte, il est conseillé de travailler le sol perpendiculairement aux rangs afin d'éviter d'endommager les cultures suivantes. Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

POMME DE TERRE

Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Un bon désherbage des pommes de terre associe des méthodes culturales et des interventions chimiques. Voir le chapitre 1, *Principes de lutte intégrée, p. 1*. Un sarclage avant la levée des pommes de terre à l'aide de différents instruments (herse légère, bineuse, butteuse, etc.) détruit la première flambée de mauvaises herbes. Il faut s'efforcer de sectionner le moins possible les racines des pommes de terre. Un buttage effectué après le traitement chimique a pour effet de laisser en surface des zones de sol non traité où une nouvelle flambée de mauvaises herbes pourra lever.

· **DÉFANAGE** — Pour de plus amples renseignements sur les défanants et les doses, consulter la publication 363F du MAARO, *Recommandations pour les cultures légumières*, et suivre le mode d'emploi des produits.

Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· PRÉ ou par IPS (pour la maîtrise du souchet). · **NE PAS** utiliser sur le cultivar Superior. · **NE PAS** appliquer sur un sol sableux ou de texture grossière pauvre en matière organique. · **NE PAS** appliquer au moment où les pommes de terre sont au stade de la percée du sol ni après la levée.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
EPTAM (800 g/L) *EPTC*	4,25–8,5 L/ha *3,4–6,8 kg/ha*	1,7–3,4 L/ac	• IPS — Appliquer avant le semis sur un sol sec en surface et incorporer immédiatement, à l'avant-dernière ou à la dernière opération de travail du sol destinée à lutter contre les mauvaises herbes ayant échappé aux traitements. Utiliser 1,7 à 2,2 L/ac. • Ce traitement est peu efficace quand il est effectué sur un sol mouillé. • Utiliser 2,2–3,4 L/ac contre les fortes infestations et la lutte contre le souchet.
Anti-dicotylédones radiculaires			
LOROX DF (50 DF) *linuron*	2,2–4,3 kg/ha *1,1–2,16 kg/ha*	0,88–1,72 kg/ac	• PRÉ — Appliquer immédiatement après le buttage, à condition que toutes les pousses soient recouvertes de terre, sinon les plants subiront des dommages. • Utiliser la dose inférieure sur des sols légers et sableux et la dose supérieure sur des sols organiques ou argileux.
SENCOR 480 F (480 g/L) *métribuzine*	1,2–2,2 L/ha *0,6–1,1 kg/ha*	0,48–0,88 L/ac	• PRÉ — Traiter après le buttage, mais avant la sortie des mauvaises herbes ou des plants de pommes de terre ou en POST avant que les mauvaises herbes aient 4 cm de haut. • Utiliser la dose inférieure en sols sableux. • **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. • **NE PAS** utiliser sur les cultivars Belleisle, Tobique ni sur les pommes de terre rouges. • **NE PAS** dépasser la dose totale de 1,1 kg de matière active/ha.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus LOROX L (480 g/L) *métribuzine* *plus linuron*	0,84–1,1 kg/ha 1,5–3,59 L/ha *0,63–0,825 kg/ha* *0,72–1,728 kg/ha*	0,34–0,44 kg/ac 0,6–1,44 L/ac	• PRÉ — Traiter après le buttage, mais avant la sortie des plants de pommes de terre ou en POST avant que les mauvaises herbes aient 4 cm de haut. • Utiliser la dose inférieure en sols sableux. • Pour maîtriser les mauvaises herbes pendant toute la saison, utiliser la dose supérieure sur les pommes de terre tardives. • **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. • **NE PAS** utiliser sur les cultivars Belleisle, Tobique ni sur les pommes de terre rouges.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,105 kg/ha *0,054 kg/ha*	0,042 kg/ac	• **NE PAS** appliquer après la levée de la culture (fendillement du sol). • Appliquer une seule fois par saison de croissance après le buttage pour détruire en pré-levée la partie aérienne des mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette. • Un minimum de 5 cm de sol doit couvrir les plants de pommes de terre au moment du traitement. • Appliquer sur tous les types de sol renfermant moins de 5 % de matière organique. • Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. • **NE PAS** appliquer ce produit à l'aide d'un système d'irrigation. • La culture pourrait subir des dommages si l'herbicide est appliqué au buttage.
Choix de mélanges en cuve d'herbicides radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LOROX DF (50 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus linuron*	1,25–1,75 L/ha 1,75–2,25 kg/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,88–1,12 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,7–0,9 kg/ac	• PRÉ — Appliquer après le premier buttage, avant la sortie des mauvaises herbes et des plants de pommes de terre. • Voir ci-dessus les précautions relatives à DUAL II MAGNUM et à LOROX DF.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus SENCOR 480 F (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,25 L/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,55–1,125 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–0,9 L/ac	· IPS ou PRÉ — Appliquer après le premier buttage, avant la sortie des mauvaises herbes et des plants de pommes de terre. · Voir ci-dessus les précautions relatives à DUAL II MAGNUM. · **NE PAS** appliquer sur les cultivars Superior, Belleisle ni Tobique. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux ou à texture grossière pauvres en matière organique, ni sur des terres noires. · **NE PAS** appliquer au moment où les pommes de terre sont au stade de la percée du sol ni après la levée.
EPTAM (800 g/L) plus SENCOR 480 F (480 g/L) *EPTC* *plus métribuzine*	4,25–5,5 L/ha 1,1–1,75 L/ha *3,4–4,4 kg/ha* *0,55–0,875 kg/ha*	1,7–2,2 L/ac 0,44–0,7 L/ac	· Appliquer par IPS. · Mélanger en cuve et appliquer à raison de 220–330 L d'eau/ha (88–132 L/ac) et incorporer immédiatement. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. · **NE PAS** traiter les cultivars Belleisle ni Tobique.
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	3–4,25 L/ha *0,6–0,85 kg/ha*	1,2–1,7 L/ac	· Traiter à raison de 275–550 L d'eau/ha (150–220 L/ac) quand les mauvaises herbes sont levées. · Traiter les cultivars Nettled Gem et Cherokee avant la levée. Sur les autres cultivars, traiter au plus tard quand 25–30 % des plants sont sortis de terre, mais qu'aucun ne dépasse 5–8 cm. Les pousses jaunissent temporairement après le traitement. · **NE PAS** traiter le soir sur des plants de pommes de terre levés, quand le temps est nuageux ou lorsque les plants souffrent d'un excès d'humidité.
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· Appliquer dans 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac) au plus tard quand la culture est au stade de la percée du sol. · Efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées.
IGNITE (150 g/L) plus SENCOR 480 F (480 g/L) *glufosinate ammonium* *plus métribuzine*	2,7–5 L/ha 1,1 L/ha *0,405–0,75 kg/ha* *0,55 kg/ha*	1,08–2 L/ac 0,44 L/ac	· POST — Appliquer dans 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac) au plus tard quand la culture est au stade de la percée du sol. · Efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées. · **NE PAS** utiliser la métribuzine sur un sol organique ni sur les cultivars Belleisle ou Tobique.
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· Traiter lorsque la majorité des graminées sont au stade 1–6 feuilles ou tant que le maïs spontané ne dépasse pas 25 cm de hauteur. · **NE PAS** appliquer si on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la récolte.
SELECT (240 g/L) plus AMIGO *cléthodime* *plus surfactant*	0,13–0,38 L/ha 5–10 L/1000 L d'eau *0,03–0,09 kg/ha* *0,5–1 % v/v*	0,05–0,15 L/ac 5–10 L/1000 L d'eau	· Les pommes de terre sont tolérantes à tous les stades de leur croissance. · Contre les graminées annuelles et les céréales spontanées, faire le traitement quand elles ont 2–6 feuilles. · Contre le chiendent commun, appliquer la dose supérieure au stade 2–5 feuilles.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Appliquer dans un volume maximal de 300 L/ha (120 L/ac). · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent commun avant les semis rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement. · **Respecter** un délai d'attente de 90 jours avant la récolte. · Peut être mélangé en cuve avec de la métribuzine.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
PRISM (25DF) plus AGRAL 90 ou AG-SURF *rimsulfuron* *plus surfactant non ionique*	60 g/ha 2 L/1000 L d'eau *15 g/ha* *0,2 % v/v*	24 g/ac 2 L/1000 L d'eau	· Appliquer lorsque le chiendent commun est au stade 3–6 feuilles (moins de 10 cm de hauteur), que les graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles et que l'amarante réfléchie est au stade 4–6 feuilles. · Appliquer sur les pommes de terre avant le début de la floraison. · **NE PAS** appliquer dans les 30 jours qui précèdent la récolte. · Toujours ajouter les produits hydrosolubles à de l'eau claire tout en faisant fonctionner l'agitateur.
SENCOR 480 F (480 g/L) *métribuzine*	1,2–2,2 L/ha *0,6–1,1 kg/ha*	0,48–0,88 L/ac	· Traiter peu après la sortie des plants de pommes de terre, mais avant que les mauvaises herbes dépassent 4 cm de hauteur. · Faire les pulvérisations dans l'après-midi ou en début de soirée par journées ensoleillées (l'enzyme qui neutralise la métribuzine est alors plus abondante). · **NE PAS** appliquer sur les cultivars rouges. · **NE PAS** appliquer sur les cultivars hâtifs (primeurs). · **NE PAS** utiliser sur les cultivars Shepody et Atlantic. · **NE PAS** utiliser sur sols organiques, les résidus pouvant causer des dégâts aux cultures suivantes.
Avant la récolte			
AIM EC (240 g/L) plus surfactant non ionique **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *MERGE*	73–350 mL/ha 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L *17,5–84 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	30–140 mL/ac 2,5 L/1000 L 10 L/1000 L	· Bien recouvrir le feuillage des mauvaises herbes et de la culture pour assurer l'efficacité du traitement. · Appliquer dans un volume d'eau minimal de 100 L/ha (40 L/ac). · Respecter un délai d'attente de 7 jours avant la récolte. · Si un deuxième traitement de destruction chimique est nécessaire, utiliser le DÉFANANT REGLONE au doses indiquées ci-dessous.
DÉFANANT REGLONE (240 g/L) *diquat*	1,25–3,5 L/ha *0,3–0,84 kg/ha*	0,5–1,4 L/ac	· Utiliser à raison de 1,25–3,5 L/ha pour une application terrestre et de 1,7–2,3 L/ha pour une application par aéronef. · Utiliser un volume minimal de 550 L de bouillie/ha. · Utiliser la dose supérieure si la culture et les mauvaises herbes ont un feuillage dense. · **NE PAS** appliquer sur des pommes de terre soumises à un stress de sécheresse. · **NE PAS** appliquer si l'on prévoit de la pluie dans les 15 minutes qui suivent.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
RUTABAGA			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· Appliquer par IPS ou en PRÉ. L'IPS donne une maîtrise optimale du souchet; le traitement en PRÉ donne une maîtrise optimale de la morelle noire de l'Est. · **NE PAS** utiliser sur des terres noires, des sols tourbeux ou des sols riches en matière organique. · **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 1 % de matière organique. · Utiliser la dose supérieure en présence de fortes infestations. · Utiliser du matériel d'application terrestre uniquement.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,6–2,2 L/ha 2–2,75 L/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,64–0,94 L/ac 0,8–1,1 L/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. · **NE PAS** dépasser la dose inférieure sur les sols à texture moyenne. · **NE PAS** appliquer sur des sols tourbeux ni sur des terres noires (renfermant plus de 15 % de matière organique). · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des champs qui ont reçu du fumier dans les 12 moins précédents. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **NE PAS** appliquer sur la même terre pendant 2 années consécutives.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha *1,12–2,25 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. · Appliquer la dose inférieure en terres sablonneuses. · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant plus de 10 % de matière organique. · Après la récolte, il est conseillé de travailler le sol perpendiculairement aux rangs afin d'éviter d'endommager les cultures suivantes. · Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
Anti-graminées de postlevée			
ASSURE II (96 g/L) plus SURE-MIX *quizalofop-p-éthyl* *plus concentré d'huile*	0,38–0,75 L/ha 5 L/1000 L *0,036–0,07 kg/ha* *0,5 % v/v*	0,15–0,3 L/ac 5 L/1000 L	· Traiter les graminées annuelles levées et les repousses de céréales entre le stade 2 feuilles et le tallage, et le chiendent commun et le maïs spontané entre le stade 2 feuilles et le stade 6 feuilles. · Utiliser la dose de 0,38 L de ASSURE II/ha (0,15 L/ac) pour maîtriser les repousses de maïs et de céréales et la sétaire verte. · La dose de 0,5 L de ASSURE II/ha (0,2 L/ac) stoppe la croissance du chiendent commun et maîtrise l'échinochloa pied-de-coq. · Utiliser la dose de 0,75 L de ASSURE II/ha (0,3 L/ac) pour maîtriser le chiendent commun.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L)	0,6–2 L/ha	0,24–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. • Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. • Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. • Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). • Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Une préparation minutieuse du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. • Appliquer dans un volume maximal de 300 L/ha (120 L/ac). • **NE PAS** sarcler les entre-rangs dans les 5 jours qui suivent le traitement. • Faire ce traitement une fois par saison **SEULEMENT.** • **NE PAS** appliquer d'autres herbicides dans les 3 jours d'un traitement au VENTURE L. • **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 2 heures qui suivent. • Respecter un délai d'attente de 45 jours avant la récolte.
fluazifop-p-butyl	*0,075–0,25 kg/ha*		
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	• Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** • Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. • Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). • **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. • Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
carfentrazone-éthyle *plus surfactant non ionique* ***ou*** *surfactant/solvant*	*8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*		
LONTREL 360 (360 g/L)	0,56 L/ha	0,22 L/ac	• Appliquer en POST lorsque l'herbe à poux atteint entre 5 et 10 cm de hauteur. • Faire **SEULEMENT** un traitement par saison de croissance. • **NE PAS** appliquer par aéronef. • **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 4 heures qui suivent. • Respecter un délai d'attente de 83 jours avant la récolte.
clopyralide	*0,2 kg/ha*		

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TOMATE REPIQUÉE			
Le désherbage des tomates associe normalement des interventions chimiques et des méthodes mécaniques. Il est bon aussi de pratiquer la rotation des cultures. Il est conseillé de sarcler superficiellement pour éviter de remonter en surface de la terre non traitée où peuvent lever de nouvelles mauvaises herbes. Lorsque les tomates sont cultivées sur des lits surélevés et que ceux-ci sont remodelés durant la saison, il peut être utile et même nécessaire de traiter à nouveau entre les rangs pour empêcher les mauvaises herbes de gêner la récolte. Lorsqu'un herbicide est épandu plus d'une fois par an, veiller à ne pas dépasser la dose totale recommandée par saison de croissance. Le traitement en bande sur les rangs permet de diminuer les coûts de moitié, voire des deux tiers, selon la largeur de la bande et l'espacement entre les rangs. Un sarclage superficiel entre les rangs est alors nécessaire. Le travail du sol détruit partiellement les mauvaises herbes vivaces. Cependant, la meilleure méthode est d'éliminer ces mauvaises herbes dans les autres cultures de la rotation. Les vivaces sont très facilement disséminées par les cultivateurs ou autres machines servant à préparer le sol. Sarcler les zones infestées en dernier. Il est important de bien nettoyer la machinerie avant de passer d'un champ à un autre.			
Préparation du terrain avant les semis — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Appliquer tous les traitements dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac), sauf indication contraire.			
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** · Appliquer par IPS. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. · **NE PAS** utiliser sur les terres noires, dans les sols tourbeux ni les sols riches en matière organique. · **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 1 % de matière organique. · Utiliser la dose supérieure en cas de forte infestation, contre la morelle noire de l'Est et le souchet comestible.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,48–0,94 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** · Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. · Un traitement par temps frais et pluvieux risque de retarder le développement des jeunes plants, mais sans nuire généralement au rendement. · **NE PAS** appliquer sur des sols tourbeux ni sur des terres noires (renfermant plus de 15 % de matière organique). · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des champs qui ont reçu du fumier dans les 12 moins précédents. · **NE PAS** appliquer par aéronef.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	2,25–4,5 kg/ha 1,12–2,25 kg/ha	0,9–1,8 kg/ac	• Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. • Homologué pour une utilisation sur les tomates semées en place et les tomates repiquées. • Utiliser la dose inférieure sur sols légers. • **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant plus de 10 % de matière organique. • Après la récolte, il est conseillé de travailler le sol perpendiculairement aux rangs afin d'éviter d'endommager les cultures suivantes. Le traitement peut retarder la croissance des céréales à paille semées l'automne sans toutefois leur nuire d'une autre façon.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) SENCOR 480 F (480 g/L) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,25–1,75 L/ha 0,5–1,4 L/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,25–0,7 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,2–0,56 L/ac	• **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** • Appliquer par IPS. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. • **NE PAS** utiliser sur les terres noires, dans les sols tourbeux ni les sols riches en matière organique. • **NE PAS** utiliser sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. • Utiliser la dose supérieure de DUAL II MAGNUM en cas de forte infestation, contre la morelle noire de l'Est et le souchet comestible. • Utiliser la dose inférieure de métribuzine et répéter les applications de métribuzine quand les plants ont repris, en suivant les indications relatives aux applications de métribuzine en postlevée. • **NE PAS** dépasser la dose maximale totale de métribuzine recommandée pour un type de sol.
TREFLAN EC (480 g/L) plus DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus SENCOR 500 F (500 g/L) *trifluraline* *plus s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,1–2,1 L/ha 1–1,25 L/ha 0,5–1 L/ha *0,53–1 kg/ha* *0,92–1,14 kg/ha* *0,25–0,5 kg/ha*	0,44–0,84 L/ac 0,4–0,5 L/ac 0,2–0,4 L/ac	• **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** • Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. • **NE PAS** appliquer sur des terres noires, des sols tourbeux ni des sols riches en matière organique (renfermant plus de 15 % de matière organique). • Utiliser les doses inférieures sur sols légers. • Utiliser la dose inférieure de métribuzine et répéter les applications de métribuzine quand les plants ont repris, en suivant les indications relatives aux applications de métribuzine en postlevée. • **NE PAS** dépasser la dose maximale totale de métribuzine recommandée pour un type de sol. • Un traitement par temps frais et pluvieux risque de retarder l'établissement, mais sans nuire généralement au rendement. • Contre la morelle noire de l'Est, utiliser la dose supérieure DUAL II MAGNUM. • Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) plus SENCOR 480 F (480 g/L) *trifluraline* *plus métribuzine*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,3 L/ha 1,5–2,75 L/ha 0,5–1,4 L/ha *0,6–1,15 kg/ha* *0,25–0,7 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,48–0,92 L/ac 0,6–1,1 L/ac 0,2–0,56 L/ac	· **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** · Appliquer par IPS. Incorporer dans les 24 heures qui suivent le traitement. Incorporer superficiellement afin de maintenir séparées la zone traitée et les racines de tomate en croissance. · **NE PAS** appliquer sur des sols tourbeux ni sur des terres noires (renfermant plus de 15 % de matière organique). · **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. · **NE PAS** appliquer sur des champs qui ont reçu du fumier dans les 12 moins précédents. · Utiliser les doses inférieures sur les sols sableux et les sols pauvres en matière organique. · Utiliser la dose inférieure de métribuzine et répéter les applications de métribuzine quand les plants ont repris, en suivant les indications relatives aux applications de métribuzine en postlevée. · **NE PAS** dépasser la dose maximale totale de métribuzine recommandée pour un type de sol. · Un traitement par temps frais et pluvieux risque de retarder l'établissement, mais sans nuire généralement au rendement.
Anti-graminées de postlevée			
EXCEL SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	0,67 L/ha *0,054 kg/ha*	0,27 L/ac	· **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** · Appliquer en POST lorsque les graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles et que le maïs spontané fait 25 cm de haut. · Ce traitement est sans effet contre les graminées annuelles qui lèvent par la suite. · **NE PAS** appliquer d'autres herbicides dans les 4 jours du traitement au EXCEL SUPER. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de matériel d'application modifiant les gouttelettes. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · Respecter un délai d'attente de 55 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur les graminées annuelles en croissance active. • Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). • Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). • Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement dans les cultures à rangs écartés. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. • Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). • Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. • **NE PAS** appliquer d'autres produits chimiques dans les 4 jours d'un traitement au POAST ULTRA. • Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. • **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. • **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. • Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. • Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. • Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. • Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). • Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent commun avant les semis rend la lutte plus efficace. • Appliquer dans un volume maximal de 300 L/ha (120 L/ac). • **NE PAS** sarcler dans les 5 jours qui suivent le traitement. • **NE PAS** appliquer d'autres herbicides dans les 3 jours d'un traitement au VENTURE L. • **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans les 2 heures qui suivent. • Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	• Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** • Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. • Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). • **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la récolte. • Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PINNACLE (75 % DF) plus AGRAL 90 *thifensulfuron-méthyl* *plus surfactant non ionique*	5,5–8,0 g/ha 2 L/1000 L d'eau *4,125–6,0 g/ha* *0,2 % v/v*	2,2–3,2 g/ac 2 L/1000 L d'eau	• Appliquer 3 semaines après le repiquage, avant que les mauvaises herbes atteignent 10 cm de hauteur. • Mettre PINNACLE dans la cuve en premier et faire circuler avant d'ajouter AGRAL 90. • **NE PAS** appliquer dans moins de 100 L d'eau/ha. • **NE PAS** appliquer si l'on prévoit de la pluie dans les heures qui suivent. • Faire **UN SEUL** traitement par année. • **NE PAS** appliquer sur des tomates soumises à un stress. • **NE PAS** faire ce traitement dans les 45 jours qui précèdent la récolte.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
PRISM (25DF) plus AGRAL 90 ou AG-SURF *rimsulfuron* *plus surfactant non ionique*	60 g/ha 2 L/1000 L d'eau *15 g/ha* *0,2 % v/v*	24 g/ac 2 L/1000 L d'eau	• Appliquer en POST jusqu'au stade 4 feuilles de la morelle poilue, lorsque le chiendent commun est au stade 3–6 feuilles (moins de 10 cm de haut), que les graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles et que l'amarante réfléchie est au stade 4–6 feuilles. • Faire **UN SEUL** traitement par année. • **NE PAS** traiter si de la pluie est prévue dans les 2 heures qui suivent. • Respecter un délai d'attente de 30 jours avant la récolte. • Peut être appliqué sur les tomates de transformation et les tomates en frais.
SENCOR DF (75 DF) *métribuzine*	0,375–1,1 kg/ha *0,28–0,85 kg/ha*	0,15–0,44 kg/ac	• **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** • Appliquer en POST au moins 3 semaines après le repiquage, avant que les mauvaises herbes atteignent 4 cm de hauteur. • Faire ce traitement une fois par saison **SEULEMENT**. • Diriger la pulvérisation vers le tiers inférieur des plants de tomate pour réduire les risques de phytotoxicité. • **NE PAS** traiter lorsque la culture est soumise à un stress causé par des journées fraîches, pluvieuses et nuageuses ou excessivement chaudes. • **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. • **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. • Utiliser les doses inférieures sur sols sableux et les doses supérieures sur sols argileux. • Respecter un délai d'attente de 60 jours avant la récolte.
SENCOR 480 F (480 g/L) *métribuzine*	0,3 L/ha *0,15 kg/ha*	0,12 L/ac	• **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** • Faire 1–4 traitements de POST par saison de croissance. • Appliquer avant que les mauvaises herbes atteignent 2,5 cm de hauteur. • Le fongicide BRAVO 500 (chlorothalonil) peut être mélangé en cuve avec ce produit à raison de 2,4–4,8 L/ha (1,2–2,4 kg de matière active/ha). La maîtrise des graminées annuelles risque alors d'être compromise. • **NE PAS** traiter lorsque la culture est soumise à un stress causé par des journées fraîches, pluvieuses et nuageuses ou excessivement chaudes. • **NE PAS** utiliser sur des sols organiques. • **NE PAS** appliquer sur des sols renfermant moins de 2 % de matière organique. • **NE PAS** dépasser la dose maximale totale de métribuzine recommandée pour le type de sol. • Respecter un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Mélange en cuve de postlevée			
PRISM (25DF) plus PINNACLE (75 % DF) plus AGRAL 90 *rimsulfuron* *plus thifensulfuron-méthyl* *plus surfactant non ionique*	60 g/ha 5,5–8,0 g/ha 2 L/1000 L d'eau *15 g/ha* *4,125–6,0 g/ha* *0,2 % v/v*	24 g/ac 2,2–3,2 g/ac 2 L/1000 L d'eau	· **Utiliser SEULEMENT sur les tomates repiquées destinées à la transformation.** · Appliquer en POST jusqu'au stade 4 feuilles de la morelle poilue, lorsque le chiendent commun est au stade 3–6 feuilles (moins de 10 cm de haut), que les graminées annuelles sont au stade 1–6 feuilles et que l'amarante réfléchie est au stade 4–6 feuilles. · Appliquer 3 semaines après le repiquage, avant que les mauvaises herbes atteignent 10 cm de hauteur. · **NE PAS** appliquer dans moins de 200 L d'eau/ha. · **NE PAS** appliquer si de la pluie est prévue dans les 2 heures qui suivent. · **NE PAS** appliquer sur des tomates soumises à un stress. · **NE PAS** faire ce traitement dans les 45 jours qui précèdent la récolte.

Petits fruits

En avril 2009, le ministère de l'Environnement (MEO) modifiait sa *Loi sur les Pesticides* avec l'adoption de la *Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques* et du Règlement de l'Ontario 63/09. Les pesticides sont maintenant classés aux fins de vente et d'utilisation dans onze catégories différentes. Des exemptions sont prévues pour les usages agricoles (notamment pour la production de matériel de pépinière). Pour plus d'information sur les dispositions législatives, voir la page Web du MEO qui y est consacrée à *www.ontario.ca/interdictiondespesticides*.

Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits

Un programme efficace de lutte contre les mauvaises herbes doit intégrer des méthodes chimiques et des méthodes culturales. Les producteurs ne peuvent pas compter uniquement sur le désherbage chimique dans les cultures de petits fruits, car peu d'herbicides sont homologués à cette fin.

Lutte contre les mauvaises herbes vivaces

Il est important d'identifier et de combattre les mauvaises herbes vivaces l'année précédant la plantation. Une fois la plantation établie, il est très difficile d'en venir à bout à cause de la sensibilité des cultures à certains herbicides et de l'impossibilité de travailler le sol sur toute la surface dans les cultures de petits fruits.

Les mauvaises herbes vivaces qui présentent de sérieux problèmes pour ces cultures sont les suivantes : chiendent commun, liseron, vesce, vigne sauvage, morelle vivace, chardons, lierre terrestre et bardane. Dans les fraisiers, la petite oseille, les linaires et l'asclépiade causent elles aussi des problèmes.

Pour tenir en échec les mauvaises herbes vivaces, des herbicides systémiques comme le glyphosate (p. ex. ROUNDUP) ou l'amitrole (p. ex. AMITROL 240) devraient être appliqués l'année précédant la plantation. Consulter l'étiquette afin d'utiliser l'herbicide à la dose recommandée et au stade de croissance approprié des mauvaises herbes. Appliquer l'herbicide au bon stade de croissance de la mauvaise herbe, à défaut de quoi, le traitement ne fera qu'en ralentir la croissance. Quelques espèces vivaces comme le liseron sont détruites par des hersages répétés.

Préparation du terrain

Un engrais vert comme le ray-grass anglais ou l'herbe du Soudan devrait être semé l'année précédant la plantation ou associé à d'autres méthodes de désherbage. Cette pratique fera obstacle à la croissance des mauvaises herbes et améliorera la structure du sol. Des herbicides non sélectifs peuvent être appliqués avant le semis de l'engrais vert et avant son enfouissement. Des herbicides sélectifs peu rémanents comme le 2,4-D peuvent être épandus sur les engrais verts, mais il faut éviter l'emploi d'herbicides dont les résidus subsisteraient dans le sol l'année de la plantation. Voir le chapitre 6, *Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Paillage

Dans les cultures d'espèces du genre ronce ou d'arbustes fruitiers, on peut poser une feuille de plastique biodégradable le long de la rangée de plantation pour empêcher la croissance des mauvaises herbes. Un paillis de paille contribuera à limiter la levée des mauvaises herbes sous les plants ou entre les rangs si on l'épand tôt au printemps, avant la germination des mauvaises herbes. Utiliser un paillis qui ne contient pas de semence de mauvaises herbes et s'assurer que le sol contient assez d'azote pour alimenter les plants. Le paillis devrait être écarté du pied des plants pendant l'hiver pour les protéger des rongeurs.

Dans les fraisiers, l'installation d'un paillis de paille avant la germination des mauvaises herbes peut limiter leur propagation. Certains producteurs font l'essai de la plasticulture pour améliorer la lutte contre les mauvaises herbes.

Réduction de la concurrence des mauvaises herbes

Le travail du sol élimine les mauvaises herbes entre les rangs. Dans les cultures d'espèces du genre ronce ou d'arbustes fruitiers, une autre solution consiste à implanter un couvert végétal vigoureux (gazon) qui s'oppose à l'installation des mauvaises herbes. Il est préférable de semer un gazon de fétuque que de compter sur un engazonnement naturel, car les graines de mauvaises herbes coloniseront la bande traitée à l'herbicide.

Empêcher les mauvaises herbes de s'installer dans les zones incultes avoisinantes et de monter à graines, en recourant à des pratiques culturales ou à des interventions chimiques. La tonte à intervalles réguliers empêche de nombreuses mauvaises herbes de fleurir. Éliminer les mauvaises herbes qui ont échappé au traitement, avant la formation des graines, par un sarclage ou un « fauchage chimique ». Dans certains cas, un outil comme le taille-bordure peut être efficace. Il existe des tondeuses rotatives qui coupent les mauvaises herbes

près des plants sans endommager ceux-ci. Cependant, la tonte n'élimine pas définitivement les mauvaises herbes.

Rotation des différentes familles d'herbicides

(Voir le tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario*, p. 72).

Dans les cultures pérennes, il est important d'utiliser en rotation des herbicides appartenant à différentes familles pour réduire l'accumulation de graines provenant des mauvaises herbes qui ont échappé aux traitements, y compris celles qui tolèrent les triazines. Un système de rotation empêche aussi l'accumulation dans le sol de résidus d'herbicides qui risquent de nuire aux cultures au bout de quelques années et d'empêcher ainsi tout projet de plantation.

Moments des traitements herbicides

Traitements de préplantation (PP)

On effectue ces traitements avant la mise en place de la culture. Certains de ces traitements tuent les plantules de mauvaises herbes peu après la germination, alors que d'autres tuent aussi les graines de mauvaises herbes. La plupart des herbicides servant à ces traitements doivent être incorporés au sol par un travail du sol effectué peu après l'application. Consulter l'étiquette du produit utilisé. Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Destruction des cultures couvre-sol et des mauvaises herbes en préplantation (PP)

Détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées avant de procéder aux plantations. Voir le tableau 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85. Une autre méthode consiste à détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées tout juste avant les plantations avec ou sans travail du sol.

Incorporation en présemis (IPS)

Sauf indication contraire, il est nécessaire d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

Prélevée (PRÉ)

De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 7–10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas. Ces produits empêchent la levée des plantules de nombreuses mauvaises herbes sans réduire la densité de la culture. Épandre immédiatement après le semis ou au plus tard avant la levée des plantes cultivées. Ces herbicides ont peu d'effet sur les mauvaises herbes déjà levées, et ne donnent les meilleurs résultats que lorsque les conditions sont favorables à la germination des graines de mauvaises herbes.

Postlevée (POST)

Ces produits sont utilisés après la mise en place de la culture. Utilisés selon le mode d'emploi, ils tuent les mauvaises herbes sans nuire à la plante cultivée. Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides, pourvu qu'elles présentent une surface foliaire suffisante pour assimiler l'herbicide. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

Désherbage des entre-rangs

On peut désherber les entre-rangs en dirigeant l'herbicide sur les mauvaises herbes levées entre les rangs, si les autres méthodes ont échoué. On utilise alors un appareil à faible pression (7–15 kPa) comme la barre d'aspersion ou la buse oscillante vibrajet munie d'un écran de protection empêchant les plantes cultivées d'être mouillées. Voir *Désherbage des entre-rangs et techniques de semis sur sol rassis*, p. 90.

Désherbage sélectif par humectation

Les humecteurs à cordes, à rouleaux ou à brosses sont largement employés pour appliquer le glyphosate (ROUNDUP). En ce qui concerne les autres herbicides, vérifier sur le mode d'emploi si ces produits peuvent aussi être appliqués par humectation.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 14–1. Évaluation des herbicides pour les fraisiers

	Graminées annuelles						**Dicotylédones annuelles**									**Vivaces**																	
Nom commercial	**échinochloa pied-de-coq**	**digitaire**	**panic d'automne**	**sétaires**	**panic capillaire**	**céréales spontanées**	**stellaire moyenne**	**séneçon vulgaire**	**renouée persicaire**	**chénopode blanc**	**moutardes, sisymbres, vélars**	**amarantes**	**herbes à poux**	**chénorhinum mineur**	**violette des champs**	**liserons**	**brome**	**céraiste vulgaire**	**marguerite blanche**	**pissenlit**	**lierre terrestre**	**mauve**	**asclépiade**	**souchet**	**plantains**	**herbe à puce**	**chiendent commun**	**petite oseille**	**laiteron des champs**	**chardon des champs**	**linaire vulgaire**	**vesces**
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																																
BONANZA, TREFLAN, RIVAL	**8**	**9**	8	**9**	8	9	8	3	7	**8**	3	**8**	4	-	-	0	-	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
DACTHAL W-75	**6**	**8**	8	**8**	8	8	8	0	0	**8**	2	**6**	**0**	7	7	-	-	**8**	0	7	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-
DEVRINOL	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	8	8	**8**	6	**8**	5	**8**	**6**	0	0	8[c]	8	-	-	2	-	-	5	5	2	-	5	0	5	5	-	0
DUAL II MAGNUM	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	-	-	2	7	2	**7/8**	4	-	-	0	-	-	-	5	-	-	0	**8**	5	-	4	-	0	0	-	0
GOAL 2XL	5	5	5	5	5	5	-	8	8	**9**	9	**9**	8	-	**9**	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-
SINBAR	**8**	**7**	8	**8**	8	8	**8**[a]	5	7[a]	**8**[a]	**8**[a]	**7**[a]	**7**[a]	2	5[a]	-	8	-	2	5	-	-	6	**6**	8	-	**6**	8	5	6	2	2
Anti-graminées de postlevée																																
POAST + MERGE	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	0	0	0	0	0
VENTURE L	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0	0	0	0
Anti-dicotylédones de postlevée																																
AIM EC (pulvérisateur muni d'écrans anti-dérive)	-	-	-	-	-	-	-	8	-	**8**	**8**	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,4-D*	0	0	0	0	0	0	**2**	2	**4**	**8**	**9**	**7**	**8**	2	2	2	0	2	2	**8**	2	0	0	0	**8**	-	0	8	6	**8**	-	5
LONTREL 360	0	0	0	0	0	0	0	8	-	5	-	5	9	-	-	0	0	0	**8**	8	0	0	0	0	0	0	0	**9**	8[b]	**9**	0	**9**

[1] Uniquement pour traitement localisé.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

* Il existe d'autres produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

Les cotes en gras indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[a] De faibles doses et des applications uniques risquent d'être moins efficaces.

[b] Détruit la partie aérienne de la plante seulement; une repousse est à prévoir. Des traitements répétés peuvent venir à bout de ces mauvaises herbes.

[c] Maîtrise uniquement les plantules de liserons. Ce produit est inefficace contre les liserons établis.

TABLEAU 14–1. Évaluation des herbicides pour les fraisiers (suite)

Nom commercial	Graminées annuelles						Dicotylédones annuelles									Vivaces															
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaires	panic capillaire	céréales spontanées	stellaire moyenne	séneçon vulgaire	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	herbes à poux	chénorhinum mineur	violette des champs	liserons	brome	céraiste vulgaire	marguerite blanche	pissenlit	lierre terrestre	mauve	asclépiade	souchet	plantains	herbe à puce	chiendent commun	petite oseille	laiteron des champs	chardon des champs	linaire vulgaire	vesces
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																															
GRAMOXONE	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	**8[b]**	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]	8[b]
GLYPHOSATE*[1]	9	9	9	9	9	9	9	**8**	**9**	**8**	**9**	**9**	**8**	-	-	**7/8**	9	**9**	-	**8**	5	**5**	**9**	**8**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**8**	5[a]

[1] Uniquement pour traitement localisé.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

* Il existe d'autres produits; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

Les cotes en gras indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

[a] De faibles doses et des applications uniques risquent d'être moins efficaces.

[b] Détruit la partie aérienne de la plante seulement; une repousse est à prévoir. Des traitements répétés peuvent venir à bout de ces mauvaises herbes.

[c] Maîtrise uniquement les plantules de liserons. Ce produit est inefficace contre les liserons établis.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).

BLEUETIER EN CORYMBE

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

MÉTHODES CULTURALES DE DÉSHERBAGE – voir *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits*, p. 285.

Paillis : La pose d'un paillis biodégradable entre les rangs empêche la croissance des mauvaises herbes. Un paillis de sciure de bois donne de bons résultats s'il est placé en début de saison, avant la germination des mauvaises herbes. Épandre de la sciure de bois sur une épaisseur de 5 cm. Le paillis ne peut toutefois pas empêcher la germination des mauvaises herbes que le vent dépose à la surface du paillis.

Au cours des années suivantes, la matière organique contenue dans le paillis risque de fixer par adsorption les herbicides et ainsi de réduire l'activité de certains herbicides rémanents.

Les besoins en azote de la culture changent à mesure que le paillis se décompose. Au début, comme l'azote est absorbé par les micro-organismes, il faut augmenter les doses de fertilisants azotés. Ensuite, à mesure qu'elle se décompose, la sciure dégage de l'azote, réduisant ainsi les besoins en azote de la culture paillée, comparativement à une culture non paillée. Il peut s'écouler deux ans ou plus avant que la sciure de bois ne se décompose. Ajuster les amendements azotés selon la décomposition du paillis, la croissance des plantes et les résultats des analyses foliaires.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée.

MISE EN GARDE – Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition de la plantation.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires

CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	175–225 kg/ha *7–9 kg/ha*	70–90 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer sur un sol humide et frais mais non gelé à la fin de l'automne ou au printemps avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · Utiliser la dose inférieure s'il pleut ou si l'on irrigue après le traitement. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac). · **Utiliser UNIQUEMENT** sous des plants établis depuis au moins trois ans. · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers.
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · **NE PAS** appliquer sur les bleuetiers établis depuis moins de 2 ans. · **NE PAS** appliquer après le débourrement à moins d'utiliser du matériel de pulvérisation muni d'écrans ou de cônes anti-dérive. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser la dose inférieure sur les sols sableux (à texture grossière) renfermant moins de 5 % de matière organique, et la dose supérieure sur les sols argileux (à texture moyenne) renfermant moins de 5 % de matière organique. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer ce produit à l'aide d'un système d'irrigation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · PRÉ — Appliquer une fois par saison de croissance, soit à l'automne, soit au printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** pulvériser sur sol gelé. · **Respecter** un délai d'attente de 70 jours avant la cueillette.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMAZINE 80W (80 WP) *simazine*	2,5–3,75 kg/ha 2,75–4,25 kg/ha *2,25–3,38 kg/ha*	1–1,5 kg/ac 1,1–1,7 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer dans 300–1000 L d'eau/ha (120–400 L/ac) avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser les doses inférieures dans des sols sableux, grossiers. · Utiliser les doses supérieures dans les sols argileux ou riches en matière organique. · N'utiliser que sur des plants établis.
SENCOR 75 DF (75WG) *métribuzine*	1 kg/ha *0,75 kg/ha*	0,4 kg/ac	· **Pour nouvelles plantations UNIQUEMENT.** · Faire un traitement dirigé en bande au pied des plants. · Appliquer sur un sol exempt de mauvaises herbes après les plantations. · **Attendre** 2 ans avant de cueillir les bleuets.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	2,75–4,25 kg/ha *2,2–3,4 kg/ha*	1,1–1,7 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer dans 200–1000 L d'eau/ha (80–400 L/ac). · Pulvériser seulement sous des plants établis depuis au moins 1 an. · Faire un traitement par année. · En sols sableux, ce produit peut léser la culture, même à faible dose. · Utiliser la dose supérieure seulement sur les sols organiques ou tourbeux où l'expérience a démontré qu'il n'y avait pas de danger pour les plantes.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 15 jours avant la cueillette.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L)	0,6–2 L /ha	0,24–0,8 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.**
			· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage.
fluazifop-p-butyl	*0,075–0,25 kg/ha*		· Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané.
			· Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés.
			· Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2 feuilles des sétaires).
			· Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L)	36,5–117 mL/ha	14,8–47 mL/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.**
plus AGRAL 90	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer en POST à l'aide d'un à l'aide d'un PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE entre les rangs ou entre le paillis de plastique.
ou AG-SURF	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut.
ou MERGE	1 L/1000 L	1 L/1000 L	· Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
carfentrazone-éthyle	*8,8–28,1 g/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la cueillette.
plus surfactant non ionique	*0,25 % v/v*		· Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
ou *surfactant/solvant*	*0,1% v/v*		· **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec les tissus verts de la tige, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
BASAGRAN	1,75 L/ha	0,7 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.**
ASSIST	5 L/1000 L	5 L/1000 L	· Pour détruire la partie aérienne du souchet comestible.
			· Traiter 2 fois à 7–10 jours d'intervalle, lorsque les mauvaises herbes sont petites.
bentazone	*0,84 kg/ha*		· **NE PAS** appliquer plus de 2 fois par année.
plus concentré d'huile	*0,5 % v/v*		· **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette.
LONTREL 360 (360 g/L)	0,42–0,83 L/ha	0,17–0,33 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.**
			· Appliquer une fois par année, en dirigeant le jet sur les mauvaises herbes levées, sous les buissons.
clopyralide	*0,15–0,3 kg/ha*		· Contre la vesce levée, utiliser 0,42 L/ha.
			· Contre les trèfles rouge et blanc, utiliser 0,83 L/ha.
			· **Respecter** un délai d'attente de 45 jours avant la cueillette.
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)*	2,8–5,6 L/ha	1,12–2,24 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.**
ou glyphosate (480 g/L)*	2,08–4,17 L/ha	0,83–1,67 L/ac	· Diriger la pulvérisation sous les buissons, en évitant les nouvelles pousses.
ou glyphosate (500 g/L)*	2,0–4,0 L/ha	0,8–1,6 L/ac	· Traiter à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac), à une pression d'au plus 275 kPa.
ou glyphosate (540 g/L)*	1,85–3,7 L/ha	0,74–1,48 L/ac	· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou les tiges.
glyphosate	*1–2 kg/ha*		· Traiter seulement une fois par saison.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac). · Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau pour mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Utiliser sur des plantations établies depuis au moins 1 an.
GRAMOXONE (200 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *paraquat* *plus simazine*	5 L/ha 2–2,5 kg/ha *1 kg/ha* *1,8–2,25 kg/ha*	2 L/ac 0,8–1 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes en germination. · Faire un traitement dirigé dans une plantation établie. · Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac) de manière à bien mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Utiliser les doses inférieures dans des sols sableux, grossiers. · Utiliser les doses supérieures dans les sols argileux ou riches en matière organique.

CANNEBERGE

Le maintien d'une plantation vigoureuse et en bonne santé, qui couvre bien le terrain, limite le développement des mauvaises herbes.

Empêcher les mauvaises herbes de monter à graines sur les digues et les zones incultes avoisinantes en pratiquant des méthodes de désherbage culturales ou chimiques. La tonte à intervalles réguliers empêche de nombreuses mauvaises herbes de monter à graines. L'ensemencement des digues avec de bonnes graminées à gazon empêche les mauvaises herbes de s'établir et contribue également à stabiliser les berges.

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis, p. 89.*

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires

CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110 kg/ha *4,4 kg/ha*	44 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Contre les dicotylédones annuelles, certains souchets et espèces du genre *Juncus*. · Traiter au début du printemps, avant la floraison. · Les plants risquent de rougir temporairement, surtout après un traitement printanier tardif. · **NE PAS** utiliser sur de jeunes plantations ni sur des plantations nouvellement sablées. · **NE PAS** utiliser sur des plantations nouvellement taillées.
DEVRINOL 10G (10%) *napropamide*	45–67 kg/ha *4,5–6,7 kg/ha*	18–26,8 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer une seule fois par année au printemps et irriguer immédiatement. · **NE PAS** utiliser sur de nouvelles plantations.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1-2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 15 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Traitement destiné aux bleuetiers non fructifères nouvellement plantés ou établis.** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. · **Faire SEULEMENT** un traitement par saison de croissance.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	1 L/2 L d'eau 0,83 L/2 L d'eau 0,71 L/2 L d'eau *0,47 kg/2 L d'eau*		· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces levées, y compris la spirée tomenteuse, le millepertuis perforé, l'aulne et l'aster remarquable. · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre humecteur sur les mauvaises herbes en croissance active (juin–juillet). · **NE PAS** toucher la culture. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **Respecter** un délai d'attente de 50 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4-1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LONTREL 360 (360 g/L)	20 mL/L d'eau (solution à 2 %)		· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Contre la vesce levée. · **NE PAS** faire plus de 2 applications par année : l'une au printemps avant le débourrement, l'autre tant que les pousses n'ont pas atteint 1–2 mm de long, et/ou à l'automne au moins 2 semaines après la cueillette, lorsque les sarments ont pris leur couleur de dormance hivernale. · Appliquer à l'aide d'un humecteur sur le feuillage des mauvaises herbes qui s'élève au-dessus des plants de canneberge. Éviter tout contact avec les pousses de canneberge après le début de la croissance. · **Respecter** un délai d'attente de 60 jours avant la cueillette.
clopyralide	*7,2 g/L d'eau*		
Herbicide non sélectif			
glyphosate (360 g/L)*	1 L/4 L d'eau		· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable lorsque les mauvaises herbes dépassent la culture de 15 cm. · Éviter tout contact avec les tiges des canneberges. · **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées. · Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation, p. 11*.
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75 L/4 L d'eau		
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72 L/4 L d'eau		
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67 L/4 L d'eau		
*glyphosate**	*0,36 kg/4 L d'eau*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
FRAISIERS			
Méthodes culturales de désherbage – Voir les notes sous *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits, p. 285.* Poser un paillis exempt de graines de mauvaises herbes afin d'empêcher que des mauvaises herbes ne soient importées dans la culture. Au printemps, le paillis recouvrant les fraisiers doit être enlevé et étendu entre les rangs pour contribuer à étouffer les mauvaises herbes.			
Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. **MISE EN GARDE :** Les traitements à base de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition de la plantation.			
Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis, p. 89.*			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,21 kg/ha *0,11 kg/ha*	0,08 kg/ac	· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de plantation : fin d'automne.** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : fin d'automne.** · Pulvériser une fois par saison de croissance en pleine surface quand les plants sont en dormance ou, à toute autre période que le stade de dormance, au milieu des rangs de fraisiers au moyen de matériel de pulvérisation muni d'écrans ou de cônes anti-dérive. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer sur des sols de texture allant de grossière à moyenne renfermant moins de 5 % de matière organique. · Utiliser du matériel d'application terrestre UNIQUEMENT. · NE PAS appliquer après la nouaison. · NE PAS laisser la dérive de pulvérisation entrer en contact avec les fruits ni le feuillage.
DACTHAL W-75 *chlorthal-diméthyl*	13,5 kg/ha *10,125 kg/ha*	5,4 kg/ac	· **Année de plantation : 2–4 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · PRÉ — avant la levée des mauvaises herbes. · Un sarclage superficiel qui incorpore l'herbicide dans le sol peut améliorer l'efficacité du traitement. · **NE PAS** utiliser sur des sols organiques.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Année de plantation : 2–4 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de plantation : fin d'automne.** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : fin d'automne.** · PRÉ — appliquer une fois par saison de croissance avant la levée des mauvaises herbes ou après un sarclage. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · Lorsque l'établissement de nouveaux plants est important, (c'est-à-dire chez les producteurs de plants), retarder le traitement jusqu'à ce que le nombre voulu de plants soit établi. · Il y a risque d'inhibition des racines chez les nouveaux plants si l'humidité du sol est faible. On réduit ce risque en irriguant peu de temps après l'application.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· **Année de plantation : avant les plantations.** · IPS ou PRÉ — Appliquer et incorporer au sol, ou appliquer après le repiquage avant la levée des mauvaises herbes. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Faire le traitement à l'aide de matériel terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer sur le cultivar Joliette. · **NE PAS** cueillir les petits fruits provenant des cultivars qui produisent leurs fruits dans l'année de plantation.
GOAL 2XL (240 g/L) *oxyfluorfène*	1,0 L/ha *0,24 kg/ha*	0,4 L/ac	· **Année de plantation : fin d'automne.** · **Année de production : fin d'automne.** · PRÉ — avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer dans 500 L d'eau/ha. · Appliquer au sol une fois par année **SEULEMENT.** · Appliquer sur les plants en dormance avant de les recouvrir de paillis à la fin de l'automne. · Assure la maîtrise des mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette ainsi que des violettes des champs et des oxalides. · **Respecter** un délai d'attente de 150 jours avant la cueillette.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
SINBAR (80 WP) *terbacile*	0,7–0,85 kg/ha *0,56–0,68 kg/ha*	0,28–0,34 kg/ac	· **Année de plantation : fin d'automne.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'automne.** · PRÉ — Appliquer sur une surface exempte de mauvaises herbes, juste avant le paillage. · Appliquer dans au moins 300 L d'eau/ha (120 L/ac). · Utiliser la dose inférieure là où l'on prévoit de faire à nouveau un traitement au SINBAR au printemps. · Utiliser la dose inférieure sur les sols sableux pauvres en matière organique. · Utiliser la dose inférieure sur les cultivars sensibles tels que Kent, Bounty, Micmac, Annapolis, Glooscap et Cavendish, que la dose supérieure risque de léser gravement. · **NE PAS** appliquer sur des plants faibles ou malades, quel que soit le cultivar. · **Éviter** que les bandes arrosées ne se recoupent.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	0,28–0,55 kg/ha *0,22–0,44 kg/ha*	0,11–0,22 kg/ac	· **Année de plantation : 4–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · PRÉ — Traiter avant ou tout juste après la levée des mauvaises herbes. · Traiter lorsque les plants-mères sont bien établis, mais avant que les stolons prolifèrent et commencent à s'enraciner. · Appliquer dans au moins 300 L d'eau/ha (120 L/ac). · Utiliser la dose inférieure sur les sols sableux pauvres en matière organique. · Utiliser la dose inférieure sur les cultivars sensibles tels que Kent, Bounty, Micmac, Annapolis, Glooscap et Cavendish, que la dose supérieure risque de léser gravement. · **NE PAS** appliquer sur des plants faibles ou malades, quel que soit le cultivar. · **Éviter** que les bandes arrosées ne se recoupent. · Un sarclage superficiel permet de limiter le nombre de stolons et de détruire les mauvaises herbes ayant échappé au traitement, sans toutefois détruire l'activité de SINBAR.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (500 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,2–2,2 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,48–0,94 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS – Appliquer sur un sol exempt de mauvaises herbes et incorporer immédiatement par 2 passages perpendiculaires. · La pulvérisation et l'incorporation peuvent se faire entre 1 journée et 3 semaines avant la plantation. · Ce traitement risque de retarder la reprise des plants lorsque les conditions sont défavorables.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette. · Laisser s'écouler au moins 14 jours entre ce traitement et une application de SINBAR.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement. · Traiter seulement une fois par saison. · Laisser s'écouler au moins 14 jours entre ce traitement et une application de SINBAR.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)*	1,17 L/ha	0,47 L/ac	· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.**
ou 2,4-D (564 g/L)*	0,98 L/ha		· Utiliser la préparation amine.
ou 2,4-D (660 g/L)*	0,83 L/ha		· Appliquer dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
			· Utiliser une faible pression pour que la pulvérisation soit grossière et risque moins de dériver vers les cultures sensibles.
*2,4-D**	*0,55 kg/ha*		· **NE PAS** traiter pendant que les stolons s'enracinent.
			· **NE PAS** traiter entre la mi-août et la dormance d'hiver, lorsque les boutons floraux, qui produiront les fraises de l'année suivante se développent.
2,4-D (470 g/L)*	2,2 L/ha	0,88 L/ac	· **Année de production : à la rénovation.**
ou 2,4-D (564 g/L)*	1,83 L/ha	0,73 L/ac	· Appliquer après la cueillette mais avant le fauchage afin de maîtriser les pissenlits et autre dicotylédones vivaces. Retarder le fauchage de quelques jours après le traitement.
ou 2,4-D (660 g/L)*	1,57 L/ha	0,63 L/ac	
*2,4-D**	*1,034 kg/ha*		· Utiliser le 2,4-D sous forme amine.
			· **NE PAS** appliquer de 2,4-D entre la mi-août et la dormance d'automne quand les fraisiers forment leurs boutons.
			· Certains cultivars, comme le Veestar, sont plus sensibles au 2,4-D que le cultivar Redcoat.
AIM EC (240 g/L)	36,5–117 mL/ha	14,8–47 mL/ac	· **Année de plantation : 2–4 semaines après les plantations.**
plus AGRAL 90	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer en POST à l'aide d'un à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE** entre les rangs ou entre le paillis de plastique.
ou AG-SURF	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	
ou MERGE	1 L/1000 L	1 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut.
			· Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
carfentrazone-éthyle	*8,8-28,1 g/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 1 jour avant la cueillette.
plus surfactant non ionique	*0,25 % v/v*		· Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
ou surfactant/solvant	*0,1% v/v*		· **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec les tissus verts de la tige, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
LONTREL 360 (360 g/L)	0,56–0,83 L/ha	0,22–0,33 L/ac	· **Année de production SEULEMENT : à la rénovation.**
			· Pour maîtriser vesce jargeau, chardon des champs, petite oseille et marguerite blanche.
clopyralide	*0,2–0,3 kg/ha*		· Appliquer immédiatement après la cueillette au moment de la rénovation, 7–10 jours après le fauchage.
			· Appliquer avec un pulvérisateur à rampe dans 150–250 L d'eau/ha (60–100 L/ac).
			· Ne faire qu'un seul traitement par année.
			· Les cultivars précoces comme Veestar ou Annapolis sont plus sujets aux meurtrissures.
			· L'herbicide risque d'être plus dommageable lorsque surviennent certaines agressions du milieu telles que sécheresse, inondation ou conditions hivernales rigoureuses.
			· **Respecter** un délai d'attente de 200 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1 L/2 L d'eau 0,75 L/2 L d'eau 0,72 L/2 L d'eau 0,67 L/2 L d'eau *0,36 kg/2 L*		· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable lorsque les mauvaises herbes dépassent la culture de 15 cm. · Éviter tout contact avec les fraisiers. · **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées. · Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1–2 L/100 L d'eau 0,75–1,5 L/100 L d'eau 0,72–1,44 L/100 L d'eau 0,67–1,34 L/100 L d'eau *0,36–0,72 kg/100 L*		· **Année de plantation : 2–6 semaines après les plantations.** · **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : au printemps après l'enlèvement du paillis.** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel. · Éviter tout contact avec les fraisiers; ceux qui se trouvent dans la zone traitée mourront. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· **Année de plantation : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · **Année de production : à la rénovation.** · **Année de production : fin d'été ou automne (autour de la Fête du travail).** · Appliquer pour éliminer les mauvaises herbes entre les rangs étroits de fraisiers. · Appliquer dans 550–1100 L d'eau/ha (220–440 L/ac). · Pulvériser par temps calme. · Pulvériser à basse pression à l'aide d'une lance munie de protecteurs et de buses disposées de manière à éviter toute dérive. · Un recouvrement complet est important. Utiliser des volumes d'eau plus importants lorsque la végétation est dense. · Ne fait que ralentir la croissance des mauvaises herbes vivaces. · Efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées.

* Voir le tableau 4–1, Herbicides utilisés en Ontario, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
FRAMBOISIER			
Méthodes culturales de désherbage – Voir les notes sous *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits*, p. 285.			
Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. **MISE EN GARDE :** Les traitements à base de simazine et de DEVRINOL peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition de la plantation.			
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	175 kg/ha *7 kg/ha*	70 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en fin d'automne sur des framboisières établies. · Appliquer sur un sol humide et frais, mais non gelé, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac). · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers. · **NE PAS** sarcler ni enfouir dans le sol. · **NE PAS** appliquer au printemps, sous peine d'endommager la culture.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	9 L/ha *4,5 kg/ha*	3,6 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · PRÉ — Appliquer **UNIQUEMENT** une fois par saison, à l'automne ou au printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** pulvériser sur sol gelé. · Éviter tout contact avec les fruits ou le feuillage.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) **ou** SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	2–2,5 kg/ha 3,6–4,5 L/ha 3,8–4,7 L/ha *1,8–2,25 kg/ha*	0,8–1 kg/ac 1,44–1,8 L/ac 1,52–1,88 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer dans 300–1000 L d'eau/ha (120–400 L/ac) avant la levée des mauvaises herbes. · Faire un traitement dirigé au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser les doses inférieures dans des sols sableux, grossiers. · Utiliser les doses supérieures dans les sols argileux ou riches en matière organique. · NE PAS pulvériser sur les jeunes pousses. · **NE PAS** traiter la première année de la plantation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1-2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles (l'idéal étant le stade 2–5 feuilles). · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement. Utiliser la dose supérieure de MERGE contre le chiendent commun. · Utiliser 100–200 L d'eau/ha (40–80 L d'eau/ac). · Ce traitement est sans effet contre les graminées qui lèvent par la suite. · Une inclinaison des buses à 45° vers l'avant donne un meilleur recouvrement. · **NE PAS** utiliser de buses à miroir ni de buses à jet en cône creux. · **NE PAS** traiter si l'on prévoit de la pluie dans l'heure qui suit. · **Respecter** un délai d'attente de 37 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Traiter au début du printemps au stade de préfloraison sur des graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. Un travail minutieux du lit de semence favorise une levée plus uniforme du chiendent commun. Sarcler 7 jours après le traitement. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	1,2 L/ha 0,98 L/ha 0,83 L/ha *0,55 kg/ha*	0,48 L/ac 0,39 L/ac 0,33 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Utiliser la préparation amine. · Pulvériser dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac). · **NE PAS** pulvériser quand les plants sont en floraison. · Éviter autant que possible que la bouillie atteigne les jeunes pousses. · Une pulvérisation localisée à raison de 1 kg de m.a./ha (0,4 kg de m.a./ac) peut être nécessaire pour maîtriser les pissenlits et autres dicotylédones établis.

* Voir le tableau 4-1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· **Convient aux cultures nouvellement plantées ou déjà établies.** · Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac). · Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL de GRAMOXONE dans 10 L d'eau pour mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Diriger le jet à la base des tiges au printemps avant l'apparition des nouvelles pousses.
GRAMOXONE (200 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *paraquat* *plus simazine*	5 L/ha 2–2,5 kg/ha *1 kg/ha* *1,8–2,25 kg/ha*	2 L/ac 0,8–1 kg/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes en germination. · Faire un traitement dirigé dans une plantation établie. · **NE PAS** pulvériser sur les jeunes pousses de framboisier. · Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac) de manière à bien mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Utiliser les doses inférieures dans des sols sableux, grossiers. · Utiliser les doses supérieures dans les sols argileux ou riches en matière organique.
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	6,67 L/ha *1 kg/ha*	2,7 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · S'utilise dans l'année de production des framboisiers cultivés suivant un système de production bisannuelle ou dans une plantation qui sera enlevée après la cueillette. · **NE PAS** appliquer sur les plants immatures ou faibles. · Appliquer lorsque les pousses ont 10–20 cm de haut pour supprimer les pousses de l'année et maîtriser les mauvaises herbes levées au moment du traitement. · Appliquer dans un minimum de 330 L d'eau/ ha (132 L/ ac). · Éviter que le produit ne dérive vers les tissus verts des tiges florifères.

GADELLIER ET GROSEILLIER À MAQUEREAU

Méthodes culturales de désherbage – Voir les notes sous *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures de petits fruits*, p. 285. Aucun herbicide de prélevée n'est homologué pour les plantations de gadelliers et de groseilliers à maquereau. Un paillis biodégradable peut être posé au pied des arbustes. Un paillis composé de paille peut aider à combattre les mauvaises herbes.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée.

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Herbicide non sélectif			
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· **Pour plantations établies UNIQUEMENT.** · Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac). · Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau pour mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Diriger le jet de manière à mouiller les mauvaises herbes et à éviter tout contact avec les feuilles et l'écorce tendre des buissons.

15. ARBRES FRUITIERS ET VIGNES

En avril 2009, le ministère de l'Environnement (MEO) modifiait sa *Loi sur les Pesticides* avec l'adoption de la *Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques* et du Règlement de l'Ontario 63/09. Les pesticides sont maintenant classés aux fins de vente et d'utilisation dans onze catégories différentes. Des exemptions sont prévues pour les usages agricoles (notamment pour la production de matériel de pépinière). Pour plus d'information sur les dispositions législatives, voir la page Web du MEO qui y est consacrée à *www.ontario.ca/interdictiondespesticides*.

Méthodes culturales de désherbage dans les cultures fruitières

Un programme efficace de lutte contre les mauvaises herbes doit intégrer des méthodes chimiques et des méthodes culturales. Les producteurs ne peuvent pas compter uniquement sur le désherbage chimique dans les cultures fruitières, car peu d'herbicides sont homologués à cette fin.

Lutte contre les mauvaises herbes vivaces

Il est important d'identifier et de combattre les mauvaises herbes vivaces l'année précédant la plantation. Une fois la plantation ou le verger établi, il est très difficile d'en venir à bout à cause de la sensibilité des cultures à certains herbicides et de l'impossibilité de travailler le sol sur toute la surface cultivée.

Les mauvaises herbes vivaces qui présentent de sérieux problèmes pour ces cultures sont les suivantes : chiendent commun, liseron, vesce, vigne sauvage, morelle vivace, chardons, lierre terrestre et bardane.

Pour tenir en échec les mauvaises herbes vivaces, des herbicides systémiques comme le glyphosate (p. ex. ROUNDUP) ou l'amitrole (p. ex. AMITROL 240) devraient être appliqués l'année précédant la plantation. Consulter l'étiquette afin d'utiliser l'herbicide à la dose recommandée et au stade de croissance approprié des mauvaises herbes. Appliquer l'herbicide au bon stade de croissance de la mauvaise herbe, à défaut de quoi, le traitement ne fera qu'en ralentir la croissance. Quelques espèces vivaces comme le liseron sont détruites par des hersages répétés.

Préparation du terrain

Un engrais vert comme le ray-grass anglais ou l'herbe du Soudan devrait être semé l'année précédant la plantation ou associé à d'autres méthodes de désherbage. Cette pratique fera obstacle à la croissance des mauvaises herbes et améliorera la structure du sol. Des herbicides non sélectifs peuvent être appliqués avant le semis de l'engrais vert et avant son enfouissement. Des herbicides sélectifs peu rémanents comme le 2,4-D peuvent être épandus sur les engrais verts, mais il faut éviter l'emploi d'herbicides dont les résidus subsisteraient dans le sol l'année de la plantation. Voir le chapitre 6, *Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Paillage

On peut poser une feuille de plastique biodégradable le long de la rangée de plantation pour empêcher la croissance des mauvaises herbes. Un paillis de paille contribuera à limiter la levée des mauvaises herbes sous les arbres ou entre les rangs si on l'épand tôt au printemps, avant la germination des mauvaises herbes. Utiliser un paillis qui ne contient pas de semence de mauvaises herbes et s'assurer que le sol contient assez d'azote pour alimenter les plants. Le paillis devrait être écarté du pied des arbres pendant l'hiver pour les protéger des rongeurs. Il est aussi possible d'épandre du petit gravier autour de la base des arbres. En plus de limiter la levée des mauvaises herbes, le gravier améliore le drainage, favorise l'enracinement en profondeur et décourage les rongeurs.

Réduction de la concurrence des mauvaises herbes

Le travail du sol élimine les mauvaises herbes entre les rangs. Une autre solution consiste à y implanter un couvert végétal vigoureux (gazon) qui s'oppose à l'installation des mauvaises herbes. Il est préférable de semer un gazon de fétuque que de compter sur un engazonnement naturel, car les graines de mauvaises herbes coloniseront la bande traitée à l'herbicide.

Empêcher les mauvaises herbes de s'installer dans les zones incultes avoisinantes et de monter à graines, en recourant à des pratiques culturales ou à des interventions chimiques. La tonte à intervalles réguliers empêche de nombreuses mauvaises herbes de fleurir. Éliminer les mauvaises herbes qui ont échappé au traitement, avant la formation des graines, par un sarclage ou un « fauchage chimique ». Dans certains cas, un outil comme le taille-bordure peut être efficace. Il existe des tondeuses rotatives qui coupent les mauvaises herbes près des arbres sans endommager ces derniers. Cependant, la tonte n'élimine pas définitivement les mauvaises herbes.

Rotation des différentes familles d'herbicides

(Voir le tableau 4–6, *Classement des herbicides utilisés en Ontario, p. 72*).

Dans les cultures pérennes, il est important d'utiliser en rotation des herbicides appartenant à différentes familles pour réduire l'accumulation de graines provenant des mauvaises herbes qui ont échappé aux traitements, y compris celles qui tolèrent les triazines. Un système de rotation empêche aussi l'accumulation dans le sol de résidus d'herbicides qui risquent de nuire aux cultures au bout de quelques années et d'empêcher ainsi tout projet de plantation.

Moments des traitements herbicides

Traitements de préplantation (PP)

On effectue ces traitements avant la plantation du verger ou du vignoble. Certains de ces traitements tuent les plantules de mauvaises herbes peu après la germination, alors que d'autres tuent aussi les graines de mauvaises herbes. La plupart des herbicides servant à ces traitements doivent être incorporés au sol par un travail du sol effectué peu après l'application. Consulter l'étiquette du produit utilisé. Voir également les détails sur les produits, les doses, ainsi que les remarques sous *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89.

Destruction des cultures couvre-sol et des mauvaises herbes en préplantation (PP)

Détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées avant de procéder aux plantations. Voir le tableau 6–1, *Herbicides non sélectifs destinés à la préparation du terrain en présemis*, p. 85. Une autre méthode consiste à détruire les plantes couvre-sol et les mauvaises herbes levées tout juste avant de procéder aux plantations, avec ou sans travail du sol.

Incorporation en présemis (IPS)

Sauf indication contraire, il est nécessaire d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

Prélevée (PRÉ)

De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 7–10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de prélevée. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas. Ces produits empêchent la levée des plantules de nombreuses mauvaises herbes sans réduire la densité de la culture. Épandre immédiatement après le semis ou au plus tard avant la levée des plantes cultivées. Ces herbicides ont peu d'effet sur les mauvaises herbes déjà levées, et ne donnent les meilleurs résultats que lorsque les conditions sont favorables à la germination des graines de mauvaises herbes.

Postlevée (POST)

Ces produits sont utilisés après la mise en place du verger ou du vignoble. Utilisés selon le mode d'emploi, ils tuent les mauvaises herbes sans nuire à la plante cultivée. Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides, pourvu qu'elles présentent une surface foliaire suffisante pour assimiler l'herbicide. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

Désherbage des entre-rangs

On peut désherber les entre-rangs en dirigeant l'herbicide sur les mauvaises herbes levées entre les rangs, si les autres méthodes ont échoué. On utilise alors un appareil à faible pression (7–15 kPa) comme la barre d'aspersion ou la buse oscillante vibrajet munie d'un écran de protection empêchant les plantes cultivées d'être mouillées. Voir *Désherbage des entre-rangs et techniques de semis sur sol nassis*, p. 90.

Désherbage sélectif par humectation

Les humecteurs à cordes, à rouleaux ou à brosses sont largement employés pour appliquer le glyphosate (ROUNDUP). En ce qui concerne les autres herbicides, vérifier sur le mode d'emploi si ces produits peuvent aussi être appliqués par humectation.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 15–1. Évaluation des herbicides pour les cultures fruitières

Nom commercial	Culture visée par l'homologation										Graminées annuelles						Dicotylédones annuelles						Vivaces																					
	pommier	abricotier	mûrier	cerisier, prunier	gadellier, groseillier	vigne	bleuetier en corymbe	pêcher	poirier	framboisier	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaires	panic capillaire	*Cenchrus*	stellaire moyenne	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	herbes à poux	liseron des champs	céraiste vulgaire	pissenlit	verge d'or	vigne sauvage	lierre terrestre	mauve	asclépiade	morelle grimpante	souchet	plantains	herbe à puce	chiendent commun	laiteron des champs	grande ortie	chardon des champs	vesces	vigne vierge commune
Anti-graminées radiculaires																																											
DUAL II MAGNUM	✓	✓		✓					✓		**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	-	6	2	7	2	**8**	4	0	-	5	-	-	-	-	0	-	**8**	5	-	0	0	0	0	0	0
FRONTIER						✓					**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	4	-	2	7	2	**8**	4	0	-	-	-	-	-	-	0	-	**8**	-	-	0	0	0	0	0	0
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																																										
CASORON	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	7	**6**	6	**6**	7	-	**8**	**7**	**8**	**3**	**8**	4	**7**	7	**7**	-	5	6	-	-	-	**7**	**7**	5	**7**	**7**	-	**7**	**7**	-
DEVRINOL	✓		✓				✓	✓	✓	✓	**8**	**9**	**8**	**8**	8	**8**	**7**	6	**8**	5	**8**	**7**	-	-	5	-	-	-	-	5	-	5	5	1	5	5	-	5	1	-
KARMEX						✓					9	**5**	5	**5**	8	-	9	9	**9**	9	**8**	**9**	-	-	5	-	-	-	-	5	-	5	-	-	5	5	-	5	-	-
KERB	✓								✓		**8**	**7**	**8**	**8**	**9**	8	**9**	7	9	8	9	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	**6**	6	-	-	-	-
LEXONE	✓	✓		✓[1]				✓	✓		**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	-	8	6	2	2	2	2	6	2	6	8	2	6	2	2	6	2	0
LOROX	✓			✓					✓		**7**	**6**	5	**8**	**9**	-	**9**	**7**	**9**	7	**8**	**8**	5	8	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	7	8	-	7	-	-
PRINCEP NINE-T, SIMADEX, SIMAZINE 480	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	**8**	**8**	6	**8**	8	-	8	9	**9**	9	9	**8**	2	-	5	-	-	-	-	0	-	5	-	-	6	5	-	5	0	-
SENCOR	✓	✓		✓[1]				✓			**7**	**8**	**9**	**8**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	0

[a] Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Indique que le produit est homologué pour la culture.

[a] Détruit seulement la partie aérienne; s'attendre à une repousse.

[b] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

[1] Pour les cerisiers seulement.

[2] Arbres non entrés en production seulement.

[3] Pour les pruniers seulement.

[4] Appliquer uniquement à l'aide d'un pulvérisateur muni d'écrans anti-dérive.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 15–1. Évaluation des herbicides pour les cultures fruitières (suite)

| Nom commercial | Culture visée par l'homologation | | | | | | | | | | Graminées annuelles | | | | | | Dicotylédones annuelles | | | | | | Vivaces | | | | | | | | | |

TABLEAU 15–1. Évaluation des herbicides pour les cultures fruitières (suite)

Nom commercial	Culture visée par l'homologation										Graminées annuelles						Dicotylédones annuelles						Vivaces																							
	pommier	abricotier	mûrier	cerisier, prunier	gadellier, groseillier	vigne	bleuetier en corymbe	pêcher	poirier	framboisier	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaires	panic capillaire	*Cenchrus*	stellaire moyenne	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	herbes à poux	liseron des champs	céraiste vulgaire	pissenlit	verge d'or	vigne sauvage	lierre terrestre	mauve	asclépiade	morelle grimpante	souchet	plantains	herbe à puce	chiendent commun	laiteron des champs	grande ortie	chardon des champs	vesces	vigne vierge commune
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																																													
AMITROL-240	✓										-	-	**8**	-	-	-	**7**	**6**	**6**	-	**5**	-	-	-	**9**	-	2	-	-	8	-	8	-	**8**	8	**8**	6	**8**	8	-
GLYPHOSATE*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	8/9[b]	-	8	5	**5**	**9**	-	**5**	**9**	**9**	**9**	**9**	5	**9**	5[a]	8[a]
GRAMOXONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]
GRAMOXONE + DEVRINOL	✓					✓			✓		9	9	**9**	**9**	**9**	-	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]
IGNITE	✓			✓[3]		✓		✓			9	9	9	**9**	9	-	9	**9**	**9**	8	**9**	9	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]	5	9	8[a]	8[a]	8[a]	8[a]

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

✓Indique que le produit est homologué pour la culture.

[a] Détruit seulement la partie aérienne; s'attendre à une repousse.

[b] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

[1] Pour les cerisiers seulement.

[2] Arbres non entrés en production seulement.

[3] Pour les pruniers seulement.

[4] Appliquer uniquement à l'aide d'un pulvérisateur muni d'écrans anti-dérive.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ABRICOTIER			
Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac). **MISE EN GARDE** — Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du verger.			
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,75 L/ha *1,6 kg/ha*	0,7 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
Anti-dicotylédones radiculaires			
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou** surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance. · **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · NE PAS appliquer à moins de 100 mètres de poiriers qui ne sont pas en dormance. · Utiliser du matériel d'application terrestre UNIQUEMENT. · NE PAS appliquer sur des arbres établis depuis moins de 2 ans. · NE PAS appliquer entre la floraison et la chute des feuilles, à moins d'utiliser du matériel de pulvérisation muni d'écrans ou de cônes anti-dérive.
DEVRINOL DF (50 DF) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *napropamide* *plus simazine*	7 kg/ha 2,25 kg/ha *3,5 kg/ha* *2 kg/ha*	2,8 kg/ac 0,9 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) plus SINBAR (80 WP) *napropamide* *plus terbacile*	9 kg/ha 0,6 kg/ha *4,5 kg/ha* *0,48 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,24 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LEXONE DF (75 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,75 L/ha 1 kg/ha *1,6 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus simazine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,5 kg/ha *1,14–1,6 kg/ha* *1–2,25 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–1 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Traiter une fois, dans l'année de plantation. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser la dose supérieure sur les vergers établis.
LEXONE DF (75 DF) *métribuzine*	0,5–1 kg/ha *0,38–0,75 kg/ha*	0,2–0,4 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · IPS — Appliquer avant de planter les arbres dans l'année des plantations. · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
PRINCEP NINE-T (90 WG) *simazine*	1,1–2,2 kg/ha *1–2 kg/ha*	0,44–0,88 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Faire ce traitement une fois par saison **SEULEMENT.** · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *métribuzine* *plus trifluraline*	0,55–0,75 kg/ha 1,25–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,42–0,56 kg/ha* *0,6–1,15 kg/ha*	0,22–0,3 kg/ac 0,5–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Traiter toute la surface ou seulement les rangs destinés à recevoir les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.
SINBAR (80 WP) plus LEXONE DF (75DF) *terbacile* *plus métribuzine*	0,63 kg/ha 1 kg/ha *0,5 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,25 kg/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Ne faire qu'un traitement par année. · **NE PAS** utiliser sur les sols à texture plus texture plus grossière que les loams sableux s'il s renferment moins de 3 % de matière organique.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TREFLAN EC (480 g/L)	1,25–2,4 L/ha	0,5–0,96 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.**
ou BONANZA 400 (400 g/L)	1,5–2,75 L/ha	0,6–1,1 L/ac	· IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres.
			· Appliquer dans au moins 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
trifluraline	*0,6–1,15 kg/ha*		· Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L)	0,32–1,1 L/ha	0,13–0,45 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.**
MERGE	1–2 L/ha	0,4–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active.
			· Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles.
séthoxydime	*0,15–0,5 kg/ha*		· Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha.
plus surfactant/solvant	*1–2 L/ha*		· Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L)	0,6–2 L/ha	0,24–0,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
			· Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage.
fluazifop-p-butyl	*0,075–0,25 kg/ha*		· Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané.
			· Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés.
			· Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires).
			· Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée.
			· **NE PAS** appliquer plus de 1 fois par année.
			· Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)*	2 L/ha	0,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou 2,4-D (564 g/L)*	1,68 L/ha	0,67 L/ac	· Contre les dicotylédones, y compris le pissenlit et les plantules de chardon des champs et de laiteron des champs.
ou 2,4-D (660 g/L)*	1,44 L/ha	0,58 L/ac	
			· Appliquer au début du printemps après la levée des mauvaises herbes ou après la cueillette sur des mauvaises herbes en croissance active.
*2,4-D**	*0,95 kg/ha*		· **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre.
			· **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la cueillette.
AIM EC (240 g/L)	36,5–117 mL/ha	14,8–47 mL/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.**
plus AGRAL 90	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.
ou AG-SURF	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	
ou MERGE	1 L/1000 L	1 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut.
			· Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
carfentrazone-éthyle	*8,8–28,1 g/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette.
plus surfactant non ionique	*0,25 % v/v*		· Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
ou *surfactant/solvant*	*0,1 % v/v*		· **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BASAGRAN (480 g/L) plus MERGE *bentazone* *plus surfactant/solvant*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Pour traitement dirigé uniquement. NE PAS pulvériser trop de bouillie. · Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha (40–160 L/ac) à une pression d'au moins 275 kPa. · Utiliser la dose inférieure de MERGE par temps chaud et humide. · Traiter **SEULEMENT** 2 fois, à 10 jours d'intervalle, à la dose de 1,75 L/ha (0,7 L/ ac), l'année de plantation.
Herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	2,25–12 L/ha 1,69–9 L/ha 1,62–8,64 L/ha 1,5–8 L/ha *0,81–4,32 kg/ha*	0,9–4,8 L/ac 0,68–3,6 L/ac 0,65–3,5 L/ac 0,6–3,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les mauvaises herbes en croissance active. · Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac). · Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement. · **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée. · **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte. · Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1 L/2 L d'eau 0,75 L/2 L d'eau 0,72 L/2 L d'eau 0,67 L/2 L d'eau *0,36 kg/2 L*		· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes. · Éviter tout contact avec les feuilles, les troncs et les gourmands. · **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées. · Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1–2 L/100 L d'eau 0,75–1,5 L/100 L d'eau 0,72–1,44 L/100 L d'eau 0,67–1,34 L/100 L d'eau *0,36–0,72 kg/100 L*		· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel. · Éviter tout contact avec les feuilles, troncs et gourmands. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac). · Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes. · Utiliser dans des vergers établis depuis au moins 1 an. · Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.

CERISIER ET PRUNIER

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).

MISE EN GARDE — Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du verger.

Anti-graminées radiculaires

DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,75 L/ha *1,6 kg/ha*	0,7 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.

Anti-dicotylédones radiculaires

LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	1 kg/ha *0,75 kg/ha*	0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires

CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer sur un sol frais et humide au printemps, avant la levée des mauvaises herbes ou après un sarclage. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · **NE PAS** traiter moins de 4 semaines après la plantation. · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac).

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 m de poiriers qui ne sont pas en dormance. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer sur des arbres établis depuis moins de 2 ans. · **NE PAS** appliquer entre la floraison et la chute des feuilles, à moins d'utiliser du matériel de pulvérisation muni d'écrans ou de cônes anti-dérive.
DEVRINOL DF (50 DF) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *napropamide* *plus simazine*	7 kg/ha 2,25 kg/ha *3,5 kg/ha* *2 kg/ha*	2,8 kg/ac 0,9 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.
DEVRINOL DF (50 DF) plus SINBAR (80 WP) *napropamide* *plus terbacile*	9 kg/ha 0,6 kg/ha *4,5 kg/ha* *0,48 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,24 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé. · Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LEXONE DF (75 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,75 L/ha 1 kg/ha *1,6 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus simazine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,5 kg/ha *1,14–1,6 kg/ha* *1–2,25 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–1 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Traiter une fois, dans l'année de plantation. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Le panic d'automne et la digitaire de fin de saison peuvent échapper à ce traitement. · Utiliser la dose supérieure dans les vergers établis.
LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	0,5–1 kg/ha *0,38–0,75 kg/ha*	0,2–0,4 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — Appliquer dans l'année des plantations seulement. · Homologué sur les cerisiers uniquement. · Faire un seul traitement sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LOROX DF (50 DF) *linuron*	8,6 kg/ha *4,3 kg/ha*	3,44 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Utiliser **UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis 10 ans. · PRÉ — Faire un traitement dirigé sur les mauvaises herbes de moins de 10 cm de haut. · Appliquer dans 400–600 L d'eau/ha (160–240 L/ac). · Ajouter un surfactant. · Utiliser **UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis 10 ans. · Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *métribuzine* *plus trifluraline*	0,55–0,75 kg/ha 1,2–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,42–0,56 kg/ha* *0,6–1,15 kg/ha*	0,22–0,3 kg/ac 0,48–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation. · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	1,25 kg/ha *1 kg/ha*	0,5 kg/ac	· **Année de plantation.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 3 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
SINBAR (80 WP) plus LEXONE DF (75DF) *terbacile* *plus métribuzine*	0,63 kg/ha 1 kg/ha *0,5 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,25 kg/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis.** · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation. · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Homologué sur les cerisiers uniquement. · **NE PAS** utiliser sur les sols à texture plus grossière que les loams sableux s'ils renferment moins de 3 % de matière organique.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation. · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Appliquer dans au moins 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. · **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	2 L/ha 1,68 L/ha 1,44 L/ha *0,95 kg/ha*	0,8 L/ac 0,67 L/ac 0,58 L/ac	· **Vergers établis.** · Contre les dicotylédones, y compris le pissenlit et les plantules de chardon des champs et de laiteron des champs. · Appliquer au début du printemps après la levée des mauvaises herbes ou après la cueillette sur des mauvaises herbes en croissance active. · **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre. · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la cueillette.
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance. · **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
BASAGRAN (480 g/L) ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Homologué sur les cerisiers uniquement. · Pour traitement dirigé uniquement. NE PAS pulvériser trop de bouillie. · Éviter tout contact avec les feuilles des arbres. · Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha (40–160 L/ac) à une pression d'au moins 275 kPa. · Utiliser la dose inférieure d'ASSIST par temps chaud et humide. · Traiter 2 fois, à 10 jours d'intervalle, à raison de 1,75 L/ha (0,7 L/ac), l'année de plantation.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)*	2,25–12 L/ha	0,9–4,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	1,69–9 L/ha	0,68–3,6 L/ac	· Contre les mauvaises herbes en croissance active.
ou glyphosate (500 g/L)*	1,62–8,64 L/ha	0,65–3,5 L/ac	· Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).
ou glyphosate (540 g/L)*	1,5–8 L/ha	0,6–3,2 L/ac	· Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement.
			· **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée.
*glyphosate**	*0,81–4,32 kg/ha*		· **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais.
			· Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.
			· Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
			· Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)*	1 L/2 L d'eau		· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75 L/2 L d'eau		· Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72 L/2 L d'eau		· Éviter tout contact avec les feuilles, les troncs et les gourmands.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67 L/2 L d'eau		· **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées.
*glyphosate**	*0,36 kg/2 L*		· Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
glyphosate (360 g/L)*	1–2 L/100 L d'eau		· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75–1,5 L/100 L d'eau		· À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72–1,44 L/100 L d'eau		· Éviter tout contact avec les feuilles, troncs et gourmands.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67–1,34 L/100 L d'eau		· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
*glyphosate**	*0,36–0,72 kg/100 L*		
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
			· Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes.
			· Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an.
			· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
			· Peut être mélangé en cuve avec le linuron si les arbres sont établis depuis au moins 10 ans.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Homologué sur les pruniers uniquement. · Faire un traitement dirigé avant que les mauvaises herbes atteignent 30 cm de haut. · Utiliser 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac). · Dans les zones très infestées, employer la dose supérieure et le volume d'eau supérieur. · **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette. · Ne convient qu'aux arbres établis depuis au moins 1 an.

PÊCHER

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).

MISE EN GARDE — Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du verger.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires

CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer sur un sol frais et humide au printemps, avant la levée des mauvaises herbes ou après un sarclage. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · **NE PAS** traiter moins de 4 semaines après la plantation. · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac).
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 m de poiriers qui ne sont pas en dormance. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer sur des arbres établis depuis moins de 2 ans. · **NE PAS** appliquer entre la floraison et la chute des feuilles, à moins d'utiliser du matériel de pulvérisation muni d'écrans ou de cônes anti-dérive.
DEVRINOL 50W (50 WP) *napropamide*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation. · Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes, mais non sur un sol gelé. · Éviter que le produit n'entre en contact avec les fruits et le feuillage.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) PRINCEP NINE-T (90 WG) *napropamide* *plus simazine*	7 kg/ha 2,25 kg/ha *3,5 kg/ha* *2 kg/ha*	2,8 kg/ac 0,9 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DEVRINOL DF (50 DF) plus SINBAR (80 WP) *napropamide* *plus terbacile*	9 kg/ha 0,6 kg/ha *4,5 kg/ha* *0,48 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,24 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,75 L/ha *1,6 kg/ha*	0,7 L/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LEXONE DF (75 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,75 L/ha 1 kg/ha *1,6 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus simazine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,5 kg/ha *1,14–1,6 kg/ha* *1–2,25 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–1 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Pulvériser après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Traiter une fois, dans l'année de plantation. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser la dose supérieure sur les vergers établis.
LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	0,5–1 kg/ha *0,38–0,75 kg/ha*	0,2–0,4 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. Faire un traitement unique sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres. · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser la dose supérieure sur les vergers établis.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LOROX DF (50 DF) *linuron*	8,6 kg/ha *4,3 kg/ha*	3,44 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Faire un traitement dirigé sur les mauvaises herbes de moins de 12 cm de haut, à raison de 400–600 L d'eau/ha (160–240 L/ac). · Utiliser uniquement sous les arbres établis depuis au moins 1 an. · Éviter tout contact direct ou par dérive avec les fruits, le feuillage ou l'écorce. · Ajouter un surfactant.
PRINCEP NINE-T (90 WG) *simazine*	1,1–2,2 kg/ha *1–2 kg/ha*	0,44–0,88 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Pulvériser après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Traiter une fois, dans l'année de plantation. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus TREFLAN EC 480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *métribuzine* *plus trifluraline*	0,55–0,75 kg/ha 1,25–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,42–0,56 kg/ha* *0,6–1,155 kg/ha*	0,22–0,3 kg/ac 0,5–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation. · Appliquer sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	1,25 kg/ha *1 kg/ha*	0,5 kg/ac	· **Année de plantation.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 3 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	2,25–4,5 kg/ha *1,8–3,6 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac). · Utiliser **SEULEMENT** sous des arbres établis depuis au moins 3 ans. · Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 3 % de matière organique.
SINBAR (80 WP) plus LEXONE DF (75DF) *terbacile* *plus métribuzine*	0,63 kg/ha 1 kg/ha *0,5 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,25 kg/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Faire **SEULEMENT** une application par année. · **NE PAS** utiliser sur les sols à texture plus grossière que les loams sableux s'ils renferment moins de 3 % de matière organique.
TREFLAN EC (480 g/L) BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Appliquer dans au moins 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · Appliquer sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. · **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	1 L–2 L/ha *0,125–0,25 kg/ha*	0,4–0,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 1 L/ha. Traiter au stade 2–6 feuilles. · Contre le chiendent commun, utiliser 2 L/ha. Traiter au stade 3–5 feuilles. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	2 L/ha 1,68 L/ha 1,44 L/ha *0,95 kg/ha*	0,8 L/ac 0,67 L/ac 0,58 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les dicotylédones, y compris le pissenlit et les plantules de chardon des champs et de laiteron des champs. · Appliquer au début du printemps après la levée des mauvaises herbes ou après la cueillette sur des mauvaises herbes en croissance active. · **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre. · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la cueillette.
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* ***ou** surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance. · **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Pour traitement dirigé uniquement. Ne pas pulvériser trop de bouillie. · Éviter tout contact avec les feuilles des arbres. · Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha (40–160 L/ac) à une pression d'au moins 275 kPa. · Utiliser la dose inférieure d'ASSIST par temps chaud et humide. · Traiter **SEULEMENT** 2 fois, à 10 jours d'intervalle, à la dose de 1,75 L/ha (0,7 L/ ac), l'année de plantation.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)*	2,25–12 L/ha	0,9–4,8 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	1,69–9 L/ha	0,68–3,6 L/ac	· Contre les mauvaises herbes en croissance active.
ou glyphosate (500 g/L)*	1,62–8,64 L/ha	0,65–3,5 L/ac	· Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).
ou glyphosate (540 g/L)*	1,5–8 L/ha	0,6–3,2 L/ac	· Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement.
			· **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée.
*glyphosate**	*0,81–4,32 kg/ha*		· **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais.
			· Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.
			· Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la récolte.
			· Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)*	1 L/2 L d'eau		· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75 L/2 L d'eau		· Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72 L/2 L d'eau		· Éviter tout contact avec les feuilles, les troncs et les gourmands.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67 L/2 L d'eau		· **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées.
*glyphosate**	*0,36 kg/2 L*		· Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11.
			· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
glyphosate (360 g/L)*	1–2 L/100 L d'eau		· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75–1,5 L/100 L d'eau		· À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72–1,44 L/100 L d'eau		· Éviter tout contact avec les feuilles, troncs et gourmands.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67–1,34 L/100 L d'eau		· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
*glyphosate**	*0,36–0,72 kg/100 L*		
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
			· Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes.
			· Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an.
			· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
			· Peut être mélangé avec DEVRINOL.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) plus DEVRINOL DF (50 DF) *paraquat* *plus napropamide*	5,5 L/ha 9 kg/ha *1,1 kg/ha* *4,5 kg/ha*	2,2 L/ac 3,6 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Mettre d'abord DEVRINOL dans la cuve, agiter, puis ajouter GRAMOXONE. · Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac). · Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an. · Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Faire un traitement dirigé avant que les mauvaises herbes atteignent 30 cm de haut. · Utiliser 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac). · Dans les zones très infestées, employer la dose supérieure et le volume d'eau supérieur. · **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette. · Ne convient qu'aux arbres établis depuis au moins 1 an.

POIRIER

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).

MISE EN GARDE — Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du verger.

Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires

CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer sur un sol frais et humide au printemps, avant la levée des mauvaises herbes ou après un sarclage. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · **NE PAS** traiter moins de 4 semaines après la plantation. · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac).
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer sur des poiriers dormants **UNIQUEMENT**. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer sur des arbres établis depuis moins de 1 an.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes, mais non sur un sol gelé. Éviter que le produit n'entre en contact avec les fruits et le feuillage. · **NE PAS** traiter quand des fruits jonchent le sol à l'époque de la cueillette. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *napropamide* *plus simazine*	7 kg/ha 2,25 kg/ha *3,5 kg/ha* *2 kg/ha*	2,8 kg/ac 0,9 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DEVRINOL DF (50 DF) plus SINBAR (80 WP) *napropamide* *plus terbacile*	9 kg/ha 0,6 kg/ha *4,5 kg/ha* *0,48 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,24 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,75 L/ha *1,6 kg/ha*	0,7 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LEXONE DF (75 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,75 L/ha 1 kg/ha *1,6 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus simazine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,5 kg/ha *1,14-1,6 kg/ha* *1-2,25 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–1 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres une fois par année avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser la dose supérieure dans les vergers établis. · Le panic d'automne et la digitaire de fin de saison peuvent échapper à ce traitement.
KERB (50 WSP) *propyzamide*	4,5 kg/ha *2,25 kg/ha*	1,8 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter entre la fin septembre et le début novembre lorsque le sol est frais et humide sans toutefois être gelé. · Utiliser **UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis au moins 1 an. · La dose de 4,5 kg/ha équivaut à 45 g/100 m^2.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	0,5–1 kg/ha *0,38–0,75 kg/ha*	0,2–0,4 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · IPS — avant de planter les arbres. · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser la dose supérieure sur les vergers établis.
LOROX DF (50 DF) *linuron*	8,6 kg/ha *4,3 kg/ha*	3,44 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Faire un traitement dirigé sur les mauvaises herbes de moins de 10 cm de haut. · Appliquer dans 400–600 L d'eau/ha (160–240 L/ac). Ajouter un surfactant. · Éviter tout contact direct ou par dérive avec les fruits, le feuillage ou l'écorce. · Utiliser **UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis au moins 10 ans.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) **ou** SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	2,5–5 kg/ha 4,5–9 L/ha 4,7–9,4 L/ha *2,25–4,5 kg/ha*	1–2 kg/ac 1,8–3,6 L/ac 1,88–3,76 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ – Appliquer dans 300–1000 L d'eau/ha (120–400 L/ac) avant la levée des mauvaises herbes. · Utiliser **UNIQUEMENT** sous des arbres plantés depuis au moins 1 an. · Pulvériser la dose supérieure contre les mauvaises herbes vivaces comme le chiendent commun. · Ce produit peut être associé au glyphosate.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *métribuzine* *plus trifluraline*	0,55–0,75 kg/ha 1,2–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,42–0,56 kg/ha* *0,6–1,15 kg/ha*	0,22–0,3 kg/ac 0,48–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — avant de planter les arbres sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	1,25 kg/ha *1 kg/ha*	0,5 kg/ac	· **Année de plantation.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 3 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
SINBAR (80 WP) plus LEXONE DF (75DF) *terbacile* *plus métribuzine*	0,63 kg/ha 1 kg/ha *0,5 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,25 kg/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · **Faire SEULEMENT** une application par année. · **NE PAS** utiliser sur les sols à texture plus grossière que les loams sableux s'ils renferment moins de 3 % de matière organique.
TREFLAN EC(480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Appliquer dans au moins 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · Appliquer sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. · **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	2 L/ha 1,68 L/ha 1,44 L/ha *0,95 kg/ha*	0,8 L/ac 0,67 L/ac 0,58 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les dicotylédones, y compris le pissenlit et les plantules de chardon des champs et de laiteron des champs. · Appliquer au début du printemps après la levée des mauvaises herbes ou après la cueillette sur des mauvaises herbes en croissance active. · **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre. · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la cueillette.
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance. · **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · Pour traitement dirigé uniquement. NE PAS pulvériser trop de bouillie. · Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha (40–160 L/ac) à une pression d'au moins 275 kPa. · Éviter tout contact avec les feuilles des arbres. · Utiliser la dose inférieure d'ASSIST par temps chaud et humide. · Traiter **UNIQUEMENT** 2 fois, à 10 jours d'intervalle, à la dose inférieure, l'année de plantation.
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	2,25–12 L/ha 1,69–9 L/ha 1,62–8,64 L/ha 1,5–8 L/ha *0,81–4,32 kg/ha*	0,9–4,8 L/ac 0,68–3,6 L/ac 0,65–3,5 L/ac 0,6–3,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les mauvaises herbes en croissance active. · Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac). · Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement. · **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée. · **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette. · Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–23, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1 L/2 L d'eau 0,75 L/2 L d'eau 0,72 L/2 L d'eau 0,67 L/2 L d'eau *0,36 kg/2 L*		· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes. · Éviter tout contact avec les feuilles, les troncs et les gourmands. · **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées. · Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1–2 L/100 L d'eau 0,75–1,5 L/100 L d'eau 0,72–1,44 L/100 L d'eau 0,67–1,34 L/100 L d'eau *0,36–0,72 kg/100 L*		· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel. · Éviter tout contact avec les feuilles, troncs et gourmands. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
GRAMOXONE (200 g/L) *paraquat*	5,5 L/ha *1,1 kg/ha*	2,2 L/ac	• **Vergers établis UNIQUEMENT.** • Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac). • Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes. • Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an. • Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre. • Peut être mélangé avec DEVRINOL ou PRINCEP.
GRAMOXONE (200 g/L) plus DEVRINOL DF (50 DF) *paraquat* *plus napropamide*	5,5 L/ha 9 kg/ha *1,1 kg/ha* *4,5 kg/ha*	2,2 L/ac 3,6 kg/ac	• **Vergers établis UNIQUEMENT.** • Mettre d'abord DEVRINOL dans la cuve, agiter, puis ajouter GRAMOXONE. • Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac). • Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an. • Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
GRAMOXONE (200 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *paraquat* *plus simazine*	5 L/ha 2–2,5 kg/ha *1 kg/ha* *1,8–2,25 kg/ha*	2 L/ac 0,8–1 kg/ac	• **Vergers établis UNIQUEMENT.** • Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes en germination. • Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an. • Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre. • Voir les précautions ci-dessus relatives à GRAMOXONE et à PRINCEP.
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,705 kg/ha*	1,08–2 L/ac	• **Vergers établis UNIQUEMENT.** • Faire un traitement dirigé avant que les mauvaises herbes atteignent 30 cm de haut. • Utiliser 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac). • Dans les zones très infestées, employer la dose supérieure et le volume d'eau supérieur. • **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette. • Ne convient qu'aux arbres établis depuis au moins 1 an.
IGNITE (150 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) *glufosinate ammonium* *plus simazine*	2,7–5 L/ha 2–5 kg/ha 4,5–9 L/ha *0,405–0,75 kg/ha* *1,8–4,5 kg/ha*	1,08–2 L/ac 0,8–2 kg/ac 1,8–3,6 L/ac	• **Vergers établis UNIQUEMENT.** • Détruit immédiatement les mauvaises herbes levées et empêche la levée des graminées et des dicotylédones annuelles. • Faire un traitement dirigé autour de la base des arbres établis depuis au moins 1 an. • **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette. • Voir les précautions relatives à IGNITE et à PRINCEP.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
POMMIER			
Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac). **MISE EN GARDE** — Les traitements à base de simazine, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du verger.			
Anti-graminées radiculaires			
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,75 L/ha *1,6 kg/ha*	0,7 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
KERB (50 WSP) *propyzamide*	4,5 kg/ha *2,25 kg/ha*	1,8 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter entre la fin septembre et le début novembre lorsque le sol est frais et humide sans toutefois être gelé. · **Utiliser UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis au moins 1 an. · La dose de 4,5 kg/ha équivaut à 45 g/100 m².
Anti-dicotylédones radiculaires			
LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	1 kg/ha *0,75 kg/ha*	0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	9,5–13,5 L/ha *2,25–3,25 kg/ha*	3,8–5,4 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre toutes les mauvaises herbes levées, y compris l'herbe à puce. · Traiter lorsque les mauvaises herbes sont pleinement développées de manière à bien mouiller les plants, jusqu'au sol. · Éviter autant que possible de pulvériser sur les troncs des arbres. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer sur un sol frais et humide au printemps, avant la levée des mauvaises herbes ou après un sarclage. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · **NE PAS** traiter moins de 4 semaines après la plantation. · **NE PAS** utiliser dans les sols sableux légers. · Pulvériser 70 g de CASORON G-4 sur une surface de 2 m x 2 m équivaut à pulvériser 175 kg/ha (70 kg/ac).

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 m de poiriers qui ne sont pas en dormance. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer sur des arbres établis depuis moins de 1 an. · **NE PAS** appliquer après le débourrement à moins d'utiliser un pulvérisateur muni d'écrans ou de cônes anti-dérive.
DEVRINOL DF (50 DF) *napropamide*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes, mais non sur un sol gelé. · Éviter que le produit n'entre en contact avec les fruits et le feuillage. · Faire un traitement dirigé, à basse pression. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement. · **NE PAS** traiter quand des fruits jonchent le sol à l'époque de la cueillette.
DEVRINOL DF (50 DF) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *napropamide* *plus simazine*	7 kg/ha 2,25 kg/ha *3,5 kg/ha* *2,025 kg/ha*	2,8 kg/ac 0,9 kg/ac	· Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DEVRINOL DF (50 DF) plus SINBAR (80 WP) *napropamide* *plus terbacile*	9 kg/ha 0,6 kg/ha *4,5 kg/ha* *0,48 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,24 kg/ac	· Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · **Année de plantation UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter à l'automne ou au début du printemps, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer sur un sol gelé ni durant la cueillette. · Incorporation au sol indispensable par pluie ou irrigation dans les 2 jours qui suivent le traitement.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) *s-métolachlore/benoxacor* *plus simazine*	1,25–1,75 L/ha 1,1–2,5 kg/ha *1,14–1,6 kg/ha* *0,99–2,25 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac 0,44–0,88 kg/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · Utiliser les doses supérieures dans les vergers établis.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) plus LEXONE DF (75 DF) *s-métolachlore/benoxacor* *plus métribuzine*	1,75 L/ha 1 kg/ha *1,6 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,7 L/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Appliquer en bande une fois par année sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
LEXONE DF (75DF) *métribuzine*	0,5–1 kg/ha *0,38–0,75 kg/ha*	0,2–0,4 kg/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — avant de planter les arbres. · Faire un traitement sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres.
LOROX DF (50 DF) *linuron*	9 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ — Faire un traitement dirigé sur les mauvaises herbes de moins de 10 cm de haut. · Appliquer dans 400–600 L d'eau/ha (160–240 L/ac). · Ajouter un surfactant. · Éviter tout contact direct ou par dérive avec les fruits, le feuillage ou l'écorce. · **Utiliser UNIQUEMENT** sous les arbres établis depuis au moins 10 ans.
PRINCEP NINE-T (90 WG) *simazine*	1,1–2,2 kg/ha *1–2 kg/ha*	0,44–0,88 kg/ac	· **Année de plantation.** · PRÉ — Pulvériser après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes, de préférence après qu'une pluie a tassé la terre autour des arbres. · Traiter une fois par saison. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 2 % de matière organique.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) **ou** SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	2,5–5 kg/ha 4,5–9 L/ha 4,7–9,4 L/ha *2,25–4,5 kg/ha*	1–2 kg/ac 1,8–3,6 L/ac 1,88–3,76 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · PRÉ – Appliquer dans 300–1000 L d'eau/ha (120–400 L/ac). · Utiliser seulement sous des arbres plantés depuis au moins 1 an. · Pulvériser la dose supérieure contre les mauvaises herbes vivaces comme le chiendent commun. · Ce produit peut être associé au glyphosate.
SENCOR 75 DF (75 WG) plus TREFLAN EC(480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *métribuzine* *plus trifluraline*	0,55–0,75 kg/ha 1,25–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,42–0,56 kg/ha* *0,6–1,15 kg/ha*	0,22–0,3 kg/ac 0,5–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· Traiter **SEULEMENT** une fois, dans l'année de plantation. · **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — avant de planter les arbres sur toute la surface ou seulement sur les rangs destinés à recevoir les arbres.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	1,25 kg/ha *1 kg/ha*	0,5 kg/ac	· **Année de plantation.** · PRÉ — Traiter après la plantation, avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** utiliser sur des sols sableux renfermant moins de 3 % de matière organique. · Éviter que le produit n'entre en contact avec le tronc et les feuilles des arbres.
SINBAR (80 WP) *terbacile*	2,25–4,5 kg/ha *1,8–3,6 kg/ha*	0,9–1,8 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac). · Utiliser seulement sous des arbres établis depuis au moins 3 ans.
SINBAR (80 WP) plus LEXONE DF (75DF) *terbacile* *plus métribuzine*	0,63 kg/ha 1 kg/ha *0,5 kg/ha* *0,75 kg/ha*	0,25 kg/ac 0,4 kg/ac	· **Vergers établis.** · PRÉ — Appliquer en bande sous les arbres avant la levée des mauvaises herbes. · Ne faire qu'un traitement par année. · **NE PAS** utiliser sur les sols à texture plus grossière que les loams sableux s'ils renferment moins de 3 % de matière organique.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,2–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,15 kg/ha*	0,48–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· **Année de plantation UNIQUEMENT.** · IPS — Appliquer et incorporer au sol avant de planter les arbres. · Traiter **SEULEMENT** une fois, l'année de plantation. · Appliquer dans au moins 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
Anti-graminées de postlevée			
POAST ULTRA (450 g/L) plus MERGE *séthoxydime* *plus surfactant/solvant*	0,32–1,1 L/ha 1–2 L/ha *0,15–0,5 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,13–0,45 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer sur des graminées en croissance active. · Contre les graminées annuelles, utiliser 0,32 L/ha. Appliquer au stade 1–6 feuilles. · Contre les céréales spontanées, utiliser 0,47 L/ha. · Contre le chiendent commun, utiliser 1,1 L/ha. Appliquer jusqu'au stade 3 feuilles. · **Respecter** un délai d'attente de 25 jours avant la cueillette.
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · **NE PAS** dépasser un traitement par année. · Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	2 L/ha 1,68 L/ha 1,44 L/ha *0,95 kg/ha*	0,8 L/ac 0,67 L/ac 0,58 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les dicotylédones, y compris le pissenlit et les plantules de chardon des champs et de laiteron des champs. · Appliquer au début du printemps après la levée des mauvaises herbes ou après la cueillette sur des mauvaises herbes en croissance active. · **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre. · **Respecter** un délai d'attente de 80 jours avant la cueillette.
AIM EC (240 g/L) plus AGRAL 90 **ou** AG-SURF **ou** MERGE *carfentrazone-éthyle* *plus surfactant non ionique* **ou** *surfactant/solvant*	36,5–117 mL/ha 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L *8,8–28,1 g/ha* *0,25 % v/v* *0,1 % v/v*	14,8–47 mL/ac 2,5 L/1000 L 2,5 L/1000 L 1 L/1000 L	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.** · Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut. · Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac). · **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la cueillette. · Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance. · **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
BASAGRAN (480 g/L) ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75–2,25 L/ha 1–2 L/ha *0,84–1,08 kg/ha* *1–2 L/ha*	0,7–0,9 L/ac 0,4–0,8 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Pour traitement dirigé uniquement. NE PAS pulvériser trop de bouillie. · Appliquer dans 100–400 L d'eau/ha (40–160 L/ac) à une pression d'au moins 275 kPa. · Éviter tout contact avec les feuilles des arbres. · Utiliser la dose inférieure d'ASSIST par temps chaud et humide. · Faire **UNIQUEMENT** 2 applications, à 10 jours d'intervalle, à la dose inférieure, l'année de plantation.
LONTREL 360 (360 g/L) *clopyralide*	0,56 L/ha *0,202 kg/ha*	0,22 L/ac	· **Vergers nouvellement plantés ou déjà établis.** · Maîtrise la vesce lorsqu'elle commence à fleurir. · Faire des pulvérisations localisées au printemps. · Éviter tout contact avec les branches. · **NE PAS** appliquer quand des fruits consommables se trouvent par terre. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	2,25–12 L/ha 1,69–9 L/ha 1,62–8,64 L/ha 1,5–8 L/ha *0,81–4,32 kg/ha*	0,9–4,8 L/ac 0,68–3,6 L/ac 0,65–3,5 L/ac 0,6–3,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Contre les mauvaises herbes en croissance active. · Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac). · Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement. · **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée. · **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette. · Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	1 L/2 L d'eau 0,75 L/2 L d'eau 0,72 L/2 L d'eau 0,67 L/2 L d'eau *0,36 kg/2 L*		· **Vergers établis UNIQUEMENT.** · Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes. · Éviter tout contact avec les feuilles, les troncs et les gourmands. · **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées. · Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11. · **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
glyphosate (360 g/L)*	1–2 L/100 L d'eau		· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75–1,5 L/100 L d'eau		· À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72–1,44 L/100 L d'eau		· Éviter tout contact avec les feuilles, troncs et gourmands.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67–1,34 L/100 L d'eau		· **Respecter** un délai d'attente de 30 jours avant la cueillette.
*glyphosate**	*0,36–0,72 kg/100 L*		
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
			· Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes.
			· Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an.
			· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
			· Peut être mélangé avec SINBAR, DEVRINOL ou la simazine.
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
plus DEVRINOL DF (50 DF)	9 kg/ha	3,6 kg/ac	· Mettre d'abord DEVRINOL dans la cuve, agiter, puis ajouter GRAMOXONE.
			· Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an.
plus napropamide	*4,5 kg/ha*		· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
GRAMOXONE (200 g/L)	5 L/ha	2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
plus PRINCEP NINE-T (90 WG)	2–2,5 kg/ha	0,8–1 kg/ac	· Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes en germination.
paraquat	*1 kg/ha*		· Utiliser sur des arbres établis depuis au moins 1 an.
plus simazine	*1,8–2,25 kg/ha*		· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
			· Voir les précautions ci-dessus relatives à GRAMOXONE et à PRINCEP.
IGNITE (150 g/L)	2,7–5 L/ha	1,08–2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
			· Faire un traitement dirigé avant que les mauvaises herbes atteignent 30 cm de haut.
glufosinate ammonium	*0,405–0,75 kg/ha*		· Utiliser 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac).
			· Dans les zones très infestées, employer la dose supérieure et le volume d'eau supérieur.
			· **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette.
			· Ne convient qu'aux arbres établis depuis au moins 1 an.
IGNITE (150 g/L)	2,7–5 L/ha	1,08–2 L/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
plus PRINCEP NINE-T (90 WG)	2–5 kg/ha	0,8–2 kg/ac	· Détruit immédiatement les mauvaises herbes levées et empêche la levée des graminées et des dicotylédones annuelles.
ou SIMADEX (500 g/L)	4,5–9 L/ha	1,8–3,6 L/ac	· Faire un traitement dirigé autour de la base des arbres établis depuis au moins 1 an.
glufosinate ammonium	*0,405–0,75 kg/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la cueillette.
plus simazine	*2,25–4,5 kg/ha*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PRINCEP NINE-T (90 WG)	2,25–5 kg/ha	0,9–2 kg/ac	· **Vergers établis UNIQUEMENT.**
plus glyphosate (360 g/L)*	2,25–12 L/ha	0,9–4,8 L/ac	· Détruit les mauvaises herbes en croissance active et empêche la levée des mauvaises herbes en germination.
ou glyphosate (480 g/L)*	1,67–8,9 L/ha	0,67–3,56 L/ac	· Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).
ou glyphosate (500 g/L)*	1,6–8,54 L/ha	0,64–3,41 L/ac	· Enlever tous les gourmands à la base des troncs avant le traitement.
ou glyphosate (540 g/L)*	1,48–7,9 L/ha	0,59–3,16 L/ac	· **NE PAS** traiter les arbres ayant de l'écorce tendre dans la zone traitée.
simazine	*2–4,5 kg/ha*		
plus glyphosate	*0,8–4,27 kg/ha*		

VIGNE

Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Désherbage par méthodes culturales — voir *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures fruitières*, p. 305.
Des buttages à intervalles réguliers au cours de l'année contribuent à lutter contre les mauvaises herbes. Il faut aussi se rappeler que tout remaniement du sol modifie la rémanence des herbicides.

Le sarclage, la pose d'un paillis ou la culture d'une plante comme le seigle entre les rangs, favorise la pénétration de l'eau et limite le développement des mauvaises herbes.

Le sarclage est nécessaire après les plantations pour niveler le sol. L'installation précoce de treillis ou le tuteurage limitent les dommages occasionnés par le sarclage. Le buttage destiné à la protection hivernale peut être entrepris à la fin de l'été; il contribue à la lutte contre les mauvaises herbes qui germent tardivement. L'enlèvement des buttes au printemps contribue aussi à lutter contre les mauvaises herbes.

Les doses recommandées /ha ou /ac sont exprimées en fonction de la superficie effectivement traitée. Sauf indication contraire, appliquer tous les produits dans 150–300 L d'eau/ha (60–120 L/ac).
MISE EN GARDE — Les traitements à base de simazine, de KARMEX, de DEVRINOL et de SINBAR peuvent laisser des résidus assez puissants pour endommager de nombreuses cultures, plusieurs années après la disparition du vignoble.

Anti-graminées radiculaires			
FRONTIER (900 g/L)	1,4 L/ha	0,56 L/ac	· **Vignes non productrices SEULEMENT.**
diméthénamide	*1,26 kg/ha*		· **NE PAS** cueillir le raisin dans les 2 années qui suivent le traitement effectué dans l'année de plantation. · **NE PAS** cueillir le raisin dans l'année qui suit le traitement effectué sur des vignes dans leur 2e année. · PRÉ — De la pluie est nécessaire dans les 10 jours qui suivent le traitement pour activer l'herbicide. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · Appliquer sur un sol exempt de mauvaises herbes après les plantations ou le déchaussage.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
FRONTIER MAX (720 g/L) *diméthénamide*	0,96 L/ha *0,69 kg/ha*	0,38 L/ac	· **Vignes non productrices SEULEMENT.** · **NE PAS** cueillir le raisin dans les 2 années qui suivent le traitement effectué dans l'année de plantation. · **NE PAS** cueillir le raisin dans l'année qui suit le traitement effectué sur des vignes dans leur 2e année. · PRÉ — De la pluie est nécessaire dans les 10 jours qui suivent le traitement pour activer l'herbicide. · Une seule application dirigée sous les vignes. · **NE PAS** appliquer par aéronef. · Appliquer sur un sol exempt de mauvaises herbes après les plantations ou le déchaussage.
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CASORON G-4 (4 Gr) *dichlobénil*	110–225 kg/ha *4,4–9 kg/ha*	44–90 kg/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · PRÉ – Appliquer sur un sol frais et humide mais non gelé à la fin de l'automne ou au printemps avant la levée des mauvaises herbes. · **NE PAS** appliquer si la température de l'air est supérieure à 10–15 °C, afin d'éviter des dommages dus à la vaporisation. · Appliquer **SEULEMENT** sur des vignes saines dormantes. · **NE PAS** traiter tant que les vignes ne sont pas établies depuis au moins 2 années complètes. · Contre les mauvaises herbes annuelles, utiliser 110–175 kg/ha (44–70 kg/ac). · Contre le chiendent commun et les dicotylédones vivaces, utiliser 175–225 kg/ha (70–90 kg/ac).
CHATEAU WDG (51,1 %) *flumioxazine*	0,28–0,42 kg/ha *0,14–0,21 kg/ha*	0,11–0,16 kg/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · **NE PAS** appliquer sur des vignes établies depuis moins de 2 ans. · Faire au plus 2 applications par saison de croissance en espaçant les traitements d'au moins 30 jours. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 m de poiriers qui ne sont pas en dormance. · Utiliser du matériel d'application terrestre **UNIQUEMENT**. · **NE PAS** appliquer après le débourrement à moins d'utiliser un pulvérisateur muni d'écrans ou de cônes anti-dérive.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
KARMEX (80 DF) *diuron*	2,25–6,7 kg/ha *1,8–5,36 kg/ha*	0,9–2,68 kg/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Faire un traitement dirigé sur une bande de 1 m sous les vignes, avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer dans au moins 300 L d'eau/ha (120 L/ac). · Utiliser **UNIQUEMENT** dans les vignobles établis depuis au moins 3 ans. · Utiliser une dose de 2,25–3,25 kg/ha de surface effectivement traitée si le sol est pauvre en argile ou en matière organique (1–2 %) et une dose de 3,25–6,75 kg/ha s'il est riche en argile ou en matière organique. · Faire le traitement juste avant la germination et la croissance des mauvaises herbes annuelles, habituellement au printemps. · Il peut être souhaitable de faire un traitement à l'automne ou de fractionner le traitement en deux applications égales effectuées à l'automne et au printemps. **NE PAS** dépasser les doses annuelles indiquées ci-dessus, sous peine d'endommager la culture. · Dans l'éventualité d'une deuxième application, respecter un intervalle minimal de 90 jours entre la première application et la seconde. · Peut être mélangé en cuve avec GRAMOXONE.
PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) **ou** SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	4–5 kg/ha 7,2–9 L/ha 7,5–9,4 L/ha *3,6–4,5 kg/ha*	1,6–2 kg/ac 2,9–3,6 L/ac 3–3,76 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · PRÉ — Traiter une fois les buttes enlevées, avant la levée des mauvaises herbes. · Appliquer dans au moins 300 L d'eau/ha (120 L/ac). · Pulvériser la dose supérieure contre les mauvaises herbes vivaces. · Utiliser **UNIQUEMENT** dans les vignobles établis depuis au moins 3 ans. · Peut être mélangé en cuve avec IGNITE et du glyphosate.
Anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· **Année de plantation, vignes non productrices dans leur 2e année et vignes établies** · Appliquer en POST sur les graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer en bande à la base des pieds de vigne. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Faire **UN SEUL** traitement par année. · Ce traitement est inefficace contre les graminées qui lèvent par la suite.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Anti-dicotylédones de postlevée			
AIM EC (240 g/L)	36,5–117 mL/ha	14,8–47 mL/ac	· **Vignes nouvellement plantées ou déjà établies.**
plus AGRAL 90	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer en POST entre les rangs à l'aide d'un **PULVÉRISATEUR MUNI D'ÉCRANS ANTI-DÉRIVE.**
ou AG-SURF	2,5 L/1000 L	2,5 L/1000 L	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance d'au plus 10 cm de haut.
ou MERGE	1 L/1000 L	1 L/1000 L	· Appliquer dans un minimum de 100 L d'eau/ha (40 L/ac).
carfentrazone-éthyle	*8,8–28,1 g/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 3 jours avant la vendange.
plus surfactant non ionique	*0,25 % v/v*		· Faire ce traitement **UNE SEULE FOIS** par saison de croissance.
ou *surfactant/solvant*	*0,1 % v/v*		· **AIM EC peut endommager la culture si la bouillie entre en contact avec l'écorce tendre, les feuilles, les fleurs ou les fruits.**
Choix de mélanges en cuve et d'herbicides non sélectifs			
glyphosate (360 g/L)*	2,25–12 L/ha	0,9–4,8 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	1,69–9 L/ha	0,68–3,6 L/ac	· Contre les mauvaises herbes en croissance active.
ou glyphosate (500 g/L)*	1,62–8,64 L/ha	0,65–3,5 L/ac	· Faire un traitement dirigé à raison de 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).
ou glyphosate (540 g/L)*	1,5–8 L/ha	0,6–3,2 L/ac	· **NE PAS** utiliser sur des vignes de moins de 3 ans.
			· Diriger la pulvérisation de manière à éviter les feuilles et les sarments verts des vignes.
*glyphosate**	*0,81–4,32 kg/ha*		· **NE PAS** tondre ni remuer les mauvaises herbes pendant au moins 5–7 jours après le traitement. Prolonger ce délai si le temps est frais.
			· Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.
			· Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse.
			· **Respecter** un délai d'attente de 14 jours avant la vendange.
			· Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
glyphosate (360 g/L)*	1 L/2 L d'eau		· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75 L/2 L d'eau		· Appliquer à l'aide d'un applicateur à corde ou autre appareil semblable au stade de croissance optimal des mauvaises herbes.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72 L/2 L d'eau		· Diriger la pulvérisation de manière à éviter les feuilles et les sarments verts des vignes.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67 L/2 L d'eau		· **NE PAS** appliquer lorsque les mauvaises herbes sont mouillées.
*glyphosate**	*0,36 kg/2 L*		· **NE PAS** utiliser sur des vignes de moins de 3 ans.
			· Voir la rubrique *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11.
			· **Respecter** un délai d'attente de 14 jours avant la vendange.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
glyphosate (360 g/L)*	1–2 L/100 L d'eau		· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	0,75–1,5 L/100 L d'eau		· À défaut d'un appareil de traitement par humectation, faire le traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur manuel.
ou glyphosate (500 g/L)*	0,72–1,44 L/100 L d'eau		· Diriger la pulvérisation de manière à éviter les feuilles et les sarments verts des vignes.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,67–1,34 L/100 L d'eau		· **NE PAS** utiliser sur des vignes de moins de 3 ans.
*glyphosate**	*0,36–0,72 kg/100 L*		· **Respecter** un délai d'attente de 14 jours avant la vendange.
glyphosate (360 g/L)*	2,25–12 L/ha	0,9–4,8 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
ou glyphosate (480 g/L)*	1,69–9 L/ha	1–2 kg/ac	· Traitement destiné aux vignes établies depuis au moins 3 ans.
ou glyphosate (500 g/L)*	1,62–8,64 L/ha		· Appliquer en pulvérisation dirigée en évitant le feuillage, les gourmands et l'écorce tendre des pieds de vigne.
ou glyphosate (540 g/L)*	1,5–8 L/ha		· Pulvériser la dose supérieure contre les mauvaises herbes vivaces et les fortes infestations.
plus PRINCEP NINE-T (90 WG)	2,5–5 kg/ha		· Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes annuelles en germination.
*glyphosate**	*0,81–4,32 kg/ha*		· Voir les précautions relatives à IGNITE et à la simazine.
plus simazine	*2,25–4,5 kg/ha*		· **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la vendange.
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
			· Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Pour un traitement localisé, pulvériser 55 mL dans 10 L d'eau de manière à mouiller le feuillage des mauvaises herbes.
			· Utiliser sur des vignes conduites sur treillis.
			· Éviter tout contact avec les fruits, le feuillage ou l'écorce tendre.
			· Peut être mélangé en cuve avec KARMEX.
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
plus TROPOTOX PLUS (400 g/L)	2,75 L/ha	1,1 L/ac	· Traiter vers la fin de mai ou le début de juin, ou quand le liseron commence à fleurir.
			· Traiter à raison de 1000 L d'eau/ha (400 L/ac) à basse pression pour que la pulvérisation soit grossière.
paraquat	*1,1 kg/ha*		· Pour un traitement localisé à l'aide d'un pulvérisateur à main ou d'une lance munie d'un écran protecteur, appliquer 55 mL de GRAMOXONE + 30 mL de TROPOTOX PLUS dans 10 L d'eau par 100 m^2.
plus MCPB/MCPA (15:1)	*1,1 kg/ha*		· Utiliser seulement en cas de nécessité et en traitements localisés, car TROPOTOX PLUS risque d'endommager la vigne.
			· Diriger la pulvérisation de manière à éviter les feuilles et les sarments des vignes.
GRAMOXONE (200 g/L)	5,5 L/ha	2,2 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.**
plus DEVRINOL DF (50 DF)	9 kg/ha	3,6 kg/ac	· Mettre d'abord DEVRINOL dans la cuve, agiter, puis ajouter GRAMOXONE.
			· Appliquer dans 1100 L d'eau/ha (440 L/ac).
paraquat	*1,1 kg/ha*		
plus napropamide	*4,5 kg/ha*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Les préparations ne sont pas nécessairement homologuées pour toutes les cultures. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
IGNITE (150 g/L) *glufosinate ammonium*	2,7–5 L/ha *0,405–0,75 kg/ha*	1,08–2 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · Traitement destiné aux vignes établies depuis au moins 3 ans. · Faire un traitement dirigé avant que les mauvaises herbes atteignent 30 cm de haut. · Éviter les gourmands et l'écorce tendre. · Utiliser 110–330 L d'eau/ha (44–132 L/ac). · Dans les zones très infestées, employer la dose supérieure et le volume d'eau supérieur. · **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la vendange.
IGNITE (150 g/L) plus PRINCEP NINE-T (90 WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) *glufosinate ammonium* *plus simazine*	2,7–5 L/ha 4–5 kg/ha 7,2–9 L/ha *0,405–0,75 kg/ha* *3,6–4,5 kg/ha*	1,08–2 L/ac 1,6–2 kg/ac 2,88–3,6 L/ac	· **Vignes établies UNIQUEMENT.** · Traitement destiné aux vignes établies depuis au moins 3 ans. · Appliquer en pulvérisation dirigée en évitant le feuillage, les gourmands et l'écorce tendre des pieds de vigne. · Détruit les mauvaises herbes levées et empêche la levée des mauvaises herbes annuelles en germination. · Voir les précautions relatives à IGNITE et à la simazine. · **Respecter** un délai d'attente de 40 jours avant la vendange.

Pépinière et

16. CULTURES DE PÉPINIÈRE ET CULTURES ORNEMENTALES

En avril 2009, le ministère de l'Environnement (MEO) modifiait sa *Loi sur les Pesticides* avec l'adoption de la *Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques* et du Règlement de l'Ontario 63/09. Les pesticides sont maintenant classés aux fins de vente et d'utilisation dans onze catégories différentes. Des exemptions sont prévues pour les usages agricoles (notamment pour la production de matériel de pépinière). Pour plus d'information sur les dispositions législatives, voir la page Web du MEO qui y est consacrée à *www.ontario.ca/interdictiondespesticides*.

Pour convertir les kg ou L/ha en g ou mL/100 m² — multiplier par 10 et remplacer les unités.
Exemple — 11 kg/ha devient 110 g/100 m² et 28,4 L/ha devient 284 mL/100 m².

INCORPORATION EN PRÉSEMIS (IPS) — Sauf indications contraires, il est recommandé d'enfouir l'herbicide par deux passages perpendiculaires d'un pulvériseur tandem (7–10 km/h) ou d'un vibroculteur à dents en S (10–13 km/h) sur une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires utilisés pour incorporer les herbicides sont reconnus pour propager les mauvaises herbes vivaces à des zones non infestées. Il est donc important de veiller à la propreté de la machinerie et/ou de traiter en dernier les champs envahis de mauvaises herbes vivaces.

PRÉLEVÉE (PRÉ) — De la pluie à raison de 15–20 mm dans les 7–10 jours qui suivent le traitement est indispensable pour activer les traitements de PRÉ. Un travail du sol superficiel, le passage de la houe rotative ou un hersage permet de maîtriser les mauvaises herbes qui échappent au traitement et d'améliorer l'activité herbicide s'il ne pleut pas.

POSTLEVÉE — Il est crucial de faire le traitement au bon stade foliaire des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes plus petites sont normalement plus sensibles à l'action des herbicides, pourvu qu'elles présentent une surface foliaire suffisante pour assimiler l'herbicide. Faire les traitements aux stades foliaires recommandés. Pour éviter d'endommager la culture, il est également important de tenir compte de son stade de croissance. Les adjuvants améliorent souvent l'efficacité des traitements, pourvu qu'on en respecte le mode d'emploi. Les conditions météorologiques ou autres peuvent influencer la dose optimale d'adjuvant; voir l'étiquette du produit pour plus de détails. Toujours recourir aux techniques permettant de limiter la dérive d'herbicides.

MISE EN GARDE — Lire les instructions du fabricant pour connaître le délai entre la plantation et le traitement.

MISE EN GARDE — Certaines espèces peuvent être endommagées par les herbicides mentionnés ci-dessous. Vérifier au préalable l'étiquette des produits pour connaître la liste des espèces sensibles.

Pour l'information la plus à jour sur les cultures de pépinières et les cultures ornementales, s'abonner au rapport consacré à ces cultures que le MAAARO diffuse sur sa page *www.omafra.gov.on.ca/english/crops/podcast/nursery/standard.xml*.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante, et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 16–1. Évaluation des herbicides pour le matériel de pépinière

	Graminées annuelles					Dicotylédones annuelles							Vivaces																			
Nom commercial	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaires	panic capillaire	stellaire moyenne	séneçon vulgaire	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	herbes à poux	liserons	brome	céraiste vulgaire	pissenlit	vigne sauvage	lierre terrestre	prêle	mauve	asclépiade	souchet	plantains	herbe à puce	chiendent commun	laiteron des champs	grande ortie	chardon des champs	linaire vulgaire	vesces	vigne vierge commune
Anti-graminées radiculaires																																
KERB	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**7**	-	7	8	8	7	7	-	8	-	-	-	-	5	-	6	6	-	-	**6**	-	-	6	-	-	-
Anti-dicotylédones radiculaires																																
BROADSTAR	3	3	3	5	3	8	8	7	**9**	-	**9**	**7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALLERY	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUREGUARD	3	3	3	5	3	8	8	7	**9**	-	**9**	**7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																																
CASORON	7	**6**	6	**6**	7	8	8	8	8	8	8	8	7	5	7	7	5	6	8	-	-	7	7	-	7	7	-	7	-	7	-
DACTHAL W 75	**8**	**8**	8	**8**	8	8	0	0	8	2	**6**	4	-	-	8	7	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
DEVRINOL	**8**	**9**	**8**	**8**	8	7	7	6	8	5	8	7	5	8	-	5	-	-	5	-	5	6	-	-	5	5	-	5	-	5	-
DUAL II MAGNUM	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	-	-	2	7	2	7	4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	8/9	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ECOCLEAR	-	9	-	9	-	**9**	-	-	**9**	9	-	8	-	-	**9**	7	-	-	-	-	-	-	**7**	-	**7**	-	-	-	**7**	**7**	-
RONSTAR 2G	**7**	**8**	-	8	-	5	8	-	8	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMADEX **ou** SIMAZINE 480 **ou** PRINCEP NINE-T	**8**	**7**	6	8	8	8	8	9	9	9	9	8	5	8	-	-	-	-	5	-	5	6	-	-	6	5	-	5	-	5	-
TREFLAN **ou** BONANZA **ou** RIVAL	**9**	**9**	8	**8**	8	7	5	2	8	2	8	2	2	-	7	-	-	-	4	-	5	5	-	-	2	2	-	2	-	2	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

[1] Ne pas laisser l'herbicide entrer en contact avec l'écorce verte ou les feuilles des sujets cultivés.

[a] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

TABLEAU 16–1. Évaluation des herbicides pour le matériel de pépinière (suite)

Nom commercial	Graminées annuelles					Dicotylédones annuelles							Vivaces																		
	échinochloa pied-de-coq	digitaire	panic d'automne	sétaires	panic capillaire	stellaire moyenne	séneçon vulgaire	renouée persicaire	chénopode blanc	moutardes, sisymbres, vélars	amarantes	herbes à poux	liserons	brome	céraiste vulgaire	pissenlit	vigne sauvage	lierre terrestre	prêle	mauve	asclépiade	souchet	plantains	herbe à puce	chiendent commun	laiteron des champs	grande ortie	chardon des champs	linaire vulgaire	vesces	vigne vierge commune
Anti-graminées de postlevée																															
VENTURE L	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	0	0	0	0	0	0	0	-	8	3	3	3	3	-	3	-	-	3	3	8	-	3	-	3	3	3
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																															
glyphosate*	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**[a]	**8**	5	5	5	9	**8**[a]	9	9	9	9	5	9	-	5[a]	8

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25.

[1] Ne pas laisser l'herbicide entrer en contact avec l'écorce verte ou les feuilles des sujets cultivés.

[a] Utiliser la dose supérieure contre les mauvaises herbes ayant plus de 15 cm de hauteur ou de largeur.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PLANTES ORNEMENTALES HERBACÉES			
Préparation du terrain avant les plantations – Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.			
Plantes ornementales herbacées — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
DACTHAL W-75 (75 WP)	17 kg/ha	6,8 kg/ac	· Appliquer au moment du repiquage en ligne, à la fin de l'automne ou au début du printemps, dans 340 L d'eau. · Les applications doivent se faire sur un sol auquel un travail récent a donné une texture uniforme. · De la pluie ou un arrosage (1 cm) est nécessaire pour activer l'herbicide. · **NE PAS** utiliser sur la germandrée ni sur les espèces des genres *Telanthera*, *Ajuga*, *Mesembryantheum*, *Dianthus*, *Viola*, *Phlox* et *Vinca minor*.
chlorthal-diméthyl	*12,75 kg/ha*		
TREFLAN EC (480 g/L)	1,25–2,4 L/ha	0,5–0,96 L/ac	· IPS — Incorporer la trifluraline avant le repiquage. · **NE PAS** utiliser sur des semis d'annuelles. · Vérifier l'étiquette pour connaître la liste des espèces tolérant cet herbicide. · Vérifier l'étiquette pour connaître la dose, puisqu'elle varie selon le type de sol.
ou RIVAL EC (500 g/L)	1,2–2,2 L/ha	0,48–0,94 L/ac	
ou BONANZA 400 (400 g/L)	1,5–2,75 L/ha	0,6–1,1 L/ac	
trifluraline	*0,6–1,155 kg/ha*		

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Plantes ornementales herbacées — anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Contre les espèces des genres *Campanula* et *Sedum*, **faire UNIQUEMENT des pulvérisations dirigées pour éviter tout contact avec la culture.** · Appliquer en POST sur des graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent avant les plantations rend la lutte plus efficace. · Bien des espèces sont tolérantes dans les cultures de plein champ seulement. Consulter l'étiquette pour connaître la liste des espèces tolérantes.

BRISE-VENT ÉTABLIS

Désherbage par méthodes culturales — voir *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures fruitières*, p. 305.

Préparation du terrain avant les plantations — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Brise-vent établis — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CASORON 4G (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· PRÉ — Traiter tôt au printemps ou tard à l'automne. · Utiliser la dose inférieure au printemps. · Espèces tolérantes : thuya, tilleul, érable, saule, caragana et frêne. Réduire les doses sur des sols plus légers.
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	17 kg/ha *12,75 kg/ha*	6,8 kg/ac	· Appliquer au moment du repiquage en ligne, à la fin de l'automne ou au début du printemps, dans 340 L d'eau. · Les applications doivent se faire sur un sol auquel un travail récent a donné une texture uniforme. · De la pluie ou un arrosage (1 cm) est nécessaire pour activer l'herbicide.
PRINCEP NINE-T (90WG) **ou** SIMAZINE 480 (480 g/L) *simazine*	2,5–3,75 kg/ha 4,7–7 L/ha *2,25–3,37 kg/ha*	1–1,5 kg/ac 1,88–2,8 L/ac	· PRÉ — Traiter à raison de 500 L d'eau/ha (200 L/ac). · Traiter à l'automne ou au printemps avant la levée des mauvaises herbes ou après arrachage des mauvaises herbes levées. · Les arbres qui composent le brise-vent doivent être établis depuis au moins 1 an. · Espèces tolérantes : thuya, épinette, noyer, frêne blanc, frêne vert, orme, érable négondo, érable et caragana. · Consulter l'étiquette pour connaître les espèces qui tolèrent les doses supérieures de simazine. Appliquer avant l'éclatement des bourgeons au printemps. · Appliquer les doses inférieures sur les sols sableux ou pauvres en matière organique.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** BONANZA 400 (400 g/L) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1,5–2,75 L/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,6–1,1 L/ac	· IPS — En pulvérisation dirigée au pied des arbres et des arbustes. · Incorporer aussi près que possible des arbres et arbustes sans endommager leurs racines.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Brise-vent établis — anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L)	0,6–2 L/ha	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer en POST sur des graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent avant les plantations rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entrelignes dans les 5 jours qui suivent le traitement.
fluazifop-p-butyl	*0,075–0,25 kg/ha*		
Brise-vent établis — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
glyphosate (360 g/L)	0,75–12 L/ha	0,3–4,8 L/ac	· Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps, avant la levée de la culture. · Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes traitées. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte s'imposent pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. · Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 6–3, *Évaluation des herbicides de postrécolte*, p. 92.
ou glyphosate (450 g/L)	0,6–9,6 L/ha	0,24–3,84 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)*	0,56–9 L/ha	0,22–3,6 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)*	0,54–8,64 L/ha	0,22–3,5 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	0,5–8 L/ha	0,2–3,2 L/ac	
*glyphosate**	*0,27–4,32 kg/ha*		

BRISE-VENT TRANSPLANTÉS

Préparation du terrain avant les plantations — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

Brise-vent transplantés — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
TREFLAN EC (480 g/L)	1,25–2,4 L/ha	0,5–0,96 L/ac	· IPS — Traiter après un bon travail du sol, et incorporer. · Planter les arbres ou arbustes de sorte que la majeure partie de leurs racines soit en dessous de la couche de sol traitée.
ou RIVAL EC (500 g/L)	1,2–2,2 L/ha	0,48–0,94 L/ac	
ou BONANZA 400 (400 g/L)	1,5–2,75 L/ha	0,6–1,1 L/ac	
trifluraline	*0,6–1,155 kg/ha*		

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Brise-vent transplantés — anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	· Appliquer sur des graminées en croissance active avant le tallage. · Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. · Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. · Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). · Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. · Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent avant les plantations rend la lutte plus efficace. · **NE PAS** sarcler les entrelignes dans les 5 jours qui suivent le traitement.

PÉPINIÈRE — PLANTES LIGNEUSES DE PLEIN CHAMP

Désherbage par méthodes culturales — voir *Méthodes culturales de désherbage dans les cultures fruitières*, p. 305.
Les méthodes mécaniques, comme le sarclage ou le binage, permettent de désherber dans les plantations sensibles ou d'éliminer les mauvaises herbes ayant échappé au traitement herbicide. Il existe des cultivateurs qui travaillent le sol entre les arbres et dans le rang.

Préparation du terrain avant les plantations — Voir le chapitre 6, *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis*, p. 89.

MISE EN GARDE — Lire les instructions du fabricant pour connaître le délai entre la plantation et le traitement.
MISE EN GARDE — Certaines plantes ligneuses en pot risquent d'être endommagées par les herbicides énumérés ci-dessous. L'étiquette des produits donne la liste des espèces/cultivars sensibles.

Plantes ligneuses de plein champ — anti-graminées radiculaires			
KERB (50 WP) *propyzamide*	3 kg/ha *1,5 kg/ha*	1,2 kg/ac	· PRÉ — Traiter vers la fin de l'automne, quand le sol est frais, mais non gelé. · Le niveau d'humidité du sol doit être élevé. · Cet herbicide est absorbé par les racines.
DUAL II MAGNUM (915 g/L) *s-métolachlore/benoxacor*	1,25–1,75 L/ha *1,14–1,6 kg/ha*	0,5–0,7 L/ac	· PRÉ — Appliquer dans au moins 150 L d'eau. · Appliquer au sol avant le débourrement du matériel de pépinière. · **NE PAS** appliquer dans les 4 semaines qui suivent le débourrement ni tant que les aiguilles n'ont pas durci. · S'utilise sur les semis des espèces suivantes à partir de leur deuxième année : épinettes blanche, de Norvège et noire, ainsi que pins blanc, de Banks et rouge. · S'utilise aussi dans les marcottières de peuplier. · D'une certaine efficacité en postlevée si l'application se fait avant que les mauvaises herbes atteignent le stade 2 feuilles.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Plantes ligneuses de plein champ — anti-dicotylédones radiculaires			
SUREGUARD (51,1%) *flumioxazine*	280–420 g/ha *143-215 g/ha*	112–168 g/ac	· Utiliser l'herbicide SureGuard comme herbicide de prélevée pour les arbres d'ornement à feuilles caduques ou conifères cultivés en pleine terre, y compris les arbres de Noël et les arbres cultivés pour le reboisement. · Les espèces tolérantes comprennent : *Abies balsamea, Abies fraseri, Acer ginnala, Fraxinus pennsylvanica, Picea pungens, Pseudotsuga menzesii, Syringa reticulata* et *Thuja occidentalis*. · **NE PAS** appliquer sur des sols de texture fine. · SureGuard devrait être appliqué dans les plantations d'arbres à feuilles caduques, sur un sol labouré et exempt de mauvaises herbes. · Ne l'appliquer que sur des arbres sains qui sont établis. · Ne pas l'incorporer au sol après l'application. · Ne pas l'appliquer sur du feuillage humide ni mouillé. · Ne pas dépasser deux applications par saison de croissance. · SUREGARD peut aussi servir à garder le sol dénudé sur des espaces non cultivés, à l'intérieur et aux environs des pépinières et des plantes ornementales cultivées en plein champ.
GALLERY (75 DF) *isoxabène*	1 kg/ha *0,75 kg/ha*	0,4 kg/ac	· PRÉ — Utiliser sur des plantules de conifères à racines nues ou en contenant. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes dans les conifères, au moins 4 semaines après la germination et la levée de la culture. · De la pluie ou un arrosage est nécessaire pour activer l'herbicide.
Plantes ligneuses de plein champ — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CASORON 4G (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4-7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· PRÉ — Traiter tard à l'automne ou tôt au printemps. · Utiliser la dose inférieure pour le traitement de printemps. · **NE PAS** traiter dans les 4 semaines qui suivent la plantation des sujets de deuxième année. · Réduire la dose sur un sol léger.
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	17 kg/ha *12,75 kg/ha*	6,8 kg/ac	· Appliquer au moment du repiquage en ligne, à la fin de l'automne ou au début du printemps, dans 340 L d'eau. · Les applications doivent se faire sur un sol auquel un travail récent a donné une texture uniforme. · De la pluie ou un arrosage (1 cm) est nécessaire pour activer l'herbicide.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DEVRINOL DF (50 DF) **ou** DEVRINOL 10G (10 Gr) *napropamide*	9 kg/ha 45 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac 18 kg/ac	· IPS — Appliquer à toute période de l'année sur un sol propre ou avant la germination des mauvaises herbes. · Traiter une fois seulement, avant ou au cours de la saison de croissance. · Le DEVRINOL doit atteindre la zone de germination des mauvaises herbes soit par incorporation mécanique, soit par une précipitation ou un arrosage suffisamment abondant. · Il faut enfouir l'herbicide mécaniquement entre 2,5 à 5,0 cm de profondeur, ou détremper le sol sur 5–10 cm, moins de 7 jours après un traitement de printemps ou d'automne et moins de 2 jours après un traitement d'été. · Le traitement d'automne assure le désherbage au cours du printemps et de l'été suivant. · **Mise en garde** — Des résidus suffisamment élevés pour endommager de nombreuses cultures peuvent persister dans le sol après des applications répétées dans des cultures vivaces.
DEVRINOL DF (50 DF) plus SIMAZINE 80W (80 WP) *napropamide* *plus simazine*	9 kg/ha 1,37 kg/ha *4,5 kg/ha* *1,1 kg/ha*	3,6 kg/ac 0,55 kg/ac	· IPS — Traiter seulement les plantations établies, avant la levée des mauvaises herbes. · Ce mélange permet de lutter contre un plus grand nombre de dicotylédones. · Voir les remarques concernant le DEVRINOL et la simazine.
PRINCEP NINE-T (90WG) **ou** SIMADEX (500 g/L) *simazine*	2,5–3,75 kg/ha 3,6–13,5 L/ha *2,25–3,4 kg/ha*	1–1,5 kg/ac 1,44–5,4 L/ac	· PRÉ — Appliquer avant la levée des mauvaises herbes dans des plantations établies seulement. · **NE PAS** planter de matériel de pépinière dans du sol traité, là où du matériel est enlevé. · **NE PAS** utiliser autour d'arbustes ornementaux si l'on compte installer à leur pied des plantes couvre-sol ou des plantes à massif. · **Mise en garde** — Des résidus suffisamment puissants pour endommager de nombreuses cultures peuvent persister dans le sol après des applications répétées.
TREFLAN EC (480 g/L) **ou** RIVAL EC (60 DF) *trifluraline*	1,25–2,4 L/ha 1–1,9 kg/ha *0,6–1,155 kg/ha*	0,5–0,96 L/ac 0,4–0,76 kg/ac	· IPS — Doit être incorporé tout de suite après le traitement, à la suite d'un bon hersage. · Ce traitement est inefficace contre l'herbe à poux, la morelle annuelle ou les moutardes sisymbres et vélars, et parfois contre la renouée persicaire.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Plantes ligneuses de plein champ — anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) *fluazifop-p-butyl*	0,6–2 L/ha *0,075-0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	• Appliquer en POST sur des graminées en croissance active avant le tallage. • Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. • Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. • Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). • Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. • Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent avant les plantations rend la lutte plus efficace. • **NE PAS** sarcler les entrelignes dans les 5 jours qui suivent le traitement. • Consulter l'étiquette pour connaître la liste des espèces tolérantes et sensisbles. Faire un traitement dirigé sur les espèces sensibles afin d'éviter tout contact avec le feuillage et les tissus verts. Certains genévriers bleus (par exemple 'Bar Harbour', 'Blue Acres' et 'Blue Rug') peuvent être endommagés par des applications sur le feuillage. • **Mise en garde** — Les cultivars diffèrent dans leur sensibilité au VENTURE L (p. ex. *Juniperus horizontalis* 'Blue Acres' est sensible, tandis que *Juniperus horizontalis* 'Plumosa Compacta' est tolérant). • Essayer ce produit sur un spécimen de chaque cultivar non spécifié sur l'étiquette avant d'utiliser l'herbicide, ou opter pour un traitement dirigé.
Plantes ligneuses de plein champ — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D AMINE (470 g/L)* plus GLYFOS (360 g/L) *2,4-D** *plus glyphosate*	1 L/ha 1 L/ha *0,470 kg/ha* *0,360 kg/ha*	0,4 L/ac 0,4 L/ac	• Traitement dirigé par pulvérisation sur le sol seulement. • Appliquer **UNIQUEMENT** sur le sapin baumier et le sapin Fraser. • Attendre que les arbres aient atteint 1,2 m de haut et éviter que la bouillie ne touche les branches. • Traiter une fois par année, en juin. • Appliquer le mélange dans 100 L d'eau/ha.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
AMITROL 240 *amitrole*	1,7–3,0 L/ha *0,39–0,69 kg/ha*	0,68–1,2 L/ac	• Appliquer **UNIQUEMENT** sur les épinettes (*Picea* spp.). • Appliquer en postlevée sur des plants en croissance active en s'assurant d'un bon recouvrement. • Si les mauvaises herbes sont à maturité, il est conseillé de les faucher, puis de pulvériser la bouillie sur la repousse. • **NE PAS** déranger les plants traités dans les 2 semaines qui suivent le traitement. • **NE PAS** faire de traitement de post-récolte après le 1er octobre. • Pour maîtriser le chiendent commun et le chardon des champs, appliquer au printemps ou à l'automne sur des plants en croissance active qui font 15–20 cm de haut. Attendre 10–14 jours, puis travailler le sol par un passage de la charrue ou d'une herse à disques. • Au printemps, éviter de traiter la culture pendant les périodes d'élongation rapide des pousses. • Le traitement peut se faire la première année (0,68 L/ac) dans les planches de semis ou les plants repiqués, mais uniquement après la nouaison. • La dose peut être augmentée à 1,2 L/ac pour les plants repiqués ou les plants de semis en croissance active d'épinette à racines nues après la première année.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	0,75–12 L/ha 0,6–9,6 L/ha 0,56–9 L/ha 0,54–8,64 L/ha 0,5–8 L/ha *0,27–4,32 kg/ha*	0,3–4,8 L/ac 0,24–3,84 L/ac 0,22–3,6 L/ac 0,22–3,5 L/ac 0,2–3,2 L/ac	• Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps, avant la levée de la culture. • Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes traitées. • Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte s'imposent pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. • Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. • Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 6–3, *Évaluation des herbicides de postrécolte*, p. 92.

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).

PLANTES LIGNEUSES DE PÉPINIÈRE — LITS DESTINÉS À RECEVOIR DES CONTENANTS

MÉTHODES CULTURALES — Un programme efficace de désherbage doit intégrer des méthodes culturales et des traitements chimiques.
Préparer la surface (ou planche) devant recevoir les pots de culture en y épandant une couche de gravier ou un couvre-sol tel une bâche en plastique noir ou un matériau tissé opaque. Ces couvre-sols doivent absolument empêcher la lumière de pénétrer de manière à prévenir la germination des graines de mauvaises herbes. Ils peuvent être utilisés pendant un certain nombre d'années avant d'être remplacés.

Les planches et les allées doivent être désherbées mécaniquement ou chimiquement. Empêcher les mauvaises herbes de s'installer dans les zones incultes avoisinantes et de monter à graines en recourant à des pratiques culturales ou à des interventions chimiques. La tonte à intervalles réguliers empêche de nombreuses mauvaises herbes de fleurir. Il faut s'efforcer de détruire les mauvaises herbes ayant échappé au traitement, avant la formation des graines, en sarclant ou en appliquant un herbicide. Dans certains endroits, comme le long des clôtures, un outil comme le taille-bordure peut être efficace. Chercher d'où viennent les graines de mauvaises herbes qui se retrouvent dans les pots, tels les peupliers, les saules, les épilobes et la vergerette du Canada.

Désherber les alentours des étangs d'irrigation de manière à ce que les petites graines de mauvaises herbes ne se retrouvent pas dans les pots après chaque arrosage. Un bon gazon vigoureux contribue à diminuer les infestations de mauvaises herbes de même qu'à stabiliser les berges. Un système de filtration interceptera les graines dans les tuyaux d'irrigation.

L'arrachage, avant leur floraison, des mauvaises herbes présentes dans les pots **doit être une priorité**. Une mauvaise herbe montée à graines peut éparpiller des centaines de graines en les projetant avec force ou en les laissant emporter par le vent. De nombreuses espèces indésirables installées dans les pots peuvent engendrer plusieurs générations par année car leurs graines n'ont pas besoin de vernaliser pour germer. Arracher et jeter les mauvaises herbes loin de la pépinière de façon à ce que les graines ne soient pas disséminées dans les pots adjacents.

Comme de nombreuses espèces de mauvaises herbes infestant les contenants survivent à l'hiver dans l'environnement protégé d'un tunnel de polyéthylène, il est important d'arracher toutes les mauvaises herbes présentes à l'automne. Il faut arracher les rosettes des annuelles d'automne comme la bourse-à-pasteur, la vergerette du Canada, ainsi que les plants établis et les plantules du mouron des oiseaux et du céraiste vulgaire qui, sinon, fleuriront au mois de mai ou même avant.

MISE EN GARDE — Lire les instructions du fabricant pour connaître le délai entre la plantation et le traitement.
MISE EN GARDE — Certaines plantes ligneuses en pot risquent d'être endommagées par les herbicides énumérés ci-dessous. L'étiquette des produits donne la liste des espèces/cultivars sensibles.

Préparation des lits destinés à recevoir des contenants — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
CASORON 4G (4 Gr) *dichlobénil*	110–175 kg/ha *4,4–7 kg/ha*	44–70 kg/ac	· PRÉ — Pulvériser sur le sol nu avant d'y installer les pots. · Traiter au printemps lorsque les températures sont fraîches et incorporer immédiatement, mécaniquement ou en irriguant. · Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer sur un sol renfermant plus de 2 % de matière organique. · Sur des sols graveleux ou sableux, ce traitement risque d'être irrégulier. · **NE PAS** couvrir les tunnels avec du polyéthylène moins de un mois après le traitement. · **NE PAS** traiter à l'intérieur des tunnels déjà recouverts de polyéthylène ou à l'intérieur des serres. · Voir la liste des espèces tolérantes sur l'étiquette. · **NE PAS** transplanter des végétaux dans des sols traités, avant au moins 1 an.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	17 kg/ha *12,75 kg/ha*	6,8 kg/ac	· Appliquer au moment du repiquage en ligne, à la fin de l'automne ou au début du printemps, dans 340 L d'eau. · Les applications doivent se faire sur un sol auquel un travail récent a donné une texture uniforme. · De la pluie ou un arrosage (1 cm) est nécessaire pour activer l'herbicide.
DEVRINOL 2G (2Gr) *napropamide*	225 kg/ha *4,5 kg/ha*	90 kg/ac	· Consulter la liste des espèces pour lesquelles DEVRINOL 2G est indiqué. · Appliquer au-dessus des contenants avant la levée des mauvaises herbes. Si des mauvaises herbes ont déjà levé, sarcler avant le traitement. · Arroser tout de suite après le traitement.
Préparation des lits destinés à recevoir des contenants — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L) **ou** glyphosate (480 g/L) **ou** glyphosate (500 g/L) **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	0,75–12 L/ha 0,6–9,6 L/ha 0,56–9 L/ha 0,54–8,64 L/ha 0,5–8 L/ha *0,27–4,32 kg/ha*	0,3–4,8 L/ac 0,24–3,84 L/ac 0,22–3,6 L/ac 0,22–3,5 L/ac 0,2–3,2 L/ac	· Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps, avant la levée de la culture. · Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes traitées. · Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte s'imposent pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite. · Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse. · Pour des détails sur les doses et les notes relatives aux mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
Plantes ligneuses de pépinière — plantes en contenants			
NE PAS pulvériser d'herbicides à l'intérieur des tunnels recouverts, ni dans les 4 semaines qui précèdent leur recouvrement. Certaines plantes ligneuses en pot risquent d'être endommagées par les herbicides énumérés ci-dessous. L'étiquette des produits donne la liste des espèces/cultivars sensibles.			

* Voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, pour connaître les préparations offertes. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
Plantes ligneuses de pépinière (plantes en contenants) — anti-dicotylédones radiculaires			
BROADSTAR (0,25 %) *flumioxazine*	84–168 kg/ha *21–42 kg/ha*	33,6–67,2 kg/ac	· S'utilise en prélevée pour combattre les mauvaises herbes envahissant les plantes ligneuses ornementales cultivées en contenants à l'extérieur. · S'utilise sur : *Acer ginnala, Acer palmatum, Buxus sempervirens, Juniperus horizontalis, Juniperus Sabina, Picea pungens, Picea glauca, Quercus rubra, Taxus x media, Thuja occidentalis.* · Appliquer avant la germination des graines de mauvaises herbes ciblées ou immédiatement après avoir remué le sol en surface. · L'herbicide BROADSTAR peut être appliqué en toute sécurité au-dessus de nombreuses espèces d'arbustes et d'arbres ornementaux ligneux, pourvu que l'utilisateur respecte le mode d'emploi figurant sur l'étiquette. · Appliquer sur le feuillage sec seulement. · Ne pas appliquer plus de deux fois par année. · Voir l'étiquette du produit pour plus d'information.
GALLERY (75 DF) *isoxabène*	1 kg/ha *0,75 kg/ha*	0,4 kg/ac	· PRÉ — Utiliser sur des plantules de conifères à racines nues ou en contenant. · Appliquer avant la levée des mauvaises herbes dans les conifères, au moins 4 semaines après la germination et la levée de la culture. · De la pluie ou un arrosage est nécessaire pour activer l'herbicide. · Homologué pour être utilisé uniquement par les membres de la Canadian Forest Weed Management Association.
Plantes ligneuses de pépinière (plantes en contenants) — anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires			
dichlobénil CASORON 4G (4 Gr)	4,4 kg/ha 110 kg/ha	44 kg/ac	· PRÉ — Traiter à partir de la quatrième semaine suivant la mise en pots, sur un terreau propre. · Traiter **au plus tard** le 15 septembre ou 30 jours avant la pose des abris pour l'hiver. · Pulvériser seulement sur des plantes en pot situées en plein air. · Homologué pour les espèces suivantes: *Juniperus chinensis, J. horizontalis* et *Thuja occidentalis.*
DACTHAL W-75 (75 WP) *chlorthal-diméthyl*	17 kg/ha *12,75 kg/ha*	6,8 kg/ac	· Appliquer au moment du repiquage en ligne, à la fin de l'automne ou au début du printemps, dans 340 L d'eau. · Les applications doivent se faire sur un sol auquel un travail récent a donné une texture uniforme. · De la pluie ou un arrosage (1 cm) est nécessaire pour activer l'herbicide.
DEVRINOL DF (50 DF) **ou** DEVRINOL 10G (10 Gr) *napropamide*	9 kg/ha 45 kg/ha *4,5 kg/ha*	3,6 kg/ac 18 kg/ac	· IPS — Appliquer à toute période de l'année sur un sol exempt de mauvaises herbes. · Ce traitement convient à des végétaux récemment mis en pot, une fois que le terreau est tassé à la suite du premier arrosage. · Incorporer en arrosant dans les 7 jours qui suivent le traitement si l'on traite au printemps ou à l'automne et dans les 2 jours si l'on traite en été. · Inefficace contre la cardamine.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
PRINCEP NINE-T (90 WG) *simazine*	2,5 kg/ha *2,25 kg/ha*	1 kg/ac	• PRÉ — Traiter à raison de 300 L d'eau/ha (120 L/ac). • Homologué **UNIQUEMENT** sur le genévrier, le thuya et l'if. • Traiter **SEULEMENT** une fois par saison, un mois après la plantation. • Appliquer avant la levée des mauvaises herbes ou après les avoir arrachées des contenants.
RONSTAR 2G (2 Gr) *oxadiazon*	100–225 kg/ha *2–4,5 kg/ha*	40–90 kg/ac	• PRÉ — Appliquer à toute période de l'année, avant la germination des graines de mauvaises herbes. • Peut être appliqué à la fois sur des arbres et arbustes d'ornement établis ou nouvellement transplantés. • **NE PAS** appliquer si le feuillage est mouillé ou dans des conditions qui permettraient aux granules de s'accumuler sur les feuilles. • Consulter l'étiquette pour connaître la liste des espèces tolérantes. • Appliquer au moins 4 semaines avant de couvrir les tunnels avec du polyéthylène à l'automne.
Plantes ligneuses de pépinière (plantes en contenants) — anti-graminées de postlevée			
VENTURE L (125 g/L) fluazifop-p-butyl	0,6–2 L/ha *0,075–0,25 kg/ha*	0,24–0,8 L/ac	• Appliquer sur des graminées en croissance active avant le tallage. • Appliquer 0,6 L/ha (0,24 L/ac) au stade 2–5 feuilles du maïs spontané. • Appliquer 0,8 L/ha (0,32 L/ac) au stade 2–5 feuilles du blé et de l'orge spontanés. • Appliquer 1 L/ha (0,4 L/ac) au stade 2–5 feuilles des graminées annuelles (2–4 feuilles des sétaires). • Appliquer 2 L/ha (0,8 L/ac) au stade 3–5 feuilles du chiendent commun et de la muhlenbergie feuillée. • Un bon travail du sol qui fragmente les rhizomes de chiendent avant les plantations rend la lutte plus efficace. • **NE PAS** sarcler les entrelignes dans les 5 jours qui suivent le traitement. • Consulter l'étiquette pour connaître la liste des espèces tolérantes. Faire un traitement dirigé sur les espèces sensibles afin d'éviter tout contact avec le feuillage et les tissus verts. Certains genévriers bleus (par exemple 'Bar Harbour', 'Blue Acres' et 'Blue Rug') peuvent être endommagés par des applications sur le feuillage. • **Mise en garde** — Les cultivars diffèrent dans leur sensibilité au VENTURE L. Par exemple, *Juniperus horizontalis* 'Blue Acres' est sensible, tandis que 'Plumosa Compacta' est tolérant. • Essayer ce produit sur un spécimen de chaque cultivar non spécifié sur l'étiquette avant d'utiliser l'herbicide, ou opter pour un traitement dirigé.

NOM COMMERCIAL (préparation) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
ALLÉES, PATIOS ET SENTIERS			
Allées, patios et sentiers — anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
ECOCLEAR (25 %) *acide acétique*	1 L/3 L d'eau **ou** 1L/2,5 L d'eau *(solution 33–40 %)*		• Appliquer sur les mauvaises herbes jeunes en croissance active quand les températures sont supérieures à 15 °C. • Un recouvrement complet est nécessaire à l'efficacité du traitement. • Utiliser la dose inférieure contre les mauvaises herbes annuelles qui sont peu développées (3 à 5 feuilles). • Utiliser la dose supérieure contre les vivaces et les mauvaises herbes annuelles qui sont plus développées. • Un seul traitement risque de ne pas maîtriser les mauvaises herbes presque à maturité, en fleurs, dormantes, ou endurcies par suite d'un stress dû à la sécheresse ou à la température, car elles tolèrent alors mieux les traitements au ECOCLEAR. • Après la destruction chimique initiale, un second traitement procure une maîtrise prolongée des vivaces. • Éviter que le produit n'entre en contact avec des métaux réactifs.
PLANCHES DE SEMIS ET TERREAU D'EMPOTAGE			
Planches de semis et terreau d'empotage — fumigants radiculaires			
BASAMID (98 Gr) *dazomet*	510 kg/ha *500 kg/ha*	204 kg/ac	• **NE PAS** traiter lorsque la température est inférieure à 6 °C. • Se référer aux indications du fabricant pour savoir en particulier comment sceller le sol, évacuer les gaz et effectuer des tests de germination.
VAPAM (380 g/L) *métam sodium*	10 L/100 m^2 dans 800 L d'eau *3,8 kg/100 m^2*		• Arroser abondamment le sol avec la solution de façon à ce qu'il soit imprégné du produit sur une profondeur d'au moins 8 cm. • **Attendre** 10–14 jours avant de mettre en culture et même davantage si le temps est frais.

17. GAZONS (TERRAINS DE GOLF, GAZONNIÈRES ET AUTRES USAGES ACCEPTÉS)

En avril 2009, le ministère de l'Environnement de l'Ontario modifiait sa *Loi sur les pesticides* en adoptant la *Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques* et le Règlement de l'Ontario 63/09. Aux fins de la vente et de l'utilisation, les pesticides sont maintenant classés dans onze catégories. Des exceptions sont prévues dans la loi pour les usages agricoles (y compris la production de plants de pépinière). Pour plus d'information sur les nouvelles dispositions législatives, voir le site Web du ministère de l'Environnement à www.ontario.ca/interdictiondespesticides.

Pour convertir les kg ou L/ha en g ou mL/100 m² — multiplier par 10 et remplacer les unités du dénominateur par 100 m²
Exemple — 11 kg/ha devient 110 g/100 m² et 28,4 L/ha devient 284 mL/100 m²

Lutte contre les mauvaises herbes dans les gazons

En Ontario, les principales dicotylédones qui infestent les gazons sont le pissenlit, le plantain, la lupuline, le céraiste vulgaire, la stellaire moyenne, la mauve, le lamier, le lierre terrestre et le trèfle blanc. Les principales graminées nuisibles sont la digitaire, le pâturin annuel, le chiendent commun, le dactyle pelotonné et l'agrostide.

Méthodes de lutte culturales

La façon la plus facile, la moins coûteuse et qui requiert le moins d'effort pour conserver un gazon exempt de mauvaises herbes est de lui appliquer un bon programme de soins qui encourage la croissance vigoureuse du gazon. La plupart des mauvaises herbes ne peuvent rivaliser avec un gazon dense et en bonne santé. Les pratiques qui favorisent une pousse vigoureuse empêchent donc l'établissement des mauvaises herbes. Ces soins comprennent la tonte, la fertilisation, l'irrigation et le drainage, la maîtrise du feutre racinaire, l'évitement du compactage, le choix d'espèces à gazon appropriées et le désherbage mécanique .

La **tonte** est une pratique avantageuse, car elle stimule le développement des bourgeons et le tallage, ce qui rend le gazon plus épais et plus dense. Couper les graminées les plus couramment utilisées, comme les fétuques, les pâturins et les ray-grass vivaces, à une hauteur de 4–6 cm. Si les graminées sont coupées plus ras, les mauvaises herbes peuvent prendre le dessus.

Éviter de tondre trop ras autour des arbres et des plates-bandes. Ne pas enlever plus du tiers de la surface foliaire lors de la tonte. Des tontes trop fréquentes peuvent réduire les réserves de glucides du gazon et, par conséquent, diminuer sa compétitivité. La tonte sert aussi à éliminer les mauvaises herbes annuelles avant qu'elles ne produisent des graines, réduisant ou prévenant ainsi leur propagation.

Les **engrais** sont particulièrement importants pour permettre l'établissement d'un gazon épais, dense et vigoureux. L'application régulière et opportune d'engrais peut aider le gazon à rivaliser avec les dicotylédones et les graminées adventices. Une carence en éléments nutritifs augmente la sensibilité du gazon aux infestations de mauvaises herbes et à certaines maladies. Cependant, une trop forte quantité d'engrais amollit et affaiblit le gazon qui devient alors plus sensible aux maladies et inapte à supporter le piétinement.

L'**irrigation** est particulièrement importante lorsque les précipitations normales ne fournissent pas l'eau nécessaire. Afin de produire un gazon épais et profondément enraciné, arroser chaque semaine en utilisant 2,0–2,5 cm d'eau par application.

Des arrosages fréquents et peu abondants ont un effet contraire sur les racines du gazon. Ils favorisent la germination et la croissance des espèces possédant un système racinaire peu profond comme la digitaire et l'agrostide stolonifère. Une trop forte irrigation favorise la multiplication du souchet comestible et du pâturin annuel. Arroser plus abondamment près des arbres et des haies, car ceux-ci absorbent beaucoup d'eau.

Le **drainage** est important pour assurer l'établissement d'un système racinaire sain et fonctionnel. Les sols engorgés ne fournissent pas aux racines l'air dont elles ont besoin pour remplir adéquatement leurs fonctions. Il faut donc, au besoin, installer un bon système de drainage.

Le **compactage** doit être évité si l'on veut prévenir l'invasion par les mauvaises herbes qui prospèrent dans des sols compactés. Le compactage consécutif à une circulation trop intense favorise souvent l'invasion par les renouées et le pâturin annuel. Il est possible d'atténuer le problème en aérant le sol, mais la véritable solution est d'éviter toute circulation trop intense. Il faut immédiatement ressemer les zones endommagées ou poser du gazon en plaques pour empêcher la propagation des mauvaises herbes.

Choisir l'**espèce de gazon** en tenant compte du milieu de croissance et de l'utilisation prévue. Par exemple, les fétuques tolèrent l'ombrage des arbres et ne nécessitent

pas beaucoup d'entretien. Les ray-grass vivaces à gazon poussent très rapidement dans les zones nouvellement semés et étouffent les mauvaises herbes en germination. Le pâturin, quoique très lent à s'établir, est très compétitif une fois établi.

Le **désherbage mécanique** est très efficace si les populations de mauvaises herbes ne sont pas trop importantes. On peut enlever les mauvaises herbes à la main, avec un couteau ou à l'aide d'une canne à désherber avec encoche en « V ». Il existe sur le marché de nombreux outils non sélectifs qui utilisent la vapeur, l'eau chaude, l'eau surchauffée, des brûleurs au propane, etc. pour lutter contre les mauvaises herbes. Peu de recherches ont été menées sur le degré de maîtrise des mauvaises herbes atteint à l'aide de ces nouveaux outils non sélectifs. Faire un essai sur une petite superficie pour déterminer leur efficacité. L'opérateur antiparasitaire doit prendre les précautions de sécurité nécessaires.

Désherbage chimique

L'information qui suit concerne les galonnières, les terrains de golf, les surfaces utilisées pour le boulingrin, le cricket, le tennis et le croquet ainsi que les terrains de sport où se déroulent des tournois nationaux et internationaux.

Lorsque les populations sont très importantes, le désherbage mécanique est souvent le moyen le plus facile, le plus efficace et le moins coûteux de lutter contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces.

Nouveau gazon

Après le semis d'un gazon, bien des mauvaises herbes annuelles peuvent lever avant les graines de gazon. Si ces mauvaises herbes ne sont pas éliminées, elles ombrageront les espèces à gazon et finiront par les étouffer. Un passage de tondeuse dont la lame est réglée à 6–8 cm de haut décapite la plupart de ces espèces. Si elles sont extrêmement denses, on peut faire un traitement au 2,4-D à la moitié de la concentration habituelle (0,4–0,6 kg dans 800 L d'eau/ha) ou au mécoprop-P (0,4–0,6 kg dans 400 L d'eau/ha), mais le gazon doit être levé depuis au moins 4 semaines.

Gazon établi

Le traitement au 2,4-D est plus efficace au printemps ou en septembre, quand les mauvaises herbes poussent vigoureusement. L'herbicide détruit habituellement une partie du trèfle. Les mauvaises herbes non détruites par le 2,4-D peuvent l'être par le mécoprop ou le dicamba ou par un mélange constitué de l'un ou l'autre de ces deux herbicides et de 2,4-D. Le mécoprop-P et le dicamba se vendent également en mélange avec le 2,4-D. Voir le tableau 18–2, *Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires*, p. 388, pour de l'information sur la réaction des mauvaises herbes courantes aux différents herbicides. Il importe de bien mouiller le feuillage des mauvaises herbes.

NE PAS pulvériser les mélanges contenant du dicamba près des arbustes et autres plantes ornementales sensibles, à des concentrations supérieures à 0,425 kg/ha de matière active. Les mélanges commerciaux de dicamba et de 2,4-D sont efficaces contre une large gamme de mauvaises herbes qui se trouvent dans les gazons, y compris la renouée des oiseaux contre laquelle la plupart des autres herbicides sélectifs sont inefficaces excepté lorsqu'elle est très jeune.

Anti-dicotylédones

Le 2,4-D maîtrise de nombreuses dicotylédones, y compris le pissenlit, les plantains, la bourse-à-pasteur, la renouée et la vesce.

Le mécoprop vient à bout de nombreuses mauvaises herbes tolérant le 2,4-D et le MCPA, comme la stellaire moyenne, les trèfles, le lierre terrestre et la lupuline et est en général plus sûr que le 2,4-D sur l'agrostide.

Le dicamba maîtrise les dicotylédones, y compris les espèces tolérant le 2,4-D comme la stellaire moyenne, les trèfles et les plantules de renouée, mais n'est pas réellement efficace contre le plantain.

Le MCPA maîtrise le pissenlit, les plantains et la bourse-à-pasteur. Les mauvaises herbes tolérantes au MCPA comprennent la stellaire moyenne, les trèfles et la lupuline. Des mélanges de deux et trois de ces herbicides permettent de combattre un plus large éventail de mauvaises herbes que l'un ou l'autre de ces herbicides utilisé seul.

Anti-graminées

On peut appliquer BETASAN, DIMENSION et des produits à base de farine de gluten de maïs avant la levée de la digitaire au printemps, et ACCLAIM SUPER ainsi que DIMENSION après sa levée. Les produits à base de farine de gluten de maïs peuvent aussi être appliqués à l'automne.

Moment des traitements

Préparation du terrain et traitements de présemis

Les traitements de présemis sont appliqués avant les semis ou la plantation. Voir également *Lutte contre les mauvaises herbes en présemis : Présemis — Préparation du terrain avant toute culture*, p. 89, pour des détails sur les produits et les taux d'application et des remarques.

Prélevée (PRÉ)

Des précipitations de l'ordre de 15–20 mm en l'espace de 7–10 jours après l'application sont nécessaires à l'activation des traitements de prélevée. Ces traitements empêchent la levée de nombreuses mauvaises herbes sans pour autant affecter la vigueur du gazon. Appliquer immédiatement après les semis ou au moins avant la levée du gazon.

Postlevée (POST)

Les herbicides sont appliqués après la germination des graines de gazon. Lorsqu'ils sont appliqués selon le mode d'emploi, ils peuvent détruire les mauvaises herbes sans causer de dommages au gazon. Il importe d'appliquer les herbicides au moment où les mauvaises herbes sont les plus sensibles. Les petites mauvaises herbes sont généralement plus faciles à détruire, mais une surface foliaire suffisante est nécessaire à l'interception de la quantité d'herbicide requise.

REMARQUES : L'efficacité des herbicides est évaluée en fonction d'une échelle de 0 à 9, où 0 correspond à l'absence de maîtrise et 9 à une maîtrise de 90–100 % sous des conditions idéales. Les cotes attribuées sont des valeurs subjectives qui reposent sur la meilleure information existante et fournissent des comparaisons générales fondées sur l'emploi décrit dans ce guide. Les cotes de tolérance de la culture sont les suivantes : E — Excellente, B — Bonne, P — Passable, M — Médiocre. Dans des conditions défavorables (temps trop sec, trop humide, trop froid ou travail mal exécuté, par exemple), les herbicides peuvent ne pas être aussi efficaces qu'on l'indique. L'efficacité d'un produit peut varier selon le stade phénologique de la mauvaise herbe ou de la culture, le moment du traitement et la dose employée. Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne. Se reporter à l'étiquette du produit pour plus d'information sur les mauvaises herbes combattues, les utilisations du produit et les précautions à prendre.

TABLEAU 17–1. Évaluation des herbicides pour les gazons

Nom commercial	digitaire	agrostide	pâturin annuel	stellaire moyenne	lupuline	céraiste vulgaire	trèfle blanc	pissenlit	lierre terrestre	renouée	mauve	souchet comestible	plantains	chiendent commun
Anti-graminées radiculaires														
BETASAN	**9**	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DACTHAL W75	**8**	-	-	**8**	-	8	-	7	-	-	-	0	0	0
DIMENSION	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-graminées de postlevée														
ACCLAIM SUPER	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSION	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-dicotylédones de postlevée														
2,4-D*	-	-	-	3	**5**	3	3	**9**	3	4	4	-	**9**	-
2,4-D/dicamba/mécoprop-P*	-	-	-	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**6**	**7**	6	-	**9**	-
BASAGRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**	-	-
glyphosate*	9	9	-	9	-	9	-	8	-	-	-	-	-	**9**
MCPA AMINE	-	-	-	4	4	**3**	**3**	**6**	3	3	3	-	**9**	-
MECOPROP, COMPITOX	-	-	-	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**7**	3	3	-	6	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Ce ne sont pas toutes les préparations qui sont homologuées pour les gazons. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

\- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

TABLEAU 17–1. Évaluation des herbicides pour les gazons (suite)

Nom commercial	digitaire	agrostide	pâturin annuel	stellaire moyenne	lupuline	céraiste vulgaire	trèfle blanc	pissenlit	lierre terrestre	renouée	mauve	souchet comestible	plantains	chiendent commun
mécoprop-P/2,4-D*	-	-	-	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**	**2**	**3**	3	-	**9**	-
SARRITOR	-	-	-	-	2	-	7	**7**	-	3	-	4	7	-
VANQUISH	-	-	-	8	6	**8**	**8**	9	8	8	6	-	4	-
Mélanges en cuve d'herbicides de postlevée														
2,4-D* + mécoprop-P*	-	-	-	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**	**2**	**3**	3	-	**9**	-

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Ce ne sont pas toutes les préparations qui sont homologuées pour les gazons. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

- Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

Les cotes **en gras** indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il détruit la partie aérienne.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TERRAINS DE GOLF, GAZONNIÈRES ET AUTRES USAGES ACCEPTÉS			
Herbicide de présemis			
Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).			
glyphosate (360 g/L)*	0,75–12 L/ha	0,3–4,8 L/ac	• Le glyphosate est un **herbicide non sélectif; le gazon mis en contact avec ce produit mourra**.
ou glyphosate (480 g/L)*	0,56–9 L/ha	0,22–3,6 L/ac	• Contre les mauvaises herbes en croissance active, à l'automne ou au printemps avant les semis (sous peine de faire mourir le gazon).
ou glyphosate (500 g/L)*	0,54–8,64 L/ha	0,22–3,5 L/ac	• Allouer 5–7 jours pour la diffusion du produit dans les plantes avant de travailler le sol lorsque les conditions sont bonnes. Si du temps frais suit le traitement, prolonger le délai alloué à la diffusion du produit avant de déranger les mauvaises herbes.
ou glyphosate (540 g/L)*	0,5–8 L/ha	0,2–3,2 L/ac	• Traitement efficace uniquement contre les mauvaises herbes levées au moment du traitement. D'autres mesures de lutte s'imposent pour maîtriser les mauvaises herbes qui lèvent par la suite.
*glyphosate**	*0,27–4,32 kg/ha*		• Pour une maîtrise complète, il peut être nécessaire de répéter le traitement sur la repousse.
			• Pour des détails sur les doses et les notes relatives à la maîtrise des mauvaises herbes annuelles et vivaces, voir le tableau 4–3, *Produits à base de glyphosate, usages homologués et doses nécessaires pour maîtriser différentes espèces de mauvaises herbes dans les cultures tolérant le glyphosate*, p. 66.
Anti-graminées de prélevée			
Appliquer dans 800–1000 L d'eau/ha (320–400 L/ac), à moins d'indication contraire.			
BETASAN (480 g/L)	23–30 L/ha	9,2–12 L/ac	• PRÉ — Appliquer avant la sortie de la digitaire, en début de printemps ou à l'automne sur un gazon établi.
ou BETASAN (GR) (12,5 Gr)	125 kg/ha	50 kg/ac	• Utiliser la dose inférieure contre la digitaire et la dose supérieure contre le pâturin annuel.
bensulide	*11–14,4 kg/ha*		• **NE PAS** ressemer la zone traitée avant un an.
			• **NE PAS** épandre de mousse de sphaigne sur le gazon avant le traitement.
			• N'utiliser **QUE** sur des sols minéraux.
DACTHAL W-75 (75 WP)	15,5 kg/ha	6,2 kg/ac	• PRÉ — Appliquer tôt au printemps, avant la germination des graines de mauvaises herbes.
chlorthal diméthyl	*11,625 kg/ha*		• Appliquer dans 450–1100 L d'eau/ha (180–440 L/ac).
			• **NE PAS** appliquer sur les agrostides Cohansey et Toronto.
			• **NE PAS** ressemer dans les 60 jours suivant le traitement.

* Différentes préparations sont disponibles; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Elles ne sont pas nécessairement homologuées pour le gazon. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DIMENSION (124 g/L) *dithiopyr*	3,5 L/ha 0,42 *kg/ha*	1,4 L/ac	• PRÉ — Appliquer sur un gazon établi avant que la digitaire lève. • Voir plus loin les remarques relatives au traitement en POST. • Appliquer dans 200–800 L d'eau/ha (80–160 L/ac). • Attendre que le gazon se soit remis de son aération ou de tout autre stress avant de faire le traitement. • **NE PAS** appliquer sur les verts durant la première année d'établissement. • Consulter l'étiquette pour connaître les cultivars sensibles, notamment les agrostides 'Colonial'. • **NE PAS** irriguer dans les 2 heures du traitement. • **NE PAS** ressemer dans les 3 mois qui suivent le traitement. • Peut être mélangé en cuve avec du KILLEX ou un autre anti-dicotylédones. • **NE PAS** mélanger en cuve avec d'autres produits destinés aux verts.
Inhibiteurs de la germination des graines de digitaire astringente et de pissenlit			
TRAITEMENT DE PRÉLEVÉE NUTRITE, INHIBITEUR DE GERMINATION DES GRAINES DE DIGITAIRE SANGUINE (à 100 % de farine de gluten de maïs) *farine de gluten de maïs*	980 kg/ha **ou** 9,8 kg/100 m^2	392 kg/ac **ou** 20 lb/1000 pi^2	• Peut inhiber la germination des graines de pissenlit et de digitaire astringente si conjugué à un bon programme d'entretien des gazons. • Sans effet contre les pissenlits et digitaires astringentes déjà levés ou établis au moment du traitement. • PRÉ — Appliquer deux fois par année sur un gazon établi : une fois au début du printemps et une fois à la fin de l'été ou au début de l'automne dans les terrains de sport, les parcs, les terrains de golf et les gazonnières. • Utiliser un épandeur rotatif. • Printemps : Appliquer 2 semaines avant la germination des graines de digitaire sanguine. • Fin d'été ou début d'automne : Appliquer une fois écartés les risques de stress dû à la chaleur. • Appliquer sur un gazon à maturité lorsqu'il est composé surtout de ray-grass vivace établi. • **NE PAS** appliquer sur un gazon nouvellement semé; attendre après la première tonte. • **NE PAS** traiter si le temps est venteux. • **NE PAS** appliquer au printemps s'il doit y avoir un sursemis ou un ressemis au printemps. • **NE PAS** appliquer à l'automne s'il doit y avoir un sursemis ou un ressemis à l'automne. • **NE PAS** appliquer si l'on est allergique au maïs.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
TRAITEMENT DE PRÉLEVÉE TURFMAIZE, INHIBITEUR DE GERMINATION DES GRAINES DE MAUVAISES HERBES (à 98 % de farine de gluten de maïs) *farine de gluten de maïs*	970 kg/ha **ou** 9,7 kg/100 m²	388 kg/ac ou 20 lb/1000 pi²	• Peut inhiber la germination des graines de pissenlit et de digitaire astringente si conjugué à un bon programme d'entretien des gazons. • Sans effet contre les pissenlits et digitaires astringentes déjà levés ou établis au moment du traitement. • Appliquer en PRÉ sur le pâturin des prés deux fois par année : une fois au début du printemps et une fois à la fin de l'été ou au début de l'automne. • Utiliser un épandeur rotatif. • Printemps : appliquer sur du pâturin des prés établi au début du printemps avant la germination des graines de digitaire astringente et de pissenlit. • Fin d'été-début d'automne : Appliquer sur du pâturin des prés établis vers la fin de l'été ou le début de l'automne une fois écartés les risques de stress dû à la chaleur. • Appliquer quand le sol est humide et que de la pluie est prévue dans les deux jours qui suivent. • S'il ne pleut pas dans les 2 jours, irriguer. • Trop d'humidité au moment du traitement peut réduire l'efficacité du traitement. • **NE PAS** appliquer sur un gazon nouvellement semé; attendre après la première tonte. • **NE PAS** appliquer au printemps s'il doit y avoir un sursemis ou un ressemis au printemps. • **NE PAS** appliquer à l'automne s'il doit y avoir un sursemis ou un ressemis à l'automne. • **NE PAS** appliquer si l'on est allergique au maïs.
Anti-graminées de postlevée			
Appliquer dans 400–800 L/ha (160–320 L/ac) d'eau.			
ACCLAIM SUPER (80,5 g/L) *fénoxaprop-p-éthyl*	1,14 L/ha *0,092 kg/ha*	0,46 L/ac	• POST — Combat la digitaire entre le stade 1–4 feuilles et de multiples talles. • Un bon recouvrement est indispensable pour maîtriser les mauvaises herbes possédant davantage de talles ou les graminées en phase reproductive. • Un deuxième traitement peut être nécessaire 21 jours après le premier, sur les gazons établis composés d'une seule espèce. • **NE PAS** pulvériser sur l'agrostide ni sur un jeune gazon de pâturin des prés. • **NE PAS** mélanger en cuve avec un autre herbicide ou produit antiparasitaire. • **NE PAS** pulvériser un herbicide anti-dicotylédones dans les 7 jours qui précèdent ou qui suivent une pulvérisation d'ACCLAIM SUPER. • **NE PAS** traiter pendant une période de sécheresse. • **NE PAS** tondre le gazon dans les 4 jours qui précèdent ou qui suivent le traitement. • **NE PAS** irriguer dans les 3 heures qui suivent le traitement.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
DIMENSION (124 g/L) *dithiopyr*	3,5–4,5 L/ha *0,42–0,54 kg/ha*	1,4–1,8 L/ac	· POST— Appliquer sur un gazon établi lorsque la digitaire atteint le stade 1–3 feuilles, avant le tallage. Traitement NON recommandé passé le stade 3 feuilles. Voir plus haut les remarques sur le traitement en PRÉ. · Utiliser la dose supérieure contre des plants plus hauts ou contre les fortes infestations. · Appliquer dans 200–800 L d'eau/ha (80–160 L/ac). · Attendre que le gazon se soit remis de son aération ou de tout autre stress avant de faire le traitement. · **NE PAS** appliquer sur les verts durant la première année d'établissement. · Consulter l'étiquette pour connaître les cultivars sensibles, notamment les agrostides 'Colonial'. · **NE PAS** irriguer dans les 2 heures du traitement. · **NE PAS** ressemer dans les 3 mois qui suivent le traitement. · Peut être mélangé en cuve avec KILLEX ou un autre anti-dicotylédones. · **NE PAS** mélanger en cuve avec d'autres produits destinés aux verts.
Anti-dicotylédones de postlevée			
Appliquer dans 200–400 L d'eau/ha (80–160 L/ac). Éviter le contact avec les plantes ornementales et les fleurs. Éviter de traiter par temps chaud et sec. **NE PAS** arroser, ratisser, ni tondre moins de 24 heures après le traitement. **NE PAS** traiter un gazon fraîchement semé tant qu'il n'a pas été tondu deux fois.			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	1,7–3 L/ha 1,42–2,48 L/ha 1,2–2,1 L/ha *0,8–1,4 kg/ha*	0,68–1,2 L/ac 0,57–1 L/ac 0,48–0,84 L/ac	· Combat de nombreuses dicotylédones, dont pissenlit, chénopode blanc, moutardes, sisymbres et vélars, lépidies, amarantes, plantains, bourse-à-pasteur, renouées et vesce. · Risque d'endommager l'agrostide. · Si on utilise ce produit sur l'agrostide, réduire la dose à 0,28 kg de matière active/ha. L'agrostide risque de jaunir.
2,4-D/dicamba/mécoprop-P (308 g/L)* *2,4-D/dicamba/mécoprop-P**	5,5 L/ha *1,7 kg/ha*	2,2 L/ac	· Combat des mauvaises herbes tolérant le 2,4-D et le MCPA telles que stellaire moyenne, céraiste vulgaire, trèfles, lierre terrestre et lupuline ainsi que bon nombre de dicotylédones, telles que pissenlit, chénopode blanc, moutardes, sisymbres et vélars, lépidies, amarantes, plantains, bourse-à-pasteur, renouées et vesces. · Dans l'agrostide tondu de près (p. ex. verts de golf), n'employer que la moitié de la dose seulement (30 mL/100 m²). · L'agrostide peut jaunir temporairement, mais reprend sa couleur une semaine après l'application. · Voir les remarques relatives à VANQUISH, p. 368.

* Différentes préparations sont disponibles; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Elles ne sont pas nécessairement homologuées pour le gazon. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* plus MECOPROP (150 g/L) *2,4-D** *plus mécoprop-P*	1,81–2,34 L/ha 1,51–1,95 L/ha 1,29–1,67 L/ha 5,67–7,34 L/ha *0,85–1,1 kg/ha* *0,85–1,1 kg/ha*	0,72–0,93 L/ac 0,6–0,78 L/ac 0,52–0,67 L/ac 2,27–2,93 L/ac	• Peut être combiné à VANQUISH (0,21 L/ha [0,08 L/ac]) pour lutter contre les plantules de renouée. • Risque d'endommager l'agrostide. • Dans les gazons nouvellement établis d'au moins 4 semaines, utiliser le 2,4-D à la moitié de la concentration habituelle (0,4–0,6 kg dans 800 L d'eau/ha) ou le mécoprop-P (0,4–0,6 kg dans 400 L d'eau/ha) contre les annuelles.
BASAGRAN (480 g/L) plus ASSIST *bentazone* *plus concentré d'huile*	1,75 L/ha 2 L/ha *0,84 kg/ha*	0,7 L/ac 0,8 L/ac	• Détruit la partie aérienne du souchet comestible. Appliquer quand le souchet est jeune et en croissance active. Faire 2 applications à 10 jours d'intervalle. • **NE PAS** tondre le gazon dans les 3–5 jours qui précèdent ou qui suivent le traitement. • **NE PAS** traiter un gazon nouvellement semé tant qu'il n'est pas bien établi.
COMPITOX (150 g/L) **ou** MECOPROP (150 g/L) *mécoprop-P*	5,5–8,5 L/ha *0,83–1,28 kg/ha*	2,2–3,4 L/ac	• Combat les mauvaises herbes tolérant le 2,4-D et le MCPA telles que stellaire moyenne, céraiste vulgaire, trèfles, lierre terrestre et lupuline, ainsi que de nombreuses dicotylédones. • Peut être appliqué sur l'agrostide. • Appliquer avant la floraison du pissenlit. • Des traitements répétés peuvent être nécessaires pour venir à bout du pissenlit et de la lupuline.
IPCO PREMIUM 2-WAY XP POUR PELOUSES ([1:1] 400 g/L) *mécoprop-P/2,4-D*	5 L/ha *2 kg/ha*	2 L/ac	• Peut être combiné à VANQUISH (0,21 L/ha [0,08 L/ac]) pour lutter contre les plantules de renouée. • Risque d'endommager l'agrostide. • Dans les gazons nouvellement établis d'au moins 4 semaines, utiliser le 2,4-D à la moitié de la concentration habituelle (0,4–0,6 kg dans 800 L d'eau/ha) ou le mécoprop-P (0,4–0,6 kg dans 400 L d'eau/ha) contre les annuelles.
MCPA AMINE (500 g/L)* *MCPA** 	2,2–2,8 L/ha *1,1–1,4 kg/ha*	0,88–1,12 L/ac	• Combat prêle des champs, pissenlit, chénopode blanc, moutardes, sisymbres et vélars, plantains, bourse-à-pasteur et carotte sauvage. • Éviter d'appliquer sur l'agrostide. Si cela est vraiment nécessaire, n'employer que 0,28 kg/ha seulement. L'agrostide risque de jaunir. • Le MCPA peut être utilisé à la place du 2,4-D. À une concentration légèrement supérieure au 2,4-D, il donne habituellement un résultat comparable. • L'efficacité contre le pissenlit et le plantain se trouve réduite par temps chaud et sec.
MECOTURF PLUS 2,4-D ([1:1] 400 g/L) *mécoprop-P/2,4-D*	4,25–5,5 L/ha *1,7–2,2 kg/ha*	1,7–2,2 L/ac	• Peut être combiné à VANQUISH (0,21 L/ha [0,08 L/ac]) pour lutter contre les plantules de renouée. • Risque d'endommager l'agrostide. • Dans les gazons nouvellement établis d'au moins 4 semaines, utiliser le 2,4-D à la moitié de la concentration habituelle (0,4–0,6 kg dans 800 L d'eau/ha) ou le mécoprop-P (0,4–0,6 kg dans 400 L d'eau/ha) contre les annuelles.

* Différentes préparations sont disponibles; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Elles ne sont pas nécessairement homologuées pour le gazon. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Pour plus d'information, voir le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75).
SARRITOR *Sclerotinia minor (souche IMI 344141)*	40–60 g/m²		• Détruit la partie aérienne du pissenlit et d'autres dicotylédones. • Traiter quand les maxima sont de 18–24 °C le jour et que de la pluie est prévue dans les 12 heures qui suivent le traitement. • Augmenter la dose quand les conditions environnementales sont sous-optimales ou que la pression exercée par les pissenlits est forte. • **NE PAS** tondre dans les 3 jours qui suivent le traitement. • **NE PAS** laisser SARRITOR entrer en contact avec des espèces non ciblées à préserver, sous peine de dommages graves.
VANQUISH (480 g/L) *dicamba*	1,25 L/ha *0,6 kg/ha*	0,5 L/ac	• **NE PAS** pulvériser sur l'agrostide. • **NE PAS** appliquer près des plantes vivaces à racines peu profondes qui risquent d'absorber le produit et d'en souffrir. • Combat les dicotylédones, y compris les mauvaises herbes tolérant le 2,4-D comme le stellaire moyenne, le céraiste vulgaire, les trèfles et les plantules de renouée, mais ne maîtrise pas convenablement les plantains. • Des mélanges préparés de VANQUISH et de 2,4-D sont efficaces contre une vaste gamme d'espèces envahissant les gazons, dont la renouée, contre lesquelles la plupart des herbicides sont sans effet, sauf lorsque les mauvaises herbes sont très jeunes. • **NE PAS** utiliser de mélanges renfermant du VANQUISH à proximité d'arbustes ou de plantes ornementales sensibles, à des doses dépassant 0,425 kg de m.a./ha. • **NE PAS** tondre le gazon dans les 3–5 jours qui précèdent ou qui suivent le traitement. • **NE PAS** traiter un gazon nouvellement semé tant qu'il n'est pas bien établi.
Remise en état			
Avant de remettre en état le gazon, le tondre et ratisser soigneusement tous les déchets végétaux.			
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	4,75–7 L/ha 3,54–5,2 L/ha 3,4–5 L/ha 3,15–4,6 L/ha *1,7-2,5 kg/ha*	1,9–2,8 L/ac 1,42–2,1 L/ac 1,36–2 L/ac 1,26–1,84 L/ac	• Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha (80 à 120 L/ac) après avoir omis au moins une tonte régulière. • Idéalement, attendre au moins 7 jours avant de travailler le sol pour permettre au produit d'atteindre les parties souterraines des plantes. • On peut ressemer directement sur la végétation morte (sans travail du sol préalable).

* Différentes préparations sont disponibles; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Elles ne sont pas nécessairement homologuées pour le gazon. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

18. BORDS DE ROUTES ET SOLS NON CULTIVÉS

BORDS DE ROUTES, EMPRISES, LISIÈRES DE CHAMPS ET ZONES NON CULTIVÉES

Lisières de champs et abords des installations agricoles

En zones agricoles, les lisières de champs, les abords de bâtiments de ferme et les bords de routes sont autant de foyers d'infestation d'où les mauvaises herbes peuvent se propager à d'autres parties de la ferme. En outre, les broussailles et les mauvaises herbes qui poussent en lisière des champs peuvent héberger des insectes, des maladies et des organismes nuisibles aux cultures. Des arbustes, comme le cerisier sauvage, peuvent être des sources d'intoxication pour le bétail.

Les agriculteurs désirent aussi parfois remettre en culture des terres qui ont été abandonnées aux saules ou aux broussailles. En outre, il est important de garder les fossés et les étangs de ferme exempts de végétation aquatique nuisible (voir le chapitre 19, *Mauvaises herbes aquatiques*, p. 393).

L'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques est entrée en vigueur le 22 avril 2009. Les exigences relatives à cette interdiction sont énoncées dans le Règlement de l'Ontario 63/09 pris en application de la Loi sur les pesticides.

L'interdiction des pesticides à des fins esthétiques ne vise pas les usages agricoles des pesticides de catégorie 9, mais les agriculteurs doivent s'y soumettre lorsqu'ils utilisent des pesticides pour l'entretien de pelouses et de plates-bandes entourant leur maison de ferme, lesquelles ne font pas partie d'une opération agricole.

Bords de routes, emprises et terres incultes

Conformément aux exemptions relatives à l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques, les pesticides de catégorie 9 peuvent être utilisés pour la promotion de la santé et de la sécurité publiques. Selon le Règlement de l'Ontario 63/09, la « promotion de la santé ou de la sécurité publiques » s'entend notamment de « l'extermination des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent aux ouvrages publics et aux autres bâtiments et ouvrages ». Dans le Règlement, « ouvrage public » est défini comme un « ouvrage affecté à un intérêt public et dont est propriétaire ou qu'exploite le gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un de ses conseils ou une de ses commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée, notamment :

- tout chemin de fer, canal, route, pont, centrale d'énergie, y compris tous les biens servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à la fourniture de l'énergie hydraulique ou électrique, système d'approvisionnement en gaz ou d'alimentation en eau, service public ou autre ouvrage. »

Nul ne doit utiliser un pesticide pour une destruction visant un ouvrage public, à moins de l'utiliser, selon le cas :

- pour empêcher que le parasite n'endommage l'intégrité structurale d'un ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes;
- pour faciliter l'entretien essentiel d'un ouvrage public, lorsque le parasite entraverait ou empêcherait cet entretien;
- pour permettre l'accès d'urgence à un ouvrage public, lorsque le parasite entraverait ou empêcherait cet accès;
- pour assurer la sécurité d'un ouvrage public, lorsque le parasite mettrait celle-ci en danger (p. ex. zones exempte de végétation à l'intérieur du périmètre de sécurité d'une centrale d'énergie);
- pour empêcher que le parasite n'endommage l'intégrité structurale d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage qui ne fait pas partie d'un ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes.
- Nul ne doit utiliser un pesticide de catégorie 9 pour les applications susmentionnées sur une section d'une voie publique à laquelle les piétons ont accès de façon régulière ou sur d'autres sections où le public est invité à s'arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.

Par ailleurs, à compter du 22 avril 2010, nul ne doit utiliser un pesticide de catégorie 9 lors d'une destruction visant un ouvrage public à moins d'être soit un destructeur titulaire d'une licence de destructeur et accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, soit un destructeur titulaire d'une licence de destructeur qui travaille selon les instructions écrites d'un destructeur accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée.

Le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage public doit veiller à ce que soit rédigé un rapport annuel énumérant tous les pesticides utilisés.

Les autorités responsables de services de chemins de fer et d'alimentation en énergie doivent maintenir leurs emprises sécuritaires et accessibles en maîtrisant la croissance des mauvaises herbes et des arbustes qui y poussent.

Par ailleurs, certains endroits (sous les glissières, dans les cours d'entrepôts, sous les voies ferrées, sous les clôtures situées près d'intersections routières) gagnent à être désherbés totalement avec un herbicide qui agit longtemps. Envisager l'emploi de méthodes de désherbage mécanique (p. ex. coupe ou tonte) et de pratiques culturales (p. ex. semis d'espèces que l'on désire conserver) en remplacement d'un herbicide. Le choix des désherbants totaux et leurs conditions d'emploi sont expliqués à la section *Désherbage total à long terme*, p. 383.

Quand on prévoit débroussailler chimiquement les bords de routes et les emprises, il faut tout particulièrement veiller à réduire au minimum les risques de dérive du phytocide. Il est conseillé d'inspecter ou de vérifier les bords de routes immédiatement avant la pulvérisation pour permettre la localisation de cultures sensibles, d'ouvrages de franchissement de cours d'eau, de sections de la voie publique auxquelles ont accès les piétons sur une base régulière ou d'autres sections où le public est invité à s'arrêter et d'autres zones fragiles. Le cas échéant, il faut poser des balises signalant à partir de quel endroit interrompre la pulvérisation et à partir de quel endroit la reprendre.

LUTTE CONTRE LES BROUSSAILLES

Contre les espèces ligneuses, plusieurs techniques sont envisageables : pulvérisation sur le feuillage et le tronc, pulvérisation sur l'écorce de la base des troncs, traitement par entailles ou traitement localisé.

Le choix de la technique dépend de différents facteurs comme le type de broussailles, l'accessibilité des lieux, le matériel dont on dispose, la proximité des espèces cultivées ou ornementales sensibles et l'importance du programme de débroussaillement.

Pulvérisation sur le feuillage et le tronc, jusqu'au ruissellement — la plupart des espèces à feuilles caduques

Ce traitement n'est indiqué que contre les broussailles basses (moins de 2 m de hauteur). La pulvérisation doit mouiller complètement le feuillage et les tiges (jusqu'à ce que la bouillie s'en égoutte). Les traitements effectués lorsque les feuilles sont complètement déployées, à la fin du printemps ou au début de l'été, sont les plus efficaces.

Pour détruire des buissons composés de diverses espèces à feuilles caduques, il faut choisir l'herbicide le plus efficace contre les espèces dominantes (tableau 18-1, *Classement des espèces ligneuses selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires de mélanges et de produits herbicides*, p. 386) ou l'herbicide le moins dangereux si les broussailles visées sont situées près d'habitations ou de zones récréatives, par exemple.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	3,6–9 L/1000 L 3–8,5 L/1000 L 2,6–7,3 L/1000 L *1,7–4,8 kg/1000 L*		• Un seul traitement suffit à détruire les espèces sensibles. • Contre les espèces moyennement sensibles, plusieurs traitements s'imposent normalement.
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	7,5–10 L/1000 L 7,5–10 L/1000 L 8,75–11,7 L/1000 L 8,75–11,7 L/1000 L 8–11 L/1000 L *5,1–6,8 kg/1000 L*		• Pulvériser l'**ester peu volatil** dans les zones où prédominent les espèces censées tolérer le 2,4-D seul.
GARLON 4 (480 g/L) *triclopyr*	4–8 L/1000 L *1,92–3,84 kg/1000 L*		• Pulvériser jusqu'au ruissellement quand les broussailles sont en pleine croissance. • Utiliser la dose supérieure contre les espèces difficiles à maîtriser.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	10–20 L/1000 L 7,5–15 L/1000 L 7,2–14,4 L/1000 L 6,67–13,3 L/1000 L *3,6–7,2 kg/1000 L*		• Contre la plupart des espèces ligneuses et herbacées. Peut être appliqué en juin, en juillet ou en août. • Ce traitement endommage les graminées; utiliser des produits sélectifs s'il y a des graminées à conserver.
KRENITE (480 g/L) *fosamine d'ammonium*	10–15 L/1000 L *4,81–7,21 kg/1000 L*		• Contre chêne, érable, aulne, caryer et frêne. • Contre les espèces tenaces, il faut souvent ajouter un surfactant à la bouillie.
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	10 L/1000 L *3,05 kg/1000 L*		• Inefficace contre le frêne blanc. • Pulvériser sur les troncs et sur les feuilles complètement déployées, jusqu'au ruissellement. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)* *dicamba* *plus 2,4-D**	4 L/1000 L 8 L/1000 L *1,9 kg/1000 L* *3,8 kg/1000 L*		• Pulvériser sur les feuilles complètement déployées, jusqu'au ruissellement.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) *dicamba* *plus dichlorprop/2,4-D*	5,2 L/1000 L 7,15 L/1000 L *2,5 kg/1000 L* *4,9 kg/1000 L*		• Contre frêne blanc et érable à sucre. • Pulvériser sur les feuilles complètement déployées, jusqu'au ruissellement.
Pulvérisations foliaires à volume constant — la plupart des espèces ligneuses à feuilles caduques (non compris le frêne blanc)			
Pour lutter contre les broussailles sur le bord des routes et autres emprises			
ARSENAL (240 g/L) *imazapyr*	3 L/ha *0,72 kg/ha*	1,2 L/ac	• Contre érable, peuplier, framboisier et rosier sauvage. • Pulvériser sur de la végétation en pleine croissance en utilisant suffisamment d'eau (100–550 L/ha) (40–220 L/ac) pour mouiller tout le feuillage.
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	5,5–15 L/ha 6,5–17,5 L/ha *3,8–10,2 kg/ha*	2,2–6 L/ac 2,6–7 L/ac	• Appliquer dans 750–1500 L d'eau/ha (300–600 L/ac) sur les végétaux en pleine croissance. • Les doses varient selon la densité ou la hauteur des broussailles.
GARLON 4 (480 g/L) *triclopyr*	4–8 L/ha *1,92–3,84 kg/ha*	1,6–3,2 L/ac	• Pulvériser cet **ester peu volatil**, dans au moins 200 L d'eau/ha (80 L/ac), pendant la période de croissance active.
TORDON 101 ([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	18–25 L/ha *5,49–7,62 kg/ha*	7,2–10 L/ac	• Pulvériser sur la végétation en pleine croissance dans 450 L d'eau/ha (180 L/ac). • Utiliser un dispositif ou un adjuvant antidérive approuvé. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)* *dicamba* *plus 2,4-D**	4,2 L/ha 8 L/ha *2 kg/ha* *3,8 kg/ha*	1,7 L/ac 3,2 L/ac	• Diluer dans suffisamment d'eau (220–330 L/ha) (88–132 L/ac) pour mouiller tout le feuillage. • On peut faire des pulvérisations foliaires avec le 2,4-D sous forme d'amine ou d'ester.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active* •	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) *dicamba* *plus dichlorprop/2,4-D*	5,2 L/ha 7,2 L/ha *2,5 kg/ha* *4,9 kg/ha*	2,1 L/ac 2,9 L/ac	• Diluer dans suffisamment d'eau (200–330 L/ha) (80–132 L/ac) pour mouiller tout le feuillage.
Pulvérisation d'une bouillie à base de mazout sur l'écorce de la base des troncs			
Ce traitement sert à combattre une large gamme d'arbres et de broussailles dont le tronc ne dépasse pas 15 cm de diamètre. Pulvériser le produit de manière à bien couvrir les 30 premiers centimètres de la base du tronc ainsi que les racines qui sont à nu. Contre le caryer, le chêne, le tilleul ou le frêne, les traitements effectués de février à juin sont les plus efficaces. Contre la plupart des autres espèces, le traitement peut être fait en tout temps. Ce traitement de la base des troncs doit occuper une place importante dans un programme de débroussaillement, car il présente l'avantage de ne nécessiter qu'un appareil léger et simple et de pouvoir être fait en hiver lorsque la main-d'œuvre est moins coûteuse et les zones marécageuses plus faciles d'accès.			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	6,4 L/100 L 5,3 L/100 L 4,55 L/100 L *3 kg/100 L*		• Contre aubépine. Diluer les préparations d'**ester peu volatil** dans du mazout.
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	2,8–4,4 L/100 L 2,8–4,4 L/100 L 3,2–5,2 L/100 L 2,3 L/100 L 2,4–3,2 L/100 L *1,9–3 kg/100 L*		• Contre la plupart des espèces ligneuses, y compris les conifères. • Diluer les préparations d'**ester peu volatil** dans du mazout. • Bien humecter l'écorce, mais sans laisser ruisseler.
GARLON 4 (480 g/L) *triclopyr*	20–30 L/100 L *9,6–14,4 kg/100 L*		• Contre la plupart des espèces ligneuses, sauf les conifères. • Appliquer une solution titrant 20–30 % mélangée à de l'huile minérale ou végétale. • **Bas volume d'un seul côté** — Ce traitement à bas volume peut être appliqué sur les troncs de moins de 15 cm de diamètre basal. Bien humecter au moins un côté du tronc et du collet, mais non jusqu'au ruissellement. • **Rationalisation** — Pulvériser suffisamment un côté des troncs de moins de 8 cm de manière à former une bande de 5 cm de large. La zone traitée devrait encercler le tronc en moins de 30 minutes. Traiter les deux côtés des troncs qui ont entre 8 et 12 cm de diamètre basal.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Dévitalisation des souches — contre la plupart des espèces ligneuses à feuilles caduques			
Dans bien des cas, il est préférable de couper et de ramasser les broussailles plutôt que de les traiter chimiquement et de les laisser sur pied. La dévitalisation de la souche présente l'intérêt d'empêcher celle-ci de rejeter vigoureusement comme le font beaucoup d'espèces à feuilles caduques après l'abattage. En outre, elle accélère la décomposition de la souche. Pour une efficacité maximale, la plupart des traitements doivent être faits sur les souches fraîchement coupées. Lorsqu'il s'agit d'une vieille souche, il est alors préférable d'appliquer les produits chimiques après l'avoir fendue en enfonçant un coin ou l'avoir percée de trous. Pulvériser aussi les rejets de la vieille souche. Certains colorants ajoutés aux bouillies à base de mazout permettent de s'assurer facilement que l'on a bien pulvérisé toutes les parties de la souche qui sont à nu.			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	4,25 L/100 L 3,55 L/100 L 3 L/100 L *2 kg/100 L*		• Préparer la bouillie à base de mazout. • Appliquer dans un carburant diesel jusqu'au ruissellement.
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	2,8 L/100 L 2,8 L/100 L 3,25 L/100 L 3,25 L/100 L 3,25 L/100 L *1,9 kg/100 L*		• Préparer la bouillie à base de mazout.
GARLON 4 (480 g/L) *triclopyr*	20–30 L/100 L *9,6–14,4 kg/100 L*		• Pulvériser le triclopyr mêlé au mazout sur les souches coupées. • Mouiller généreusement toutes les surfaces sectionnées et écorcées de la souche. • Le traitement peut se faire en tout temps après l'abattage.
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	10 L/10 L *3,05 kg/10 L*		• Diluer dans la proportion de 1 L pour 1 L d'eau, en ajoutant de l'éthylèneglycol si le traitement se fait par température inférieure au point de congélation. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
LUTTE CONTRE LES CONIFÈRES ET AUTRES ESPÈCES À FEUILLAGE PERSISTANT			
Pulvérisation sur les feuilles et les troncs de bouillies phytocides à base d'eau — peuplements mixtes (conifères et espèces à feuilles caduques)			
Tous les traitements ci-dessous doivent mouiller complètement le feuillage. Appliquer à faible pression, à raison de 500–1500 L de bouillie/ha (200–600 L/ac), selon la densité de la masse foliaire. Il est particulièrement important que la bouillie couvre toutes les parties aériennes des espèces ligneuses à combattre. L'ajout d'un surfactant à la bouillie renforce le pouvoir phytocide.			
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	10 L/1000 L *3,05 kg/1000 L*		• Traiter au début de l'été quand les conifères sont en pleine croissance. • Pulvériser la bouillie sur le feuillage, le tronc et le collet de façon que toute la plante soit mouillée. • Ajouter une solution 0,25 % v/v du surfactant Sylgard 309 pour combattre les conifères. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	22–25 L/ha *6,71–7,62 kg/ha*	7,2–10 L/ac	• Appliquer dans 450 L d'eau/ha (180 L/ac), en traitement foliaire à volume constant, pendant la période de végétation active au début de l'été. • Ajouter une solution 0,25–0,375 % v/v du surfactant Sylgard 309 pour combattre les conifères. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)* *dicamba* *plus 2,4-D**	4 L/1000 L 8 L/1000 L *1,9 kg/1000 L* *3,8 kg/1000 L*		• Pulvériser ces produits sous forme d'**amine,** au début de l'été. • La bouillie doit mouiller toutes les parties aériennes.
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) *dicamba* *plus dichlorprop/2,4-D*	5,2 L/1000 L 7,15 L/1000 L 7,15 L/1000 L *2,5 kg/1000 L* *4,9 kg/1000 L*		• Appliquer au printemps ou au début de l'été. • La bouillie doit mouiller toutes les parties aériennes. • Faire le mélange en cuve selon le mode d'emploi du VANQUISH.

TRAITEMENTS GÉNÉRAUX CONTRE LES ESPÈCES LIGNEUSES

Épandre de la poudre à base de borate ou de chlorate de sodium pour faire mourir arbres ou arbustes isolés ou en touffes restreintes. Épandre le produit en bande au pied du sujet en respectant le mode d'emploi.

Traitement localisé (sur la base des troncs)

Pour combattre des broussailles isolées ou en buissons de conifères ou d'espèces à feuilles caduques, pulvériser du bromacil (HYVARX-L) sur chaque broussaille, à l'aide d'une lance permettant de mesurer la quantité exacte d'herbicide à appliquer. Le bromacil (HYVARX-L) s'utilise de deux façons : non dilué à raison de 10 g par mètre de hauteur de broussaille (ou 5 cm de diamètre); dilué dans la proportion de 1 L pour 5 L d'eau et pulvérisé à raison de 60 g par mètre de hauteur de la broussaille visée. Augmenter la proportion d'herbicide suivant la hauteur et le diamètre des espèces à combattre.

Inhibition du drageonnage consécutif à l'élagage

L'élagage déclenche un drageonnage prolifique chez de nombreuses espèces. L'application d'un mastic à greffer fortifié sur les plaies d'élagage permet de réduire ce phénomène chez bien des espèces. Ces mastics améliorent l'inhibition naturelle provoquée par un élagage maladroit. Supprimer toutes les branches latérales vigoureuses, mais éviter d'élaguer sévèrement. Le drageonnage est réduit au minimum quand les plaies d'élagage sont mastiquées entre les 15 avril et 15 juillet. Recouvrir de mastic toutes les surfaces sectionnées, car chacune peut donner naissance à un bourgeon adventice ou à un bourgeon dormant. Veiller à recouvrir toute la coupure en débordant de 2 cm sur l'écorce environnante, surtout au-dessous. Chez certaines espèces, un mastic trop épais ralentit la cicatrisation.

Injection des arbres

Avec un appareil EZJECT conçu à cet effet, on peut injecter des capsules de glyphosate (EZJECT 0,15 g) dans les arbres et les broussailles ligneuses à combattre. Pour un maximum de résultats, les capsules doivent traverser l'écorce et s'enfoncer dans les tissus vivants. Bien répartir les capsules tout autour de l'arbre et au-dessous de toutes les branches maîtresses, à raison d'une capsule tous les 5 cm de diamètre de tronc mesuré à hauteur de poitrine (ce diamètre doit être de plus de 3 cm et en général de moins de 20 cm). Les arbres ne doivent pas être gelés au moment du traitement. L'arbre meurt après 1–2 ans.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)

LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES VIVACES SUR LES SOLS NON CULTIVÉS

ATTENTION : Sauf avis contraire, les traitements ci-dessous sont déconseillés en zones cultivées. Éviter de les appliquer dans les zones où le produit chimique risque d'être entraîné par ruissellement ou lessivage vers les racines d'arbres ou de plantes à conserver. Prendre toutes les précautions pour éviter que le brouillard herbicide ne dérive vers des végétaux à conserver.

Pour des raisons de coût, les traitements non sélectifs à l'aide d'atrazine, de simazine, de bromacil ou de diuron, suivant les méthodes décrites, ne visent en général que des zones restreintes infestées de mauvaises herbes vivaces. Le produit chimique utilisé agit soit en s'infiltrant jusqu'au système radiculaire des mauvaises herbes, soit en intoxiquant la couche superficielle du sol pendant une période allant de quelques mois à quelques années, selon le produit, la dose épandue et la nature du sol. En général, le sol traité ne peut pas porter de cultures tant que l'effet du produit n'a pas disparu. Il peut toutefois porter du maïs sans risque, même après des traitements à dose élevée de simazine et d'atrazine.

Certaines mauvaises herbes vivaces, comme le liseron des champs, la prêle, la verge d'or, l'asclépiade et la fougère-aigle de l'Est, sont difficiles à éliminer quand on applique seulement la dose inférieure de diuron, de simazine, d'atrazine ou de bromacil. On doit suivre à la lettre le mode d'emploi si l'on a l'intention de mettre en culture le sol traité. L'amitrole est très efficace pour éliminer les taches de chiendent commun dans un champ partiellement envahi.

La partie aérienne de nombreuses plantes vivaces est détruite par le 2,4-D aux doses préconisées pour le désherbage sélectif des cultures résistantes, mais sa destruction totale exige les doses supérieures conseillées. Plusieurs traitements se révèlent souvent nécessaires, chaque fois que les espèces vivaces réapparaissent. En général, les traitements au 2,4-D effectués pendant le stade de croissance rapide des mauvaises herbes, du stade bouton floral au stade floraison, sont les plus efficaces. La pulvérisation doit complètement mouiller toutes les feuilles.

Pendant un désherbage sélectif normal, il est possible d'épandre le 2,4-D à forte dose sur les taches très infestées, simplement en roulant plus lentement à ces endroits. Il faut s'attendre à ce que la culture soit endommagée aux endroits ainsi traités.

Les mauvaises herbes vivaces sont plus difficiles à éliminer que les annuelles, car elles repoussent rapidement grâce à leurs organes souterrains qui survivent malgré une destruction mécanique ou chimique de la partie aérienne. Dans les zones incultes, elles sont problématiques puisqu'il est impossible de travailler mécaniquement le sol. Les vivaces ne sont détruites que si l'on épand des produits chimiques qui tuent aussi bien le système radiculaire que les parties aériennes.

Anti-graminées de postlevée			
AMITROL 240 (231 g/L)	12,5–16,5 L/ha	5–6,6 L/ac	· Pulvériser sur le feuillage du chiendent commun en croissance active, haut de 15 à 20 cm.
amitrole	*3–4 kg/ha*		· Attendre au moins 10 jours avant de labourer ou de déchaumer.
glyphosate (360 g/L)*	2,35–2,5 L/ha	0,94–1 L/ac	· Pour arrêter la croissance du chiendent commun pendant toute la saison, pulvériser le glyphosate à l'automne ou au printemps précédant le semis.
ou glyphosate (450 g/L)*	1,89–2 L/ha	0,76–0,8 L/ac	· Appliquer à l'aide de buses à jet plat, dans 50–100 L d'eau/ha (20–40 L/ac).
ou glyphosate (480 g/L)*	1,77–1,875 L/ha	0,71–0,75 L/ac	· Si l'on utilise un plus grand volume d'eau, il est recommandé d'ajouter à la bouillie un surfactant comme ENHANCE ou L1700.
ou glyphosate (500 g/L)*	1,7–1,8 L/ha	0,68–0,72 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	1,57–1,67 L/ha	0,63–0,67 L/ac	
*glyphosate**	*0,85–0,9 kg/ha*		
KERB (50 WP)	2,2–3,6 kg/ha	0,88–1,44 kg/ac	· Pulvériser à l'automne, de la fin septembre au début novembre, mais avant que le sol ne gèle.
propyzamide	*1,1–1,8 kg/ha*		· Ce traitement ne détruit normalement que les graminées vivaces.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)*	2–4,25 L/ha	0,85–1,7 L/ac	• Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac).
ou 2,4-D (564 g/L)*	1,77–3,55 L/ha	0,71–1,42 L/ac	• Consulter le tableau 18–2, *Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires*, p. 388, pour connaître la sensibilité des diverses mauvaises herbes au 2,4-D et aux herbicides du même groupe.
ou 2,4-D (660 g/L)*	1,5–3 L/ha	0,6–1,2 L/ac	
*2,4-D**	*1–2 kg/ha*		
AMITROL 240 (231 g/L)	18,75–28 L/ha	7,5–11,2 L/ac	• Contre l'asclépiade. • Appliquer dans 500–1000 L d'eau/ha (200–400 L/ac) après la levée de la plupart des plants d'asclépiade, mais avant leur floraison.
amitrole	*4,5–6,75 kg/ha*		
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L)	3,5 L/ha	1,4 L/ac	• Appliquer ce produit sous sa forme d'**ester peu volatil** dans 200–600 L d'eau/ha (80–240 L/ac), au mois de mai ou au début de l'automne.
ou DESORMONE (680 g/L)	3,5 L/ha	1,4 L/ac	
ou ESTAPROP (582 g/L)	4 L/ha	1,6 L/ac	
ou DICHLORPROP D (582 g/L)	4 L/ha	1,6 L/ac	
ou TURBOPROP 600 (582 g/L)	4 L/ha	1,6 L/ac	
dichlorprop/2,4-D	*2,375 kg/ha*		
GARLON 4 (480 g/L)	1–4 L/ha	0,4–1,6 L/ac	• Appliquer dans au moins 200 L/ha d'eau (80 L/ac) pour mouiller uniformément les mauvaises herbes.
triclopyr	*0,48–1,92 kg/ha*		
TELAR (75 DF)	120 g/ha	48 g/ac	• Contre chardon des champs, pissenlit et prêle des champs. Ajouter un surfactant à la bouillie pour en améliorer le pouvoir désherbant.
chlorsulfuron	*90 g/ha*		
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L)	7 L/ha	2,8 L/ac	• Contre le chardon des champs, le mélilot, le trèfle rouge, la carotte sauvage, la petite herbe à poux, la verge d'or, l'oseille, le plantain, la laitue scariole, la bardane, la vergerette et la vesce. • Pulvériser dans 200 L d'eau/ha en traitement foliaire à volume constant. • Traiter lorsque des mauvaises herbes sont en croissance active. • Éviter toute dérive sur les espèces sensibles comme le haricot, les pois, les cultures légumières, les potagers et les plantations brise-vent. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
piclorame/2,4-D	*2,135 kg/ha*		
TRANSLINE (360 g/L)	0,42–0,83 L/ha	0,17–0,33 L/ac	• Contre tussilage, centaurée maculée, herbe à poux, chardon des champs, marguerite blanche, vesce jargeau, matricaire inodore et trèfle. • Traiter lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active. • Contre le tussilage, faire le traitement avant août. • Faire un traitement généralisé en utilisant 200 L d'eau/ha (80 L/ac) ou suffisamment d'eau pour obtenir un bon recouvrement de la végétation visée.
clopyralide	*0,15–0,3 kg/ha*		

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,3 L/ha *1,108 kg/ha*	0,92 L/ac	· Contre liseron des champs, euphorbe ésule et euphorbe cyprès : appliquer le dicamba à la mi-juin ou pendant la floraison, dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac). · Contre chardon des champs et laiteron des champs. · Appliquer à la fin du printemps juste avant la floraison ou appliquer en été ou en automne pour détruire les échappées des autres traitements.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
ARSENAL (240 g/L) *imazapyr*	3 L/ha *0,72 kg/ha*	1,2 L/ac	· Appliquer sur la végétation en pleine croissance en utilisant suffisamment d'eau (100–550 L/ha ou 40–220 L/ac) pour mouiller tout le feuillage.
CASORON 4G (4 Gr) *dichlobénil*	275–550 kg/ha *11–22 kg/ha*	110–220 kg/ac	· Traiter en deux fois, dans 150 kg de produit/ha (60 kg/ac) à l'automne et de 150 kg de produit/ha (60 kg/ac) au début du printemps suivant.
DIUREX 80WDG *diuron*	11–27,5 kg/ha *8,8–22 kg/ha*	4,4–11 kg/ac	· Employer cette dose sur les sables et les loams sableux.
DIUREX 80WDG *diuron*	40–55 kg/ha *32–44 kg/ha*	16–22 kg/ac	· Employer cette dose sur les argiles et les sols riches en matière organique.
glyphosate (360 g/L)* **ou** glyphosate (450 g/L)* **ou** glyphosate (480 g/L)* **ou** glyphosate (500 g/L)* **ou** glyphosate (540 g/L)* *glyphosate**	7–12 L/ha 5,6–9,6 L/ha 5,25–9 L/ha 5–8,64 L/ha 4,67–8 L/ha *2,52–4,32 kg/ha*	2,8–4,8 L/ac 2,24–3,84 L/ac 2,1–3,6 L/ac 2–3,46 L/ac 1,87–3,2 L/ac	· Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac) lorsque le liseron des champs est en pleine floraison et que le chardon et l'asclépiade sont entre le stade bouton floral et la floraison.
HYVAR X-L (240 g/L) *bromacil*	30–45 L/ha *7,2–10,8 kg/ha*	12–18 L/ac	
KARMEX (80 DF) *diuron*	14–55 kg/ha *11,2–44 kg/ha*	5,6–22 kg/ac	· Appliquer dans 1000 L d'eau/ha (400 L/ac).
KROVAR ([1:1] 80 DF) *bromacil/diuron*	13,5–18 kg/ha *10,8–14,4 kg/ha*	5,4–7,2 kg/ac	
MILESTONE (240 g/L) *aminopyralide*	0,25–0,5 L/ha *60–120 g/ha*	0,10–0,20 L/ac	· Appliquer en postlevée. · Maîtrise : armoise absinthe (bisannuelle), verge d'or, centaurée, matricaire inodore, chardon des champs, centaurée du solstice (chardon doré), chardon penché, potentille dressée et *Solanum viarum* (Tropical Soda Apple). · Supprime la partie aérienne de la tanaisie vulgaire et du pissenlit.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
MILESTONE (240 g/L) + 2,4-D amine (564 g/L)*	0,25–0,5 L/ha 1,49–2,55 L/ha	0,10–0,20 L/ac 0,596–1,02 L/ac	• Appliquer en postlevée. • Pour maîtriser un plus large éventail de mauvaises herbes, le 2,4-D amine peut être ajouté à raison de 1 partie de m.a. de MILESTONE/ha et 12 parties de m.a. de 2,4-D amine/ha.
aminopyralide *plus 2,4-D amine**	*60–120 g/ha* *840–1440 g/ha*		
TORDON 101([1:3,7] 305 g/L)	7 L/ha	2,8 L/ac	• Appliquer dans 200 L d'eau/ha (80 L/ac), au printemps ou au début de l'été, dès la reprise de la végétation.
piclorame/2,4-D	*2,134 kg/ha*		• Prévoir un dispositif ou un adjuvant antidérive approuvé. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**

LUTTE CONTRE L'HERBE À PUCE

Plusieurs produits chimiques ont prouvé leur efficacité contre l'herbe à puce. Toutefois, il arrive souvent que celle-ci finisse par repousser et que l'on doive recommencer le traitement pour s'en défaire totalement. La lutte chimique contre l'herbe à puce doit se faire en fonction du lieu. Si cette plante côtoie des arbustes ou des arbres que l'on tient à conserver, il faut éviter d'épandre des stérilisants du sol, et pulvériser tous les autres herbicides avec prudence.

Un pulvérisateur portatif d'une capacité de 9–14 L convient parfaitement pour traiter des colonies d'herbe à puce. Il faut absolument que la bouillie mouille toutes les feuilles pour que l'herbicide fasse pleinement effet. Après la pulvérisation, laisser le traitement agir jusqu'à ce que les plantes meurent. Ramasser et enterrer les plantes mortes en prenant soin d'éviter tout contact avec elles durant les manipulations, car, même morte, l'herbe à puce peut encore être toxique. L'efficacité de tous les traitements est optimale quand l'herbe à puce est en feuilles et en pleine croissance, du 15 juin au 31 juillet.

Postlevée			
AMITROL 240 (231 g/L)	9,25 L/ha	3,7 L/ac	• Appliquer dans au moins 1000 L d'eau/ha (400 L/ac) lorsque la plante est en croissance active. Bien mouiller tout le feuillage.
amitrole	*2,25 kg/ha*		
ARSENAL (240 g/L)	3 L/ha	1,2 L/ac	• Pulvériser sur la végétation en pleine croissance en utilisant suffisamment d'eau (100–550 L/ha [40–220 L/ac]) pour mouiller tout le feuillage.
imazapyr	*0,72 kg/ha*		
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L)	10 L/1000 L 11,7 L/1000 L 11,7 L/1000 L 11 L/1000 L		• La pulvérisation doit mouiller complètement tout le feuillage.
dichlorprop/2,4-D	*6,8 kg/1000 L*		
GARLON 4 (480 g/L)	4–6 L/ha	1,6–2,4 L/ac	• Utiliser au moins 200 L d'eau/ha (80 L/ac) pour que la bouillie couvre uniformément les mauvaises herbes.
triclopyr	*1,92–2,88 kg/ha*		

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
glyphosate (360 g/L)*	7–12 L/ha	2,8–4,8 L/ac	• Appliquer sur les plants en croissance active dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac) afin de bien mouiller le feuillage, mais pas jusqu'au ruissellement.
ou glyphosate (450 g/L)*	5,6–9,6 L/ha	2,24–3,84 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)*	5,25–9 L/ha	2,1–3,6 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)*	5–8,64 L/ha	2–3,46 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	4,67–8 L/ha	1,87–3,2 L/ac	
*glyphosate**	*2,52–4,32 kg/ha*		
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) plus 2,4-D (470 g/L)	1,7 L/ha 2,2 L/ha	0,68 L/ac 0,88 L/ac	• Appliquer dans au moins 560 L d'eau/ha (224 L/ac).
*dicamba plus 2,4-D**	*0,82 kg/ha 1,1 kg/ha*		

RÉDUCTION DE LA DÉRIVE D'HERBICIDE

Les pulvérisations d'herbicides, surtout de phytohormones comme le 2,4-D, le mécoprop, le dichlorprop, le dicamba, etc., risquent d'endommager les cultures sensibles (vigne, tomate, navet, tabac, haricots, carotte, betterave, arbres fruitiers, plantes ornementales et nombreuses autres espèces) qui se trouvent dans le voisinage des zones traitées, si la vapeur ou de fines gouttelettes d'herbicide viennent s'y déposer. Précautions à prendre pour réduire le risque de dérive :

Quand il est nécessaire de pulvériser des herbicides du groupe phénoxy (2,4-D, mécoprop, dichlorprop, etc.) à proximité de plantes sensibles à préserver, toujours utiliser la forme amine.

Une infime dérive de brouillard de dicamba peut causer plus de tort au soya et à d'autres cultures qu'une quantité infime équivalente de brouillard de 2,4-D. En outre, lorsque la température est élevée (plus de 25 °C), la vapeur de dicamba qui s'élève du feuillage traité peut être emportée par l'air; il faut donc éviter d'utiliser un herbicide à base de dicamba à proximité de plantes sensibles que l'on souhaite conserver.

Pulvériser en utilisant la pression la plus basse possible. Pour cela, utiliser une barre d'aspersion, une rampe Radiarc, des buses oscillantes Vibrajet, des buses Directa-spra, des buses à grand débit Flood Jet, ou des pastilles de buse plus traditionnelles. Suivre scrupuleusement les indications du fabricant en ce qui concerne l'espacement des buses et leur hauteur. Il est parfois nécessaire de monter la rampe sur patins afin de la maintenir à une hauteur constante par rapport au sol.

Pour traiter les bords de routes, on peut ajouter à la bouillie divers adjuvants qui contribuent à limiter la dérive en augmentant la densité ou la viscosité de la bouillie. Utiliser ces adjuvants en suivant le mode d'emploi et en prenant les précautions d'usage (vitesse d'avancement, force du vent, distance par rapport aux cultures sensibles, etc.).

MISE EN GARDE : Ces méthodes et ces produits permettent de réduire la dérive, mais n'en éliminent pas complètement le risque. Pour traiter à proximité de cultures sensibles, il faut toujours prendre toutes les précautions habituelles. Il n'est pas inutile de rappeler que des quantités infimes, voire invisibles, de brouillard herbicide peuvent endommager gravement des cultures sensibles. Dans certains cas, il faut même renoncer totalement à pulvériser un herbicide pendant la saison de végétation.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
DÉSHERBAGE DES BORDS DE ROUTES			
Principaux objectifs d'un programme de désherbage en bordure de routes : (1) éliminer les plantes nuisibles qui poussent en hauteur de manière à réduire le coût du fauchage; (2) éliminer les mauvaises herbes qui peuvent infester les terrains voisins en éparpillant leurs graines au vent; (3) maintenir une couverture herbacée attrayante sur le sol et réduire les risques d'érosion; (4) éviter l'accumulation d'herbes folles susceptibles de prendre feu en été ou de gêner le déblaiement de la neige en hiver; (5) point le plus important, assurer la sécurité des usagers de la route.			La plupart des dicotylédones sont sensibles aux traitements à base de 2,4-D et d'herbicides du même groupe effectués au début de l'été (tableau 18–2, *Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires*, p. 388). Cependant, plusieurs espèces échappent à ces traitements. Elles sont dites résistantes et peuvent devenir problématiques si elles ne sont pas éliminées par d'autres herbicides. Il peut être justifié de recourir à des traitements localisés à base d'herbicides totaux (non sélectifs) qui, même s'ils peuvent endommager temporairement les surfaces engazonnées, permettent de venir à bout de taches isolées mais denses de mauvaises herbes et de les empêcher de s'étendre.
Anti-dicotylédones de postlevée			
2,4-D (470 g/L)* **ou** 2,4-D (564 g/L)* **ou** 2,4-D (660 g/L)* *2,4-D**	2,2 L/ha 1,95 L/ha 1,67 L/ha *1,1 kg/ha*	0,9 L/ac 0,78 L/ac 0,67 L/ac	· Appliquer le 2,4-D sous forme d'**amine** ou d'**ester peu volatil** dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac), au début de l'été. Voir le tableau 18–2, *Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires*, p. 388, pour connaître la sensibilité des mauvaises herbes aux bouillies à base de 2,4-D.
DIPHENOPROP BK 700 (679 g/L) **ou** DESORMONE (680 g/L) **ou** ESTAPROP (582 g/L) **ou** DICHLORPROP D (582 g/L) **ou** TURBOPROP 600 (582 g/L) *dichlorprop/2,4-D*	3,5 L/ha 3,5 L/ha 4 L/ha 4 L/ha 4 L/ha *2,375 kg/ha*	1,4 L/ac 1,4 L/ac 1,6 L/ac 1,6 L/ac 1,6 L/ac	· Appliquer ce produit sous forme d'**ester peu volatil,** dans 200–500 L d'eau/ha (80–200 L/ac), au début de l'été, pour combattre la plupart des espèces.
GARLON 4 (480 g/L) *triclopyr*	1–4 L/ha *0,48-1,92 kg/ha*	0,4–1,6 L/ac	· Appliquer sur les mauvaises herbes en pleine croissance, dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac).
MILESTONE (240 g/L) *aminopyralide*	0,25–0,5 L/ha *60-120 g/ha*	0,10–0,20 L/ac	· Appliquer en postlevée. · Maîtrise : armoise absinthe (bisannuelle), verge d'or, centaurée, matricaire inodore, chardon des champs, centaurée du solstice (chardon doré), chardon penché, potentille dressée et *Solanum viarum* (Tropical Soda Apple). · Supprime la partie aérienne de la tanaisie vulgaire et du pissenlit.
MILESTONE (240 g/L) + 2,4-D amine (564 g/L)* *aminopyralide* *plus 2,4-D amine**	0,25–0,5 L/ha 1,49–2,55 L/ha *60–120 g/ha* *840–1440 g/ha*	0,10–0,20 L/ac 0,596–1,02 L/ac	· Appliquer en postlevée. · Pour maîtriser un plus large éventail de mauvaises herbes, le 2,4-D amine peut être ajouté à raison de 1 partie de m.a. de MILESTONE/ha et 12 parties de m.a. de 2,4-D amine/ha.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
TELAR (75 DF) *chlorsulfuron*	75 g/ha *53 g/ha*	30 g/ac	• Ajouter un surfactant à la bouillie pour en améliorer le pouvoir désherbant.
TORDON 101 ([1:3,7] 305 g/L) *piclorame/2,4-D*	7 L/ha *2,14 kg/ha*	2,8 L/ac	• Appliquer dans 200 L d'eau/ha (80 L/ac) au printemps ou au début de l'été quand les nouvelles pousses apparaissent. Utiliser un dispositif ou un adjuvant antidérive approuvé. • **Un permis est exigé pour acheter et utiliser ce produit.**
TRANSLINE (360 g/L) *clopyralide*	0,42–0,83 L/ha *0,15–0,3 kg/ha*	0,17–0,33 L/ac	• Contre chardon des champs, laiteron des champs, centaurée maculée et tussilage. • Traiter quand les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active. • Contre le tussilage, faire le traitement avant août. • Faire un traitement de pleine surface en utilisant 200 L d'eau/ha (80 L/ac) ou suffisamment d'eau pour obtenir un bon recouvrement de la végétation visée. • Pour un traitement localisé, appliquer dans 800 L d'eau et pulvériser sur les mauvaises herbes jusqu'à ruissellement de la bouillie sur les feuilles.
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	1,25 L/ha *0,6 kg/ha*	0,5 L/ac	• Contre euphorbe cyprès et euphorbe ésule. Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac).
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,3 L/ha *1,1 kg/ha*	0,9 L/ac	• Contre la verge d'or, appliquer dans 100–200 L d'eau/ha (40–80 L/ac) lorsque cette mauvaise herbe est en croissance active. • Contre le liseron des champs, traiter à la mi-juin ou au moment de la floraison.
VANQUISH (480 g/L) **ou** ORACLE (480 g/L) *dicamba*	2,83 L/ha *1,36 kg/ha*	1,13 L/ac	• Contre chardon des champs et laiteron des champs. • Pulvériser vers la fin du printemps, juste avant la floraison ou appliquer sur la repousse des mauvaises herbes ayant échappé à d'autres traitements effectués l'été ou l'automne.
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée			
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	12,5–16,5 L/ha *3–4 kg/ha*	5–6,6 L/ac	• Contre chardon des champs et laiteron des champs. • Pulvériser jusqu'au ruissellement lorsque les chardons sont au stade du capitule. • Utiliser en traitement localisé seulement, puisque les graminées sont sensibles à ce produit et que l'effet désherbant peut durer une saison.
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	18,75–28 L/ha *4,5–6,75 kg/ha*	7,5–11,2 L/ac	• Contre l'asclépiade, traiter en début d'été, avant la floraison, et bien mouiller le feuillage. • Contre prêle des champs, linaire vulgaire et chiendent commun. • Pulvériser lorsque la prêle est en pleine croissance. • Appliquer en traitement localisé seulement, puisque les graminées sont sensibles à ce produit et pourraient être détruites pour toute une saison.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
glyphosate (360 g/L)*	7–12 L/ha	2,8–4,8 L/ac	· Contre asclépiade, liseron des champs, chardon des champs, laiteron des champs. · Appliquer dans 200–300 L d'eau/ha (80–120 L/ac) lorsque les mauvaises herbes sont entre le stade bouton floral et le stade capitule. · Utiliser en traitement localisé seulement, puisque les graminées sont sensibles à ce produit et que l'effet désherbant peut durer toute une saison. · Voir aussi la section *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11.
ou glyphosate (450 g/L)*	5,6–9,6 L/ha	2,24–3,84 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)*	5,25–9 L/ha	2,1–3,6 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)*	5–8,64 L/ha	2–3,46 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	4,67–8 L/ha	1,87–3,2 L/ac	
*glyphosate**	*2,52–4,32 kg/ha*		

DÉSHERBAGE TOTAL À LONG TERME

ATTENTION : On ne doit pas utiliser les herbicides recommandés ci-dessous près des jardins ou des arbres qu'on désire conserver, par exemple. Puisque ces herbicides font mourir toute plante avec laquelle ils viennent en contact, il faut les appliquer avec précaution. Si la superficie traitée (par exemple, une allée) est plus élevée qu'une pelouse avoisinante, le produit pourrait être entraîné vers celle-ci par la première pluie. Lorsque des arbres ou des arbustes se nourrissent dans le sol qui se trouve sous la surface traitée, le produit pourrait s'infiltrer jusqu'à leurs racines et les endommager.

Il peut être souhaitable de maintenir certains endroits complètement dépourvus de végétation. Deux problèmes se posent habituellement. Premièrement, il faut commencer par détruire la végétation existante, y compris les tiges et racines souterraines des plantes vivaces. Deuxièmement, l'endroit ainsi dénudé doit être maintenu dans cet état par des agents chimiques dont l'action persiste dans le sol ou par le traitement du feuillage des plantules de mauvaises herbes.

Certains produits chimiques détruisent la végétation existante. D'autres, bien qu'excellents pour maintenir la surface nue, peuvent être utilisés plus économiquement s'ils sont combinés avec un autre produit chimique pour faire mourir la végétation qui s'y trouve déjà. Dans le cas de peuplements de diverses mauvaises herbes, on peut utiliser avec succès des combinaisons de produits chimiques pour faire mourir les différents types de végétation.

L'uniformité de la pulvérisation est indispensable, avec tous les produits chimiques. Il faut s'attendre à devoir effectuer des traitements localisés de reprise, car il est rare qu'un seul traitement aboutisse à une éradication complète. En général, deux traitements aux doses inférieures recommandées (par exemple, de 5,5–11 kg/ha) selon le produit, à 6–12 mois d'intervalle, donnent de meilleurs résultats qu'un seul traitement à dose forte. Cette façon de procéder réduit également les risques de ruissellement vers des endroits non visés.

Zones dénudées — désherbage total			
ARSENAL (240 g/L)	3 L/ha	1,2 L/ac	· Pulvériser sur la végétation en pleine croissance en utilisant suffisamment d'eau (100–550 L/ha [40–220 L/ac]) pour mouiller tout le feuillage.
imazapyr	*0,72 kg/ha*		
DIUREX 80WDG	11–27,5 kg/ha	4,4–11 kg/ac	· Employer cette dose sur les sables et les loams sableux.
diuron	*8,8–22 kg/ha*		
DIUREX 80WDG	40–55 kg/ha	16–22 kg/ac	· Employer cette dose sur les argiles et les sols riches en matière organique.
diuron	*32–44 kg/ha*		
HYVAR X-L (240 g/L)	25,7–45 L/ha	10,3–18 L/ac	· HYVAR X-L combat mal la molène.
bromacil	*6,16–10,8 kg/ha*		
KARMEX (80 DF)	55 kg/ha	5,6–22 kg/ac	· KARMEX combat mal le plantain.
diuron	*11,2–44 kg/ha*		

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
KROVAR ([1:1] 80 DF)	13,5–18 kg/ha	5,4–7,2 kg/ac	
bromacil/diuron	*10,8-14,4 kg/ha*		
PAYLOAD WDG (51,1 %) Plus glyphosate (360 g/L)*	280–420 g/ha 3,3 L/ha	112–168 g/ac 1,3 L/ac	· **NE PAS** appliquer sur des sols dont la teneur en matières organiques est supérieure à 5 % ni sur des sols à texture fine. · **NE PAS** appliquer sur des chemins de ferme ni sur des routes si la circulation risque de déposer des poussières traitées sur des cultures ou d'autres végétaux que l'on désire conserver. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 mètres de pêches qui ne sont plus à l'état de dormance. · **NE PAS** faire plus de deux applications par saison de croissance. · Appliquer à forte dose sur des sols à texture moyenne. · Appliquer à faible dose sur des sols à texture grossière. · Activité rémanente contre : amarantes, petite herbe à poux, chénopode blanc, sétaire verte, morelle faux-sarracha, pissenlit, morelle noire de l'Est.
flumioxazine *plus glyphosate*	*0,143-0,286 kg/ha* *plus 1,2 kg/ha*		
VELPAR (90 SP)	4,5–9 kg/ha	1,8–3,6 kg/ac	
hexazinone	*4,05-8,1 kg/ha*		
DÉSHERBAGE SÉLECTIF À LONG TERME			
PAYLOAD WDG (51,1 %)	280–420 g/ha	112–168 g/ac	· **NE PAS** appliquer sur des sols dont la teneur en matières organiques est supérieure à 5 % ni sur des sols à texture fine. · **NE PAS** appliquer sur des chemins de ferme ni sur des routes si la circulation risque de déposer des poussières traitées sur des cultures ou d'autres végétaux que l'on désire conserver. · **NE PAS** appliquer à moins de 100 mètres de pêches qui ne sont plus à l'état de dormance. · **NE PAS** faire plus de deux applications par saison de croissance. · Appliquer à forte dose sur des sols à texture moyenne. · Appliquer à faible dose sur des sols à texture grossière. · Activité rémanente contre : amarantes, petite herbe à poux, chénopode blanc, sétaire verte, morelle faux-sarracha, pissenlit, morelle noire de l'Est.
flumioxazine	*143-286 g/ha*		

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
DÉSHERBAGE TOTAL À COURT TERME			
Traitement du feuillage — fauchage chimique			
Les herbicides peuvent remplacer la tonte dans les endroits où l'on veut détruire les parties aériennes de plantes qui ne poussent pas en hauteur. Les herbicides mentionnés ci-dessous doivent être pulvérisés lorsque la végétation a environ 15 cm de hauteur. Arroser jusqu'à ce que l'eau ruisselle. Les herbes hautes sont plus difficiles à détruire et, une fois sèches sont inesthétiques et peuvent s'enflammer facilement.			
AMITROL 240 (231 g/L)	16,5 L/ha	6,6 L/ac	· Pour que le traitement soit efficace, pulvériser lorsque le feuillage est en croissance active. · Utiliser suffisamment d'eau (200–400 L/ha [80–160 L/ac]) pour bien mouiller le feuillage. · Avec l'AMITROL 240, les jeunes feuilles blanchissent avant que la plante ne meure; cependant, ce blanchiment peut tarder à apparaître par temps froid. · Des repousses peuvent apparaître à partir de plants qui germent (de la semence) ou des parties souterraines des plantes vivaces. (Voir aussi la section *Désherbage sélectif par humectation*, p. 11).
ou glyphosate (360 g/L)*	5–7 L/ha	2–2,8 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)*	3,75–5,25 L/ha	1,5–2,1 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)*	3,6–5 L/ha	1,44–2 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	3,3–4,67 L/ha	1,32–1,87 L/ac	
amitrole	*4 kg/ha*		
***ou** glyphosate**	*1,8-2,52 kg/ha*		
REGLONE 240 (240 g/L)	2,3–4,6 L/ha	0,92–1,84 L/ac	· Utiliser les doses supérieures dans un grand volume d'eau (1000 L/ha [400 L/ac]) sur les peuplements denses de mauvaises herbes. · Utiliser 1 L d'AGRAL 90/1000 L comme agent mouillant pour de meilleurs résultats.
diquat	*0,55-1,1 kg/ha*		
DÉSHERBAGE DES FOSSÉS À SEC			
Lorsque les fossés situés le long des routes ou ailleurs contiennent de l'eau stagnante ou courante, on ne doit pas procéder au traitement des mauvaises herbes émergées sans auparavant consulter le ministère de l'Environnement de l'Ontario pour savoir si un permis est nécessaire (voir le chapitre 19, *Mauvaises herbes aquatiques*, p. 393). Toutefois, ce genre de permis n'est habituellement pas nécessaire pour le traitement herbicide des mauvaises herbes poussant près des fossés ou dans les fossés qui sont à sec.			**Voici les précautions à prendre :** · Traiter lorsque le fossé ou le cours d'eau ne contient pas d'eau courante. · Éviter de répandre le produit directement sur la surface de l'eau (violation de la *Loi sur les pesticides* et de la *Loi sur les ressources en eau de l'Ontario*). · Planifier le programme de pulvérisations de façon à éviter de traiter en une seule fois de grandes surfaces des berges de fossés ou de cours d'eau. · Traiter en se déplaçant vers l'amont et non vers l'aval le long des berges. · Vérifier à quel usage sert l'eau en aval pour éviter d'enfreindre les droits des autres propriétaires et pour éviter les conflits possibles avec ces derniers.
Plantes émergées			
2,4-D (470 g/L)*	4,5 L/ac	1,8 L/ac	· Contre les scirpes (foin de grève). · Appliquer sous forme d'**ester peu volatil** dans 750–1000 L d'eau/ha (300–400 L/ac).
ou 2,4-D (564 g/L)*	4 L/ac	1,6 L/ac	
ou 2,4-D (660 g/L)*	3,4 L/ac	1,36 L/ac	
*2,4-D**	*2,25 kg/ha*		
AMITROL 240 (231 g/L)	37,5–45,75 L/ha	15–18,3 L/ac	· Contre les quenouilles. · Appliquer dans au moins 1000 L d'eau/ha (400 L/ac), à partir du moment où les quenouilles se forment jusqu'aux gelées.
amitrole	*9-11 kg/ha*		

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4-1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
glyphosate (360 g/L)*	7–12 L/ha	2,8–4,8 L/ac	• Contre les quenouilles. • Appliquer entre la mi-floraison et la fin de la floraison (entre mi-juillet et fin août), lorsque les quenouilles sont en croissance active. • Pour un traitement localisé, utiliser une solution à 1 %, soit 1 L de produit dans 100 L d'eau et bien mouiller le feuillage, mais éviter le ruissellement.
ou glyphosate (450 g/L)*	5,6–9,6 L/ha	2,24–3,84 L/ac	
ou glyphosate (480 g/L)*	5,25–9 L/ha	2,1–3,6 L/ac	
ou glyphosate (500 g/L)*	5–8,64 L/ha	2–3,46 L/ac	
ou glyphosate (540 g/L)*	4,67–8 L/ha	1,87–3,2 L/ac	
*glyphosate**	*2,52–4,32 kg/ha*		

TABLEAU 18–1. Classement des espèces ligneuses selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires de mélanges et de produits herbicides

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	2,4-D dichlorprop (1:1)	2,4-D dicamba (2:1)	fosamine d'ammonium	2,4-D picloram (3,7:1)	triclopyr
Aubépine	hawthorn	I–R	S	S–I	S	S	S
Aulne	alder	S–I	S	S	S	S	S
Bleuetier	blueberry	S	S	I–R	I	S	S–I
Bouleau	birch	S	S	S		S	S
Canneberge	cranberry	S					
caryers ovale et noir	hickory, black, shagbark	R	S–I	S	I		S
cerisier de Virginie	cherry, choke	S–I	S	S	S	S	S
cerisiers tardif et à fruits rouges	cherry, black, red	S–I	S	S	S–I	S	S–I
chêne à gros fruits	oak, bur	R–I		S	I–R	S	
chêne blanc	oak, white	I	S–I	S–I		S–I	I
chêne rouge	oak, red	I	I–R	S	I–R	S–I	S
chèvrefeuille	honeysuckle	S–I	S	S		S	
clavalier d'Amérique	prickly-ash	R		S	S		S
Comptonie	sweet-fern	I		S	S–I	S	
cornouiller	dogwood	S–I	S		S	S	S
épinette	spruce	R	I–R	S		S–I	R
épine-vinette	barberry, common	I	S		S	S–I	
érable à sucre	maple, sugar	R	S–I	I–R		S	S

S– Sensible : Un seul traitement donne un bon résultat.
I – Intermédiaire : Un deuxième traitement se révèle souvent nécessaire.
R– Résistante : Peut survivre à deux traitements ou plus.

* Il existe différentes préparations; voir le tableau 4–1, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25. Voir l'étiquette pour les utilisations et les doses particulières.

TABLEAU 18–1. Classement des espèces ligneuses selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires de mélanges et de produits herbicides (suite)

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	2,4-D dichlorprop (1:1)	2,4-D dicamba (2:1)	fosamine d'ammonium	2,4-D picloram (3,7:1)	triclopyr
érable argenté	maple, silver	S–I				S	S
érable négondo	maple, Manitoba	S–I	S	S	S–I	S	S
érable rouge	maple, red	R	I–R	I–R	S–I	S	S–I
févier d'Amérique	locust, honey	S–I				S	S–I
framboisier sauvage	raspberry, wild	R	S	I	S		S
frêne	ash	R	S–I	I–R	S–I	I–R	S
genévrier	juniper	R	I–R	S		S–I	
groseillier sauvage	currants, wild	R		S			
herbe à puce	poison-ivy	I	S–I	S	I	S	S
hêtre	beech	R		I	S–I	S	S–I
kalmia à feuilles étroites	sheep-laurel	I		S		S–I	S
lilas	lilac	I–R				S	
nerprun	buckthorn	I–R		I–R		S	S
noyer	walnut	S–I				S	
orme	elm	I	S–I	S	S–I	S	S–I
ostryer de Virginie	ironwood	R	S–I	S		S	S
peuplier faux-tremble	poplar, aspen	S	S	S		S	S
pin	pine	R	S–I	S	I–R	S	I
pruche	hemlock	R				S	
prunier sauvage	plum, wild	I	S		S		
rhododendron sauvage	redbud rhododendron	R				R	S
robinier faux-acacia	locust, black	I				S	S
ronce	blackberry	R		I–R	S	S–I	S
rosier sauvage	rose, wild	R	I	S	S	S	S
sapin baumier	fir, balsam	R	S–I	S		S	I–R
sassafras	sassafras	S–i					S
saule	willow	S	S	S	S	S	S

S– Sensible : Un seul traitement donne un bon résultat.
I – Intermédiaire : Un deuxième traitement se révèle souvent nécessaire.
R– Résistante : Peut survivre à deux traitements ou plus.

TABLEAU 18–1. Classement des espèces ligneuses selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires de mélanges et de produits herbicides (suite)

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	2,4-D dichlorprop (1:1)	2,4-D dicamba (2:1)	fosamine d'ammonium	2,4-D picloram (3,7:1)	triclopyr
spirée	hardhack, spirea	I				S	
sumac à vernis	sumac, poison	S					S
sureau	elderberry	S		S–I		S	S
thuya	cedar	R	I–R	S		S	
thuya occidental	arborvitae	R	R	S		S	
tilleul	basswood	R	S	S	S	S	S
vigne sauvage	grape, wild	S	S	S		S	S
vigne vierge	creeper, Virginia	S	S–I	S	S–I	S	
viorne	viburnum	R					S

S – Sensible : Un seul traitement donne un bon résultat.
I – Intermédiaire : Un deuxième traitement se révèle souvent nécessaire.
R – Résistante : Peut survivre à deux traitements ou plus.

TABLEAU 18–2. Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	MCPA	2,4-DB ou MCPB	mécoprop	dicamba
abutilon (annuelle)	velvetleaf (annual)	S–I	I	S–I*(I–R)		I
achillée mille-feuille (vivace)	yarrow (perennial)	R	I–R		I–R	I–R
agripaume cardiaque (vivace)	motherwort (perennial)	S–I				
amarantes (annuelles)	pigweeds (annual)	S	I	S–I	S	S
ansérine (annuelle)	goosefoot (annual)	S	S	S	S	
asclépiade (vivace)	milkweed (perennial)	R	R	R	I–R	I–R
aster (vivace)	aster (perennial)	I				
barbarée vulgaire (bisannuelle)	rocket, yellow (biennial)	S	I	I*(R)		
bardane (bisannuelle)	burdock (biennial)	S	S	I		S
bourse-à-pasteur (annuelle d'hiver)	shepherd's purse (winter annual)	S–I	S	S–I	S–I	
brunelle commune (vivace)	heal-all (perennial)	I–R	I–R	I–R	S	S
caméline (annuelle d'hiver)	false flax (winter annual)	S	S	S	S	S

* Le 2,4-DB est plus efficace (sensibilité au MCPB donnée entre parenthèses).
** Le MCPB est plus efficace (sensibilité au 2,4-DB entre parenthèses).
S – Sensible : Détruite par une application de 2,4-D, MCPA ou mécoprop (1,2 kg ou moins par hectare) ou par une application de dicamba (425 g ou moins par hectare).
I – Intermédiaire : Détruite moins vite, mais succombe à des doses plus élevées ou à des traitements répétés.
R – Résistante : Pas détruite ou légèrement endommagée par le traitement chimique. Pour lutter contre cette mauvaise herbe, l'herbicide ou les herbicides énumérés ci-dessus ne sont pas d'un grand secours.

TABLEAU 18–2. Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires (suite)

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	MCPA	2,4-DB ou MCPB	mécoprop	dicamba
camomille des chiens (annuelle)	mayweed (annual)	I–R		I		S
campanule (vivace)	bellflower (perennial)	R				
cardère des bois (bisannuelle)	teasel (biennial)	S				
carotte à Moreau (vivace)	water-hemlock (perennial)	S–I				
carotte sauvage (bisannuelle)	carrot, wild (biennial)	S–R	S–R	R	I–R	S
centaurées (vivaces)	knapweeds (perennial)	R		I*(I–R)		I
céraiste vulgaire (vivace)	chickweed, mouse-eared (perennial)	I–R	I–R	R	S	S
chardon des champs (vivace)	thistle, Canada (perennial)	I	I	I	I	
chardon penché (bisannuelle)	thistle, nodding (biennial)	I		I		S–I
chardon vulgaire (bisannuelle)	thistle, bull (biennial)	S	S	S	S	S–I
chénopode blanc (annuelle)	lamb's-quarters (annual)	S	S	S	S	S
chicorée sauvage (vivace)	chicory (perennial)	S	S–I	S–I*(R)	I–R	S
égopode podagraire (vivace)	goutweed (perennial)	R	R	R	R	
épervière (vivace)	hawkweed (perennial)	I–R	I–R			S–I
euphorbe cyprès (vivace)	spurge, cypress (perennial)	I–R	I–R	I–R		I
euphorbe ésule (vivace)	spurge, leafy (perennial)	I–R	I–R	I–R	R	S
fougère-aigle de l'Est (vivace)	bracken fern (perennial)	R	R	R	R	I
gaillet (vivace)	bedstraw (perennial)	R	I–R	R	I	R
graminées (annuelles et vivaces)	grasses (annual and perennial)	R	R	R	R	
herbe à chat (vivace)	catnip (perennial)	S–I				
herbe à poux (annuelle)	ragweed (annual)	S	S	S	S	S
laiteron des champs (vivace)	sow-thistle, perennial (perennial)	I	R	S–I*(I–R)		S–I
laiteron potager (annuelle)	sow-thistle, annual (annual)	S	I	S–I	I	S–I
laitue scariole (annuelle)	lettuce, prickly (annual)	S–I	S	I–R	S	
lampourde glouteron (annuelle)	cocklebur (annual)	S	S	S	S	S
lépidie densiflore (annuelle d'hiver)	pepper-grass, common (winter annual)	S	S–I	I		
lépidie des champs (annuelle d'hiver)	pepper-grass, field (winter annual)	S	S	I		

* Le 2,4-DB est plus efficace (sensibilité au MCPB donnée entre parenthèses).

** Le MCPB est plus efficace (sensibilité au 2,4-DB entre parenthèses).

S – Sensible : Détruite par une application de 2,4-D, MCPA ou mécoprop (1,2 kg ou moins par hectare) ou par une application de dicamba (425 g ou moins par hectare).

I – Intermédiaire : Détruite moins vite, mais succombe à des doses plus élevées ou à des traitements répétés.

R – Résistante : Pas détruite ou légèrement endommagée par le traitement chimique. Pour lutter contre cette mauvaise herbe, l'herbicide ou les herbicides énumérés ci-dessus ne sont pas d'un grand secours.

TABLEAU 18–2. Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires (suite)

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	MCPA	2,4-DB ou MCPB	mécoprop	dicamba
lierre terrestre (vivace)	ground-ivy (Creeping Charlie) (perennial)	I–R	I–R		I	S
linaire (vivace)	toadflax (perennial)	R	R	R	R	S–I
liseron des champs (vivace)	bindweed, field (perennial)	I	I	I	I	S–I
lupuline (annuelle d'hiver)	medick, black (winter annual)	I	I		S	I
lychnide blanche (vivace)	cockle, white (perennial)	R		I–R		I
marguerite blanche (vivace)	daisy, ox-eye (perennial)	I	I	R	I	I
matricaire odorante (annuelle)	pineappleweed (annual)	S		R	R	
mauve à feuilles rondes (vivace)	mallow, round-leaved (perennial)	I–R	I–R	R	I–R	
millepertuis commun (vivace)	St. John's wort (perennial)	R	R	R	R	S
molène (bisannuelle)	mullein (biennial)	I–R				
morelle (vivace)	nightshade (perennial)	I–R			R	
morelle de Caroline (vivace)	horse-nettle (perennial)	R				I
moutardes, sisymbres et vélars (annuelles)	mustards (annual)	S	S	I	S	
nielle (annuelle)	cockle, purple (annual)	I–R	R	R		I
onagre (bisannuelle)	evening-primrose (biennial)	S				
orpin âcre (vivace)	stonecrop, mossy (perennial)	I	I		S–I	
ortie royale (annuelle)	hemp-nettle (annual)	R	S–I	I–R**(R)	R	
oseille (vivace)	dock (perennial)	I	I	I	I	
oxalide (vivace)	wood-sorrel (perennial)	I–R				
panais sauvage (bisannuelle)	parsnip, wild (biennial)	S				
petite oseille (vivace)	sorel, sheep (perennial)	I	R			
pissenlit (vivace)	dandelion (perennial)	S	S	I*(R)	I	S
plantain lancéolé (voir plantains) (vivace)	ribgrass (see plantains) (perennial)					
plantains (vivaces)	plantains (perennial)	S	S	S–I	S–I	I
potentille de Norvège (annuelle d'hiver)	cinquefoil, rough (winter annual)	I				
potentille dressée (vivace)	cinquefoil, sulphur (upright c.), (perennial)	I				
pourpier potager (annuelle)	purslane (annual)	I	I	S–I	S–I	

* Le 2,4-DB est plus efficace (sensibilité au MCPB donnée entre parenthèses).

** Le MCPB est plus efficace (sensibilité au 2,4-DB entre parenthèses).

S – Sensible : Détruite par une application de 2,4-D, MCPA ou mécoprop (1,2 kg ou moins par hectare) ou par une application de dicamba (425 g ou moins par hectare).

I – Intermédiaire : Détruite moins vite, mais succombe à des doses plus élevées ou à des traitements répétés.

R – Résistante : Pas détruite ou légèrement endommagée par le traitement chimique. Pour lutter contre cette mauvaise herbe, l'herbicide ou les herbicides énumérés ci-dessus ne sont pas d'un grand secours.

TABLEAU 18–2. Classement des mauvaises herbes selon leur sensibilité aux pulvérisations foliaires (suite)

Nom commun français	Nom commun anglais	2,4-D	MCPA	2,4-DB ou MCPB	mécoprop	dicamba
prêles (vivaces)	horse-tail (perennial)	I–R	S–I	I–R	I–R	I
renoncule (vivace)	buttercup (perennial)	I–R	S–I	I**(I–R)	I	I
renouée (annuelle)	knotweed (annual)	I–R		I–R*(R)	S–I	S
renouée liseron (annuelle)	buckwheat, wild (annual)	I–R	I	I–R	I–R	S
renouée persicaire (annuelle)	lady's thumb (annual)	S–I	I–R	S	I–R	S
renouée scabre (annuelle)	smartweed, green (annual)	S–I	I–R	I–R	I–R	S
salsifis majeur (bisannuelle)	goat's-beard (biennial)	I				
séneçon jacobée (bisannuelle et vivace)	ragwort (biennial and perennial)	I–R	R	R	I	S–I
séneçon vulgaire (annuelle)	groundsel (annual)	I	I			
silène enflé (vivace)	campion, bladder (perennial)	R	R	R	R	
silène noctiflore (annuelle)	catchfly, night-flowering (annual)	R	R	R	R	
soude roulante (annuelle)	thistle, Russian (annual)	S–I		I–R	R	
spargoute des champs (annuelle)	spurry, corn (annual)	R	I	R	I	R
stellaire moyenne (annuelle)	chickweed, common (annual)	I–R	I	R	S	S
tabouret des champs (annuelle d'hiver)	stinkweed (pennycress) (winter annual)	S	S	S–I	S–I	
verge d'or (vivace)	golden rod (perennial)	I	R	I	I	
vergerette annuelle (annuelle d'hiver)	fleabane, annual (daisy f.) (winter annual)	I	I	S–I		
vergerette du Canada (annuelle)	fleabane, Canada (annual)	S–I				
véroniques (annuelles et vivaces)	speedwells (annual and perennial)	I–R	I–R		S–I	I
vesces (vivaces)	vetch (perennial)	I–R	I–R	R	I–R	I
vesces sauvages (annuelles)	vetches, wild (annual)	S	S			
violette des champs (annuelle)	violet, field (field pansy) (annual)	R			R	
vipérine commune (bisannuelle)	blueweed (biennial)	S–I	I		I	I

* Le 2,4-DB est plus efficace (sensibilité au MCPB donnée entre parenthèses).

** Le MCPB est plus efficace (sensibilité au 2,4-DB entre parenthèses).

S – Sensible : Détruite par une application de 2,4-D, MCPA ou mécoprop (1,2 kg ou moins par hectare) ou par une application de dicamba (425 g ou moins par hectare).

I – Intermédiaire : Détruite moins vite, mais succombe à des doses plus élevées ou à des traitements répétés.

R – Résistante : Pas détruite ou légèrement endommagée par le traitement chimique. Pour lutter contre cette mauvaise herbe, l'herbicide ou les herbicides énumérés ci-dessus ne sont pas d'un grand secours.

Milieu aquatique

19. MAUVAISES HERBES AQUATIQUES

Mauvaises herbes aquatiques

Selon la *Loi sur les pesticides* et le Règlement de l'Ontario 63/09, il est obligatoire d'être titulaire d'une licence de destructeur de parasites aquatiques pour utiliser un herbicide destiné à maîtriser les parasites aquatiques et d'un permis du ministère de l'Environnement pour procéder à la destruction. Le Règlement de l'Ontario 63/09 prévoit toutefois des exemptions relatives à la licence et au permis pour certaines installations.

L'article 83 du Règlement de l'Ontario 63/09 indique les exemptions relatives à la licence de destructeur de parasites aquatiques et au permis pour procéder à la destruction.

Lieux précisés

83. (1) Le présent article s'applique aux destructions de parasites aquatiques qui sont effectuées :
   (a) soit dans un lieu dont la personne qui procède à la destruction est propriétaire ou qu'elle occupe;
   (b) soit dans un lieu dont l'employeur à temps plein de la personne qui procède à la destruction est propriétaire ou qu'il occupe. Règl. de l'Ont. 63/09, paragr. 83(1).

(2) Une personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1) est exemptée de l'application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l'égard de cette destruction si elle y procède dans ou sur une partie des eaux de surface qui sont situées dans les limites du lieu mentionné au paragraphe (1), ou au-dessus de ces eaux. Règl. de l'Ont. 63/09, paragr. 83(2).

(3) Une personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1) est exemptée de l'application du paragraphe 7(2) de la Loi à l'égard de cette destruction si d'une part,
   (a) elle procède à la destruction dans ou sur des eaux de surface qui sont situées entièrement dans les limites du lieu mentionné au paragraphe (1), ou au-dessus de ces eaux;
   (b) d'autre part, il ne se produit aucun rejet direct ou indirect des eaux, sauf par percolation, dans un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir ou un autre plan d'eau ou cours d'eau qui se situe entièrement ou partiellement à l'extérieur des limites du lieu. Règl. de l'Ont. 63/09, paragr. 83(3).

En résumé

- Une personne est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'une licence de destructeur de parasites aquatiques si elle procède à la destruction de parasites soit dans un lieu dont elle propriétaire ou qu'elle occupe soit dans un lieu dont son employeur à temps plein est propriétaire ou qu'il occupe et si elle y procède dans ou sur une partie des eaux de surface qui sont situées dans les limites du lieu, ou au-dessus de ces eaux.

- Une personne est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis si elle procède à la destruction de parasites aquatiques soit dans un lieu dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe soit dans un lieu dont son employeur à temps plein est propriétaire ou qu'il occupe et si elle y procède dans ou sur des eaux de surface qui sont situées entièrement dans les limites du lieu, ou au-dessus de ces eaux, sans qu'il ne se produise aucun rejet direct ou indirect des eaux, sauf par percolation, dans un plan d'eau ou cours d'eau. Ainsi, une personne peut appliquer elle-même ou faire appliquer par un employé qui travaille à temps plein pour elle des herbicides dans un étang sans écoulement lorsque celui-ci se situe entièrement dans les limites d'un lieu dont elle est propriétaire.

Vente d'herbicides aquatiques

En Ontario, les herbicides aquatiques sont classés comme des produits pesticides non destinés à un usage domestique (catégorie 3 ou 4). Les vendeurs de pesticides ne peuvent vendre de tels herbicides qu'à des personnes titulaires d'une licence et/ou d'un permis approprié.

Une personne qui est titulaire d'une licence de destructeur de parasites aquatiques peut acheter un herbicide de catégorie 3 ou 4 destiné à maîtriser les parasites aquatiques. Cependant, comme il est mentionné précédemment, le destructeur doit être titulaire d'un permis sauf s'il procède à la destruction soit dans un lieu dont il est propriétaire ou qu'il occupe soit dans un lieu dont son employeur à temps plein est propriétaire ou qu'il occupe et s'il y procède dans ou sur des eaux de surface qui sont situées entièrement dans les limites du lieu, ou au-dessus de ces eaux, sans qu'il ne se produise aucun rejet direct ou indirect des eaux, sauf par percolation, dans un plan d'eau ou cours d'eau.

En outre, comme il est décrit dans le résumé qui précède, il existe des situations où une personne peut être

exemptée des deux obligations, soit celle d'être titulaire d'une licence et celle d'être titulaire d'un permis (la personne applique des herbicides soit dans un lieu dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe soit dans un lieu dont son employeur à temps plein est propriétaire ou qu'il occupe et y procède à la destruction dans ou sur des eaux de surface qui sont situées entièrement dans les limites du lieu, ou au-dessus de ces eaux, sans qu'il ne se produise aucun rejet direct ou indirect des eaux, sauf par percolation, dans un plan d'eau ou cours d'eau). Cependant, un vendeur ne peut lui vendre un produit non destiné à un usage domestique (catégorie 3 ou 4) que si elle peut produire une lettre d'un directeur du ministère de l'Environnement attestant qu'elle est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'une licence et d'un permis au moment de l'achat d'un produit de catégorie 3 ou 4 destiné à maîtriser les parasites aquatiques.

Remarques :

- Un agriculteur ayant la qualification requise peut acheter un pesticide de catégorie 3 ou 4 pour la destruction de parasites terrestres sur des terres agricoles qui lui appartiennent. Un herbicide aquatique est employé pour la destruction de parasites aquatiques et non de parasites terrestres. En conséquence, à moins que les exemptions relatives aux licences et permis dont il est question précédemment ne s'appliquent, un agriculteur doit obtenir les licences et/ou permis nécessaires pour utiliser un herbicide aquatique de catégorie 3 ou 4.
- Une personne ne doit pas être titulaire d'un permis du ministère de l'Environnement si elle utilise un pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7 afin de lutter contre les plantes émergeant de la surface de l'eau dans un fossé de drainage ou flottant à la surface de cette eau si, au moment de la destruction, le fossé de drainage ne contient pas d'eau mouvante. Dans le Règlement 63/09, un « fossé de drainage » s'entend d'un cours d'eau artificiel qui est ajouté au système de drainage naturel des terres principalement pour capter et transporter de l'eau et qui, pendant une période quelconque de chaque année, ne contient pas d'eau mouvante.

Méthodes de lutte non chimiques

La réduction ou l'élimination du flux d'éléments nutritifs dans les plans d'eau est une mesure préventive efficace pour maîtriser la prolifération des mauvaises herbes aquatiques. Les herbicides ne sont efficaces qu'à court terme pour éliminer la végétation aquatique nuisible. D'autres mesures, notamment l'arrachage des plantes presque submergées, le dragage ou la modification du substrat des fossés de drainage peuvent avoir une efficacité à long terme. Comme les mesures de lutte mécanique peuvent avoir des répercussions sur l'habitat des poissons, il faut les faire approuver par le ministère des Richesses naturelles. Les techniques de gestion visant la maîtrise de la végétation dans les étangs comprennent la réduction au minimum des apports d'éléments nutritifs, le dragage des excès de sédiments, des billes et d'autres débris organiques, la diminution du rapport entre la surface et la profondeur, et l'augmentation de la vitesse de renouvellement de l'étang (vidange). Il faut par ailleurs accepter et tolérer une certaine quantité de plantes aquatiques et d'algues, car elles sont un élément vital d'un écosystème équilibré.

La végétation aquatique présente une grande diversité : plantes totalement immergées, telles que l'élodée du Canada et les algues; plantes flottant librement, comme les nénuphars; et plantes émergées comme les quenouilles et les scirpes. De nombreuses plantes émergées poussent aussi bien sur une berge humide que lorsque leurs racines et le bas de leurs tiges sont dans l'eau. Quand ces espèces se sont installées sur les berges, il faut traiter la zone infestée ainsi que l'eau avoisinante.

Les espèces des genres *Chara* et *Nitella* sont des plantes ressemblant à des algues, de couleur verte ou gris vert, qui se fixent à la vase ou flottent librement. En grande quantité, elles répandent une forte odeur de musc. Elles s'effritent lorsqu'on les touche et, une fois sorties de l'eau, se transforment en une poudre blanche.

La vallisnérie d'Amérique (céleri sauvage) qu'on trouve d'habitude dans les lacs de villégiature résiste à tous les herbicides recommandés actuellement. Elle est dotée de longues feuilles caoutchouteuses et de racines courtes. On ne peut s'en défaire que mécaniquement, par arrachage. Des applications répétées d'herbicides sur plusieurs années peuvent être nécessaires à la maîtrise des quenouilles et des scirpes.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Algues et plantes vasculaires submergées			
(p. ex. espèces du genre *Chara*, élodée du Canada, cornifle nageante, myriophylle, utriculaire sp., potamot)			
POLYDEX (5 %) ou POLYPRO (5 %) *sulfate de cuivre*	1 L/60 000 L *16 mL/1 000 L*		· Maîtrise les algues dans les étangs, lagunes, mares-réservoirs et réservoirs d'eau potable. · **NE PAS** appliquer dans des lacs, des eaux courantes ou des étangs avec écoulement ni permettre l'évacuation vers ces plans d'eau. · **Ce produit est toxique pour les poissons, les invertébrés aquatiques et les plantes.** · La dose efficace dépend de la condition de l'eau et de l'importance des micro-organismes présents.
SOLUTION ALGICIDE THINK PURITY (5 %) *sulfate cuivrique pentahydraté*	1 L/60 000– 600 000 L *16 mL/1 000 L*		· Maîtrise les algues dans les étangs, lagunes et les mares-réservoirs. · **NE PAS** appliquer dans des lacs, des eaux courantes ou des étangs avec écoulement ni permettre l'évacuation vers ces plans d'eau. · **Ce produit est toxique pour les poissons, les invertébrés aquatiques et les plantes.** · Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, ne pas traiter plus de la moitié d'un étang ou d'une marre-réservoir à la fois.
CUPROSE (18,9 %) *cuivre*	6,5–9,0 kg/ha dans un plan d'eau d'une profondeur de 1 m		· Maîtrise les algues dans les étangs de ferme. · **NE PAS** appliquer dans des lacs, des eaux courantes ou des étangs avec écoulement ni permettre l'évacuation vers ces plans d'eau. · **NE PAS** appliquer dans des zones souvent fréquentées par la faune. · **Ce produit est toxique pour les poissons et d'autres animaux aquatiques.**
REWARD (240 g/L) *diquat (aquatique)*	18,3–29,2 L/ha *4,4–7 kg/ha*	7,4–11,8 L/ac	· Maîtrise la cornifle nageante, l'élodée du Canada et le potamot dans les eaux stagnantes ou en léger mouvement des mares-réservoirs agricoles, des étangs de ferme, des fossés de ferme, des lacs et des chenaux. · Traiter les peuplements denses de lenticules comme des mauvaises herbes submergées en pulvérisant le produit à la surface du feuillage. · Les espèces des genres *Chara* et *Nitella* résistent à ce traitement. · **NE PAS** utiliser l'eau traitée à des fins de consommation animale et ne pas s'y baigner pendant au moins 24 heures. · **NE PAS** utiliser l'eau traitée à des fins de consommation humaine ni irriguer avec cette eau pendant au moins 5 jours. · Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, traiter de 1/4 à 1/3 du plan d'eau à la fois. · La dose varie selon la profondeur de l'eau : – moins de 1,5 m — utiliser 18,3 L/ha (7,4 L/ac); – plus de 1,5 m — utiliser 25–29,2 L/ha (10,1–11,8 L/ac). · Appliquer lorsque les plantes sont jeunes et en croissance active. · Les traitements dirigés contre des peuplements denses de mauvaises herbes à maturité ne donnent pas de résultats satisfaisants.
REWARD (240 g/L) *diquat (aquatique)*	9,2 L/ha *2,2 kg/ha*	3,7 L/lac	· Maîtrise la myriophylle en épi dans les lacs. · Traiter lorsque les plantes sont au tout début de leur croissance (juin). · Voir les remarques sur REWARD ci-dessus.

NOM COMMERCIAL (concentration) *matière active*	PRODUIT/HA *matière active/ha*	PRODUIT/AC	PRÉCAUTIONS (Voir aussi le chapitre 4, *Herbicides utilisés en Ontario*, p. 25, et le chapitre 5, *Notes sur les adjuvants*, p. 75)
Plantes émergées			
(p. ex. lenticules, quenouille)			
AMITROL 240 (231 g/L) *amitrole*	37,5– 45,75 L/ha *9–11 kg/ha*	15–18,3 L/ac	· Quenouilles dans des endroits non cultivés (bords de routes, clôtures, bords de fossé, fossés de drainage). · Appliquer après que les chatons se sont formés jusqu'au moment de la première gelée. · **NE PAS** déranger les plants traités. · **NE PAS** appliquer là où les eaux seront utilisées pour l'irrigation, la consommation ou tout autre usage domestique. · **NE PAS** appliquer sur une étendue d'eau n'étant pas entièrement située sur la propriété de l'utilisateur. · Traiter à raison de 1 000 L d'eau/ha (400 L/ac).
REWARD (240 g/L) *diquat (aquatique)*	18,3–29,2 L/ha *4,4–7 kg/ha*	7,4–11,8 L/ac	· Lenticules mineures. · Traiter en pulvérisation dirigée sur le feuillage. · La dose varie selon la profondeur de l'eau : – moins de 1,5 m — utiliser 18,3 L/ha (7,4 L/ac); – plus de 1,5 m — utiliser 25–29,2 L/ha (10,1–11,8 L/ac). · Utiliser dans 1700–2200 L d'eau/ha (680–880 L/ac). · Voir les remarques sur REWARD à la section précédente.

TABLEAU 19–1. Habitats et sensibilité aux herbicides des plantes aquatiques communes

	étang alimenté par une source	mare-réservoir	lac d'eau douce*	lac d'eau dure**	fossé humide***	fossé à sec****	méthode mécanique	composés de cuivre (1)	diquat (2)	amitrole (3)
Algues										
Pithophora									S-I	
Spirogyra spp.	TC	TC	C–PC		TC	PC		S	R	
Ulothrix spp.	C	TC			TC			S	R	
Mougeotia spp.	C	TC			TC			S	R	
Cladophora spp.	TC	TC	C	TC	TC	TC		S	R	
Chara spp. (charagnes)	TC	PC	C–PC	TC–PC	TC	R		S	R	
Nitella spp. (nitelles)	PC	R	TC	R	R	R		S	R	
Macrophytes submergés										
Potamot pectiné (*P. pectinatus*)	PC	C–PC		TC				R	S	
Potamot crépu (*P.crispus*)	C	TC		TC				R	S	
Potamot à grandes feuilles (*P.amplifolius*)	R	C		C				R	I	
Potamot de Richardson (*P. richardsonii*)				TC–C				R	S–I	
Potamot zostériforme (*P. zosteriformis*)				C				R	S	
Autres potamots à feuilles étroites (*Potamogeton* spp.)	PC	C	C	TC–C				R	S	
Myriophylle en épi (*Myriophyllum spicatum*)			TC					R	TS	
Myriophylle blanchissant et autres (*M. exalbescens* et autres)	C		C	TC				R	TS	
Utriculaire vulgaire (*Utricularia vulgaris*)		C		C				R	S–I	
Cornifle nageant (*Ceratophyllum demersum*)		C		TC				R	I	
Hétéranthère (*Heterantheria dubia*)				C				R	S–I	
Vallisnérie d'Amérique (*Vallisneria americana*)	R	PC	C	TC	R	R	M**	R	R	R
Naïade flexible (*Najas flexilis*)		PC		TC				R	S	
Élodée du Canada (*Elodea canadensis*)		C		TC				R	I	

TC — Très commune; C — Commune; PC — Peu commune; R — Rare.
TS — Très sensible; S — Sensible; I — Intermédiaire; R — Résistante.
M — Méthodes manuelles/mécaniques aussi efficaces que les herbicides.
M* — Méthodes manuelles/mécaniques généralement plus efficaces que les herbicides.
M** — Méthodes manuelles/mécaniques sont les seuls moyens de lutte actuellement possibles.
Il est également très courant de trouver le rubanier en tant que plante immergée dans les habitats C et D.
^ Les mauvaises herbes ayant la cote « R » peuvent souffrir du traitement, mais risquent de s'en remettre.

* — Par exemple l'eau des lacs du Muskoka est douce.
** — Par exemple l'eau des lacs de Kawartha est dure.
*** — Un fossé humide contient de l'eau au moment du traitement.
**** — Un fossé à sec ne contient pas d'eau au moment du traitement.
(1) Composés de cuivre (POLYDEX).
(2) Diquat (REGLONE A).
(3) Amitrole (AMITROL 240).

TABLEAU 19–1. Habitats et sensibilité aux herbicides des plantes aquatiques communes (suite)

	étang alimenté par une source	mare-réservoir	lac d'eau douce*	lac d'eau dure**	fossé humide***	fossé à sec****	méthode mécanique	composés de cuivre (1)	diquat (2)	amitrole (3)
Plantes emergées										
Quenouilles (*T. latifolia*, *T angustifolia*)	TC	TC		TC	TC	PC–C	M	R	R	S–I
Scirpes (*Scirpus* spp.)			C	TC	C	C	M	R		S–I
Carex (*Carex* spp. + A42)			C	C	C	TC	M	R		S–I
Rubaniers (*Sparganium* spp.)	C		C	C	C	TC	M	R		I
Plantain d'eau (*Alisma* spp.)			PC	C	C	TC		R		S
Ériocaulon (*Eriocaulon* spp.)	R	R	C	R	R	R	M*	R		
Sagittaire (*Sagittaria* spp.)		C		TC	PC–C			R		
Pontédérie (*Pontederia* spp.)			TC		PC	R		R		
Renouée amphibie (*Polygonium amphibium*)	PC	PC						R		
Brasénie (*Brasenia* spp.)			C					R		
Nénuphar blanc (*Nymphaea* spp.)			C	C			M*	R		
Nénuphar jaune (*Nuphar* spp.)		C–PC	C	C			M*	R		
Lenticule (*Lemna* spp.)	R	C	PC–R	TC				R	S	
Wolffia (*Wolffia* spp.)	R	C–PC	PC–R	TC				R	S	

TC — Très commune; C — Commune; PC — Peu commune; R — Rare.
TS — Très sensible; S — Sensible; I — Intermédiaire; R — Résistante.
M — Méthodes manuelles/mécaniques aussi efficaces que les herbicides.
M* — Méthodes manuelles/mécaniques généralement plus efficaces que les herbicides.
M** — Méthodes manuelles/mécaniques sont les seuls moyens de lutte actuellement possibles.
Il est également très courant de trouver le rubanier en tant que plante immergée dans les habitats C et D.
^ Les mauvaises herbes ayant la cote « R » peuvent souffrir du traitement, mais risquent de s'en remettre.

* — Par exemple l'eau des lacs du Muskoka est douce.
** — Par exemple l'eau des lacs de Kawartha est dure.
*** — Un fossé humide contient de l'eau au moment du traitement.
**** — Un fossé à sec ne contient pas d'eau au moment du traitement.
(1) Composés de cuivre (POLYDEX).
(2) Diquat (REGLONE A).
(3) Amitrole (AMITROL 240).

Annexes

20. ANNEXES

ANNEXE A. Personnes ayant pris part à l'élaboration du Guide 2010–2011

Membres du Comité ontarien de lutte contre les mauvaises herbes

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
- M. Cowbrough (rédacteur — Grandes cultures, Notes sur les herbicides), Guelph
- K. Callow (rédacteur — Cultures horticoles), Ridgetown
- J. Kyle, Lindsay
- H. Martin, Guelph
- G. Quesnel, Kemptville

Ministère de l'Environnement de l'Ontario
- Violet van Wassenaer, Toronto

Comité consultatif sur les pesticides de l'Ontario
- D. Lobb, Terra Cotta
- D. Mewett, Toronto
- C. Switzer, Guelph

Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario
- M. Irvine, Sault Ste. Marie

Université de Guelph
Phytotechnie
- C.J. Swanton, Guelph
- F. Tardif, Guelph
- D. Robinson, Ridgetown
- P. Sikkema, Ridgetown

Agriculture et Agroalimentaire Canada
- R. Nurse, Harrow

Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
- R. Pettigrew, Guelph

Institut canadien pour la protection des cultures
- K. Barrie, Guelph

Conseiller en cultures agréé (CCA)
- C. Chapple, Blenheim

Membres à titre individuel
- N. Cain, Acton
- R. Maloney, Mitchell
- P. Lynch, Shakespeare

Membres représentant des groupements agricoles et de producteurs spécialisés

Innovative Farmers Association of Ontario
- H. Biermans

Grains Farmers of Ontario
- C. Devitt

Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario, Guelph
- J. Wilson

Ontario Processing Vegetable Growers
- J. Mumford

Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, Guelph
- B. Muggler

Commission ontarienne de commercialisation des fruits tendres
- J. Morrison

Ontario White Bean Growers, London
- L. Anderson

Seed Corn Growers of Ontario, Chatham
- M.L. Lister-Santavy

ANNEXE B. Glossaire de la lutte contre les mauvaises herbes

adjuvant — ingrédient ajouté à la formulation ou à la bouillie pour accroître ou modifier l'action de l'herbicide ou les caractéristiques physiques de la bouillie.

amine — une des formes chimiques sous laquelle peuvent se présenter les herbicides acides ou anioniques, l'autre forme étant les sels d'ammonium. La forme amine du 2,4-D est relativement peu volatile dans la plupart des conditions climatiques.

annuelle — plante qui complète son cycle biologique à l'intérieur d'une année. Les annuelles d'été complètent ce cycle entre le printemps et l'automne. Les annuelles d'hiver germent l'automne, hivernent, puis fleurissent et complètent leur cycle biologique le printemps ou l'été suivant.

bisannuelle — plante qui complète son cycle biologique à l'intérieur d'une période de deux ans : elle germe au printemps, hiverne, fleurit le printemps ou l'été suivant, puis dépérit à l'automne.

bouillie — solution obtenue par le mélange d'un ou des herbicides dans l'eau.

compatible — se dit de produits qui peuvent être mélangés et appliqués ensemble sans que leur effet propre ni les caractéristiques physiques du mélange s'en trouvent altérés.

cotylédons — feuilles séminales. Souvent visibles après l'ouverture des graines de gros format. Il s'agit des premières feuilles visibles sur le jeune plant après la germination. Les végétaux à feuilles larges possèdent deux cotylédons, tandis que les graminées n'en possèdent qu'un seul, d'où leur nom respectif de dicotylédones et de monocotylédones.

cultures tolérantes aux herbicides — nouveaux cultivars mis au point par des techniques de sélection classiques ou des techniques transgéniques afin de tolérer certains herbicides.

demi-vie — temps nécessaire à la dégradation ou à l'inactivation dans le sol ou dans l'eau de 50 % de l'herbicide.

dicotylédone — mauvaise herbe à feuilles larges.

dormance — repos physiologique des plantes comme durant l'hiver.

échappée de traitement — plante qui survit à un désherbage chimique en raison de sa résistance ou parce que l'herbicide ne l'a pas touchée.

équivalent acide (abréviation : ÉA) (2,4-D, glyphosate) — partie active de l'herbicide acide que l'on utilise (habituellement indiquée en grammes par litre sur l'étiquette).

ester — une des formes chimiques d'un herbicide résultant de la réaction entre un herbicide acide et un alcool. Le 2,4-D et les herbicides de la même famille sous forme d'ester risquent de s'évaporer par temps chaud et d'endommager des zones non visées par le traitement.

formulation, préparation ou spécialité commerciale — synonyme de produit – matière active à laquelle sont ajoutés d'autres ingrédients destinés à en faciliter l'application ou à en améliorer l'efficacité. Les herbicides sont rarement vendus sous forme de matière active pure (2,4-D acide), mais plutôt en mélange (p. ex. le 2,4-D amine, sous forme de sel de sodium ou d'ester, combiné à des émulsifiants, à des adjuvants, à des supports, etc.).

herbicide — produit chimique toxique pour les végétaux.

herbicide de contact — herbicide qui détruit seulement les parties de la plante avec lesquelles il entre en contact. Sa diffusior est minime.

herbicides hormonaux ou phytohormones — comprennent le 2,4-D, le 2,4-DB, le mécoprop, le MCPA, le MCPB, le dichlorprop, le dicamba, le triclopyr, le piclorame. À des concentrations extrêmement faibles, ces produits chimiques peuvent stimuler ou interrompre la croissance des dicotylédones.

herbicide non sélectif — herbicide utilisé de façon à détruire toute la végétation exposée.

herbicide sélectif — herbicide utilisé de façon à détruire les mauvaises herbes sans endommager les plantes cultivées.

herbicide systémique — herbicide qui a la propriété de migrer à l'intérieur de la plante traitée.

levée — moment où les plantules commencent à sortir de terre.

matière active (ingrédient actif) — constituant de la préparation auquel est attribuée l'efficacité de l'-herbicide.

mauvaises herbes résistantes (aux herbicides) — fraction d'une population donnée de mauvaises herbes ayant hérité de la capacité de survivre à un traitement herbicide auquel était sensible le gros de la population originale.

mélange en cuve — bouillie obtenue par mélange, dans la cuve du pulvérisateur, de deux produits vendus

séparément, par opposition aux mélanges commerciaux préparés par le fabricant.

produit — ce que renferme le contenant d'herbicide tel qu'il est vendu sur le marché. En plus de la matière active, les herbicides peuvent renfermer des solvants, des surfactants ou des supports qui font partie des ingrédients inertes.

programme de désherbage — application d'un ou de plusieurs herbicides à deux stades différents de croissance de la culture et/ou des mauvaises herbes. Le deuxième traitement permet de détruire les mauvaises herbes qui ont échappé au premier ou qui posent des problèmes à divers stades de croissance de la culture.

sel de sodium — une des formes chimiques sous laquelle peuvent se présenter certains herbicides acides ou anioniques (p. ex. le 2,4-D).

sensible — se dit d'une culture qui peut être endommagée, ou d'une mauvaise herbe facilement détruite par un herbicide, aux doses recommandées.

stérilisant de sol — herbicide agissant dans le sol qu'on applique à une dose suffisamment élevée pour empêcher toute croissance de végétaux pendant au moins un an.

support — diluant ou autre substance ajouté au produit herbicide pour faciliter sa distribution uniforme sur la surface à traiter. On utilise souvent de l'eau comme support, mais aussi des produits granulaires, de l'huile ou d'autres solvants.

surfactant — produit chimique ajouté à la formulation ou à la bouillie et qui en améliore les propriétés de dispersion, d'étalement, d'adhérence ou de mouillage.

traitement en bande — pulvérisation appliquée en bandes étroites sur la ligne de semis, habituellement suivie d'un sarclage des entre-rangs.

traitement dirigé — pulvérisation dirigée vers la mauvaise herbe ou le sol de manière à éviter tout contact avec la culture.

vivace — plante qui vit plus de deux ans.

ANNEXE C. Personnel de consultation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Centre de ressources agricoles de Brighton **Numéro général : 613 475-1630 Téléc. : 613 475-3835**	95, rue Dundas E., RR 3, Brighton (Ontario) K0K 1H0		
Spécialiste des systèmes de lutte intégrée	Margaret Appleby	613 475-5850	margaret.appleby@ontario.ca
MAAARO, Guelph	1, ch.Stone Ouest, Guelph (Ontario), N1G 4Y2		
Spécialiste de l'agroforesterie	Todd Leuty	519 846-3390	todd.leuty@ontario.ca
Spécialiste des bioproduits à base de plantes	Mahendra Thimmanagari	519 826-4593 Téléc. :519 826-3567	mahendra.thimmanagari@ontario.ca
Chef du programme de protection des cultures	Denise Beaton	519 826-6594 Téléc. : 519 826-4964	denise.beaton@ontario.ca
Directrice, Développement de l'agriculture	Aileen MacNeil	519 826-6588 Téléc. : 519 826-3567	aileen.macneil@ontario.ca
Directeur, Grandes cultures	Dawn Pate	519 826-3257 Téléc. : 519 826-3567	dawn.pate@ontario. ca
Directrice, Cultures de serre, cultures de spécialité et agroforesterie	Annette Anderson	519 826-3286 Téléc. : 519 826-3567	annette.anderson@ontario.ca
Directeur, Techniques horticoles	Hugh Berges	519 826-3288 Téléc. : 519 826-3567	hugh.berges@ontario.ca
Directeur, Cultures horticoles	Bob Forrest	519 826-6941 Téléc. : 519 826-3567	bob.forrest@ontario.ca
Coordonnateur des mesures de lutte à emploi limité	Jim Chaput	519 826-3539 Téléc. : 519 826-4964	jim.chaput@ontario.ca
Chef du programme de culture biologique	Hugh Martin	519 826-4587 Téléc. : 519 826-4964	hugh.martin@ontario.ca
Spécialiste de la pomme de terre	Eugenia Banks	519 826-3678 Téléc. : 519 826-4964	eugenia.banks@ontario.ca
Spécialiste du développement des produits	Laurie Butter	519 826-4094 Téléc. : 519 826-3567	laurie.butter@ontario.ca
Spécialiste des cultures légumières	Poste vacant	519 826-4963 Téléc. : 519 826-4964	
Harrow **Numéro général : 519 738-2251 Téléc. : 519 738-4564**	Centre de recherches sur les cultures abritées et industrielles 2585, rte de comté 20, Harrow (Ont.) N0R 1G0		
Spécialiste de la pomiculture	Leslie Huffman	519 738-1256	leslie.huffman@ontario.ca
Chef du programme de lutte contre les mauvaises herbes — Horticulture	Gillian Ferguson	519 738-1258	gillian.ferguson@ontario.ca
Spécialiste des légumes de serre	Shalin Khosla	519 738-1257	shalin.khosla@ontario.ca

ANNEXE C. Personnel de consultation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (suite)

Centre de ressources agricoles de Kemptville **Numéro général : 613 258-8295 Téléc. : 613 258-8392**	C.P. 2004, route Concession, Kemptville (Ontario) K0G 1J0		
Spécialiste des cultures émergentes	Scott Banks	613 258-8359	scott.banks@ontario.ca
Chef du programme de lutte intégrée — Grandes cultures (bilingue)	Gilles Quesnel	613 258-8250	gilles.quesnel@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Lindsay **Numéro général : 705 324-6125 Téléc. : 705 324-1638**	322, rue Kent 0. Lindsay (Ontario) K9V 2Z9		
Spécialiste des fourrages	Joel Bagg	705 324-5856	joel.bagg@ontario.ca
New Liskeard **Numéro général : 1 800 461-6132 Téléc. : 705 647-7993**	280, rue Armstrong, C.P. 4070, New Liskeard (Ontario) P0J 1P0		
Agronome ruraliste	Daniel Tassé	705 647-2085	daniel.tasse@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Ridgetown **Numéro général : 519 674-1690 Téléc. : 519 674-1564**	Pavillon Agronomy, Collège de Ridgetown, C.P. 400, rue Main E., Ridgetown (Ontario) N0P 2C0		
Chef du progr. d'entomologie — Grandes cultures	Tracey Baute	519 674-1696	tracey.baute@ontario.ca
Chef du progr. de pathologie — Grandes cultures	Albert Tenuta	519 674-1617	albert.tenuta@ontario.ca
Spécialiste de la gestion du sol — Grandes cultures	Adam Hayes	519 674-1621	adam.hayes@ontario.ca
Spécialiste de la gestion du sol — Horticulture	Anne Verhallen	519 674-1614	anne.verhallen@ontario.ca
Spécialiste des cultures légumières	Elaine Roddy	519 674-1616	elaine.roddy@ontario.ca
Spécialiste des cultures légumières	Janice LeBoeuf	519 674-1699	janice.leboeuf@ontario.ca
Spécialiste du progr. de lutte contre les mauvaises herbes	Kristen Callow	519 674-1335	kristen.callow@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Simcoe **Numéro général : 519 426-7120 Téléc. : 519 428-1142**	C.P. 587, route Blueline et Autouroute 3, Simcoe (Ontario) N3Y 4N5		
Spécialiste de la technologie d'application des pesticides	Jason Deveau	519 426-8934	jason.deveau@ontario.ca
Spécialiste de la culture des petits fruits	Pam Fisher	519 426-2238	pam.fisher@ontario.ca
Chef de programme de la qualité — Marché du frais	Jennifer DeEll	519 426-1408	jennifer.deell@ontario.ca
Spécialiste du ginseng et des herbes médicinales	Sean Westerveld	519 426-4323	sean.westerveld@ontario.ca
Spécialiste de la lutte intégrée — Cultures de spécialité	Melanie Filotas	519 426-4434	melanie.filotas@ontario.ca
Spécialiste du développement de nouvelles cultures	Evan Elford	519 426-4509	evan.elford@ontario. ca
Spécialiste de la lutte intégrée — Fruits à pépins	Kathryn Carter	519 426-4322	kathryn.carter@ontario.ca
Spécialiste des cultures de transition	Jim Todd	519 426-3823	jim.todd@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Stratford **Numéro général : 519 271-0280 Téléc. : 519 273-5278**	581, rue Huron, Stratford (Ontario) N5A 5T8		
Spécialiste du canola et des haricots comestibles	Brian Hall	519 271-0083	brian.hall@ontario.ca
Spécialiste de la culture des céréales	Peter Johnson	519 271-8180	peter.johnson@ontario.ca
Spécialiste de la fertilité des sols	Keith Reid	519 271-9269	keith.reid@ontario.ca
Spécialiste de la culture du soya	Horst Bohner	519 271-5858	horst.bohner@ontario.ca

ANNEXE C. Personnel de consultation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (suite)

Centre de ressources agricoles de Vineland **Numéro général : 905 562-4141 Téléc. : 905 562-3413**	C.P. 7000, 4890, av. Victoria N., Vineland Station (Ontario) L0R 2E0		
Spécialiste de la floriculture de serre	Wayne Brown	905 562-4141 poste 179	wayne.brown@ontario.ca
Spécialiste de la lutte intégrée — Floriculture de serre	Graeme Murphy	905 562-4141 poste 106	graeme.murphy@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Vineland **Numéro général : 905 562-4147 Téléc. : 905 562-5933**	Pavillon Adv. Serv. C. P. 8000, 4890, av. Victoria N., Vineland Station (Ontario) L0R 2E0		
Chef du programme d'entomologie — Horticulture	Hannah Fraser	905 562-1674	hannah.fraser@ontario.ca
Chef du progr. de gestion des éléments nutritifs — Horticulture	Donna Speranzini	905 562-1170	donna.speranzini@ontario.ca
Spécialiste de la lutte intégrée — Fruits tendres et raisin	Wendy McFadden-Smith	905 562-3833	wendy.mcfadden-smith@ontario.ca
Spécialiste des fruits tendres et du raisin	Ken Slingerland	905 562-1639	ken.slingerland@ontario.ca
Centre de ressources agricoles de Woodstock **Numéro général : 519 537-6621 Téléc. : 519 539-5351**	C.P. 666, autoroute 59 N., Woodstock (Ontario) N4S 7Z5		
Chef du programme de gestion des éléments nutritifs — Grandes cultures	Christine Brown	519 537-8305	christine.brown1@ontario.ca
Université de Guelph **Numéro général : 519 824-4120**	50, chemin Stone E., Guelph (Ontario) N1G 2W1		
Coordonnateur de la recherche appliquée — Grandes cultures, Pavillon Crop Science	Ian McDonald	519 824-4120 poste 56707 Téléc. : 519 763-8933	ian.mcdonald@ontario.ca
Chef du programme de l'industrie du maïs, Pavillon Crop Science	Greg Stewart	519 824-4120 poste 54865 Téléc. : 519 763-8933	greg.stewart1@ontario.ca
Spécialiste des cultures de pépinière, Pavillon Edmund Bovey	Jennifer Llewellyn	519 824-4120 poste 52671 Téléc. : 519 767-0755	jennifer.llewellyn@ontario.ca
Chef du programme de nutrition — Horticulture, Ressources en terre, Pavillon Richards	Christoph Kessel	519 824-4120 poste 52480 Téléc. : 519 824-5730	christoph.kessel@ontario.ca
Chef du progr. de pathologie — Horticulture, Pavillon Edmund Bovey	Michael Celetti	519 824-4120 poste 58910 Téléc. : 519 767-0755	michael.celetti@ontario.ca
Spécialiste des gazons, Institut du gazon de Guelph 328, ch. Victoria S., R. R. 2, Guelph (Ontario) N1H 6H8	Pam Charbonneau	519 824-4120 poste 52597 Téléc. : 519 766-1704	pam.charbonneau@ontario.ca
Chef du programme de lutte contre les mauvaises herbes — Grandes cultures, Pavillon Crop Science, pièce 303	Mike Cowbrough	519 824-4120 poste 52580 Téléc. : 519 763-8933	mike.cowbrough@ontario.ca

Centre d'information agricole
Service sans frais d'Information technique et commerciale offert aux entreprises agricoles, agro-alimentaires et rurales de la province
1, ch. Stone Ouest
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Tél.: 519 826-4047
Sans frais : 1 877 424-1300
Téléc. : 519 826-7610
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca

ANNEXE D. Ministère de l'Environnement de l'Ontario — coordonnées des bureaux régionaux

RÉGION Comté	Adresse	Téléphone et télécopieur
Centre Toronto, Halton, Peel, York, Durham, Muskoka, Simcoe	5775, rue Yonge, 8e étage Toronto (Ontario) M2M 4J1	Tél. : 416 326-6700 Sans frais : 1 800 810-8048 Téléc. : 416 325-6345
Centre-ouest Haldimand, Norfolk, Niagara, Hamilton-Wentworth, Dufferin, Wellington, Waterloo, Brant	Édifice gouvernemental — Ontario 119, rue King O., 12e étage Hamilton (Ontario) L8P 4Y7	Tél.: 905 521-7640 Sans frais : 1 800 668-4557 Téléc. : 905 521-7820
Est Frontenac, Hastings, Lennox et Addington, Prince Edward, Leeds et Grenville, Prescott et Russell, Stormont/Dundas et Glengarry, Haliburton, Peterborough, Kawartha Lakes, Northumberland, Renfrew, Ottawa, Lanark, District du Nipissing (Canton d'Algonquin Sud)	1259, ch. Gardiners, Unité 3 C.P. 22032 Kingston (Ontario) K7M 8S5	Tél. : 613 549-4000 Sans frais : 1 800 267-0974 Téléc. : 613 548-6908
Sud-ouest Elgin, Middlesex, Oxford, Essex, Kent, Lambton, Bruce, Grey, Huron, Perth	733, ch. Exeter, London (Ontario) N6E 1L3	Tél. : 519 873-5000 Sans frais : 1 800 265-7672 Téléc. : 519 873-5020
Nord-est Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Sudbury, Algoma Est, Timiskaming, Sault Ste. Marie	199, rue Larch, bur. 1201 Sudbury (Ontario) P3E 5P9	Tél. : 705 564-3237 Sans frais : 1 800 890-8516 Téléc. : 705 564-4180
Nord-ouest Algoma (Ouest), Cochrane, Kenora, Rainy River, Thunder Bay	435, rue James S., bur. 331 Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7	Tél. : 807 475-1205 Sans frais : 1 800 875-7772 Téléc. : 807 475-1754
Direction de l'élaboration des normes	Section des pesticides 40, av. St. Clair O., 7e étage Toronto (Ontario) M4V 1M2	Tél. : 416 327-5519 Téléc. : 416 327-2936
Direction des autorisations	Autorisation des pesticides 2, av. St. Clair O., Étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5	Tél. : 416 314-8001 Sans frais : 1 800 461-6290 Téléc. : 416 314-8452

ANNEXE E. Autres ressources

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA — CENTRES DE RECHERCHES

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181591790641&lang=fra

Centre de recherches de l'Est sur les céréales et les oléagineux
960, av. Carling
Ottawa K1A 0C6
Tél. : 613 759-1952

Centre de recherches sur les cultures abritées et industrielles
2585, route de comté 20
Harrow N0R 1G0
Tél. : 519 738-2251

Centre de recherches du Sud sur la phytoprotection et les aliments
1391, rue Sandford
London N5V 4T3
Tél. : 519 457-1470

Ferme expérimentale de Vineland
4902, av. Victoria Nord
Vineland L0R 2E0
Tél. : 905 562-4113

Ferme expérimentale de Delhi
C.P. 186, ch. Schafer
Delhi N4B 2W9
Tél. : 519 582-1950

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS (PHYTOPROTECTION)

www.inspection.gc.ca/francais/tocf.shtml

Belleville
345, rue College Est
Belleville K8N 5S7
Tél. : 613 969-3333

Brantford
625, ch. Park N, pièce 6
Brandford (Ontario) N3T 5P9
Tél. : 519 752-3478

Hamilton
709, rue Main Ouest, pièce 101
Hamilton L8S 1A2
Tél. : 905 572-2201

London
100, ch. Commissioners Est, bur. 19
London N5Z 4R3
Tél. : 519 691-1300

District d'Ottawa
38, ch. Auriga, bur. 8
Nepean (Ontario) K2E 8A5
Tél. : 613 274-7374 poste 221

Toronto
1124, av. Finch Ouest, bur. 2
Toronto M3J 2E2
Tél. : 416 665-5055

UNIVERSITÉ DE GUELPH

Campus principal
Guelph N1G 2W1
Tél. : 519 824-4120
www.uoguelph.ca

Campus d'Alfred
Alfred K0B 1A0
Tél. : 613 679-2218
www.alfredc.uoguelph.ca

Campus de Kemptville
Kemptville K0G 1J0
Tél. : 613 258-8336
www.kemptvillec.uoguelph.ca

Campus de Ridgetown
Ridgetown N0P 2C0
Tél. : 519 674-1500
www.ridgetownc.on.ca

Département de Phytotechnie

www.plant.uoguelph.ca

Département de Phytotechnie, Guelph
50, ch. Stone Ouest
Guelph N1G 2W1
Tél. : 519 824-4120 poste 56083 ou 52693

Département de Phytotechnie, Simcoe
1283, ch. Blueline, C.P. 587
Simcoe N3Y 4N5
Tél. : 519 426-7127

Département de Phytotechnie, Vineland
C.P. 7000, 4890, av. Victoria Nord
Vineland Station L0R 2E0
Tél. : 905 562-4141

Division des services de laboratoire
www.uoguelph.ca/labserv/
95, ch. Stone Ouest
Guelph (Ontario) N1H 8J7

Pesticides et micro-contaminants
Tél. : 519 823-1268

Clinique de diagnostic phytosanitaire
Tél. : 519 767-6256

ANNEXE F. Service de diagnostic

Les échantillons destinés au diagnostic de maladies, à l'identification d'insectes ou de mauvaises herbes, ou au dépistage de nématodes ou du champignon *Verticillium* peuvent être expédiés à la :

Clinique de diagnostic phytosanitaire
Division des services de laboratoire
Université de Guelph
95, ch. Stone O.
Guelph (Ontario) N1H 8J7
Tél. : 519 767-6256
Téléc. : 519 767-6240
Courriel : pdc@lsd.uoguelph.ca

Le paiement doit accompagner les échantillons au moment de leur présentation. On peut se procurer les formules de présentation sur le site suivant : *http://www.labservices.uoguelph.ca/units/pdc/*.

Tarifs

Pour obtenir de l'information sur les tarifs, consulter les services de laboratoire à *www.labservices.uoguelph.ca/units/pdc/* ou téléphoner à la Clinique de diagnostic phytosanitaire.

ANNEXE G. Système international d'unités (SI)

Unités de longueur

10 millimètres (mm)	=	1 centimètre (cm)
100 centimètres (cm)	=	1 mètre (m)
1 000 mètres	=	1 kilomètre (km)

Unité de surface

100 m x 100 m = 10 000 m^2	=	1 hectare (ha)
100 ha	=	1 kilomètre carré (km^2)

Unités de volume

Solides

1 000 millimètres cubes (mm^3)	=	1 centimètre cube (cm^3)
1 000 000 cm^3	=	1 mètre cube (m^3)

Liquides

1 000 millilitres (mL)	=	1 litre (L)
100 L	=	1 hectolitre (hL)

Équivalences poids-volume (pour l'eau)

(1,00 kg) 1 000 grammes	=	1 litre (1,00 L)
(0,50 kg) 500 g	=	500 mL (0,50 L)
(0,10 kg) 100 g	=	100 mL (0,10 L)
(0,01 kg) 10 g	=	10 mL (0,01 L)
(0,001 kg) 1 g	=	1 mL (0,001 L)

Unités de poids

1 000 milligrammes (mg)	=	1 gramme (g)
1 000 g	=	1 kilogramme (kg)
1 000 kg	=	1 tonne (t)
1 mg/kg	=	1 partie par million (ppm)

Équivalences solides-liquides

1 cm^3	=	1 mL
1 m^3	=	1 000 L

Du SI au système impérial (approx.)

litres à l'hectare × 0,09	=	gallons à l'acre
litres à l'hectare × 0,36	=	pintes à l'acre
litres à l'hectare × 0,71	=	chopines à l'acre
millilitres à l'hectare × 0,015	=	onces liquides à l'acre
grammes à l'hectare × 0,015	=	onces à l'acre
kg à l'hectare × 0,89	=	livres à l'acre
tonnes à l'hectare × 0,45	=	tonnes imp. à l'acre

Du système impérial au SI (approx.)

gallons à l'acre × 11,23	=	litres à l'hectare (L/ha)
pintes à l'acre × 2,8	=	litres à l'hectare (L/ha)
chopines à l'acre × 1,4	=	litres à l'hectare (L/ha)
onces liquides à l'acre × 70	=	millilitres à l'hectare (mL/ha)
tonnes imp. à l'acre × 2,24	=	tonnes à l'hectare (t/ha)
livres à l'acre × 1,12	=	kg à l'hectare (kg/ha)
onces à l'acre × 70	=	grammes à l'hectare (g/ha)

Équivalences liquides

Litres/hectare		*Gallons/acre (approx.)*
50	=	5
100	=	10
150	=	15
200	=	20
250	=	25
300	=	30

Équivalences solides

Grammes ou kilogrammes par hectare		*Onces ou livres par acre*
100 grammes	=	1 1/2 once
200 grammes	=	3 onces
300 grammes	=	4 1/4 onces
500 grammes	=	7 onces
700 grammes	=	10 onces
1,10 kilogramme	=	1 livre
1,50 kilogramme	=	1 1/4 livre
2,00 kilogrammes	=	1 3/4 livre
2,50 kilogrammes	=	2 1/4 livres
3,25 kilogrammes	=	3 livres
4,00 kilogrammes	=	3 1/2 livres
5,00 kilogrammes	=	4 1/2 livres
6,00 kilogrammes	=	5 1/4 livres
7,50 kilogrammes	=	6 3/4 livres
9,00 kilogrammes	=	8 livres
11,00 kilogrammes	=	10 livres
13,00 kilogrammes	=	11 1/2 livres
15,00 kilogrammes	=	13 1/2 livres

Autres equivalences

5 mL	=	1 cuil. à thé
15 mL	=	1 cuil. à soupe
28,5 mL	=	1 oz (liq.)

Facteurs de conversion du SI au système impérial

Longueur		
1 millimètre (mm)	=	0,04 pouce
1 centimètre (cm)	=	0,40 pouce
1 mètre (m)	=	39,40 pouces
1 mètre (m)	=	3,28 pieds
1 mètre (m)	=	1,09 verge
1 kilomètre (km)	=	0,62 mille
Surface		
1 centimètre carré (cm^2)	=	0,16 pouce carré
1 mètre carré (m^2)	=	10,77 pieds carrés
1 mètre carré (m^2)	=	1,20 verge carrée
1 kilomètre carré (km^2)	=	0,39 mille carré
1 hectare (ha)	=	107 636 pieds carrés
1 hectare (ha)	=	2,5 acres
Volume (solides)		
1 centimètre cube (cm^3)	=	0,061 pouce cube
1 mètre cube (m^3)	=	1,31 verge cube
1 mètre cube (m^3)	=	35,31 pieds cubes
1 000 mètres cubes (m^3)	=	0,81 acre-pied
1 hectolitre (hL)	=	2,8 boisseaux
Volume (liquides)		
1 millilitre (mL)	=	0,035 once liquide
1 litre (L)	=	1,76 chopine
1 litre (L)	=	0,88 pinte
1 litre (L)	=	0,22 gallon (imp.)
1 litre (L)	=	0,26 gallon (US)
Poids		
1 gramme (g)	=	0,035 once
1 kilogramme (kg)	=	2,21 livres
1 tonne (t)	=	1,10 tonne impériale
1 tonne (t)	=	2205 livres
Pression		
1 kilopascal (kPa)	=	0,15 livre par pouce carré
Vitesse		
1 mètre à la seconde	=	3,28 pieds à la seconde
1 mètre à la seconde	=	2,24 milles à l'heure
1 kilomètre à l'heure	=	0,62 mille à l'heure
Température		
°F	=	(°C × 9/5) + 32

Facteurs de conversion du système impérial au SI

Longueur		
1 pouce (po)	=	2,54 cm
1 pied (pi)	=	0,30 m
1 verge	=	0,91 m
1 mille	=	1,61 km
Surface		
1 pied carré	=	0,09 m^2
1 verge carrée	=	0,84 m^2
1 acre	=	0,40 ha
Volume (solides)		
1 verge cube	=	0,76 m^3
1 boisseau	=	36,37 L
Volume (liquides)		
1 once liquide (imp.)	=	28,41 mL
1 chopine (imp.)	=	0,57 L
1 gallon (imp.)	=	4,55 L
1 gallon (US)	=	3,79 L
Poids		
1 once (oz)	=	28,35 g
1 livre	=	453,6 g
1 tonne impériale	=	0,91 tonne (SI)
Pression		
1 livre par pouce carré	=	6,90 kPa
Température		
°C	=	(°F – 32) × 5/9

TEMPÉRATURE



Pour calculer une valeur précise, utiliser une des formules suivantes :
De Farenheit à Celsius : soustraire 32, et multiplier par 5/9.
De Celsius à Farenheit : multiplier par 9/5 et ajouter 32.

Abréviations

%	= pourcentage (au poids)
% v/v	= pourcentage (au volume)
AP	= poudre à usage agricole
cm	= centimètre
cm^2	= centimètre carré
DG	= granulés secs
DP	= poudre dispersable
E	= émulsion
EC	= concentré émulsifiable
F	= pâte fluide
g	= gramme
Gr	= granulé
ha	= hectare
kg	= kilogramme
km/h	= kilomètre à l'heure
kPa	= kilopascal
L	= litre
m	= mètre
m/s	= mètre à la seconde
m^2	= mètre carré
m.a.	= matière active
mL	= millilitre
mm	= millimètre
p. ex.	= par exemple
SC	= concentré à pulvériser
SP	= poudre soluble
t	= tonne (SI)
W	= poudre mouillable
WDG	= granulés dispersables dans l'eau
WP	= poudre (mouillable)

ANNEXE H. Fabricants et distributeurs d'herbicides

CODE	NOM	TÉLÉPHONE	PAGE WEB
ADJ	ADJUVANTS PLUS INC.	1 877 512-4659	*www.adjuvantsplus.*
AGR	AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES.	1 519 757-0077	*www.agriumat.com/ca*
BAZ	BASF CANADA INC.	1 877 371-2273	*www.agsolutions.ca*
BCZ	BAYER CROPSCIENCE INC.	1 877 938-3737	*www.bayercropscience.ca*
CAU	CHEMINOVA CANADA	1 888 316-6260	*www.cheminova.com*
CRE	CROMPTON CORPORATION	1 800 265-2156	*www.cromptoncorp.com*
DUQ	DUPONT CANADA INC.	1 800 667-3925	*www.dupont.ca/ag/*
DWE	DOW AGROSCIENCES CANADA INC.	1 800 667-3852	*www.dowagro.com/ca*
ENR	ENVIROSCIENCE LABORATORIES INC.	1 800 567-1191	*www.wateronnet.com*
ENF	THE ENVIRONMENTAL FACTOR	1 905 571-5824	*www.environmentalfactor.com*
GOW	GOWAN COMPANY	1 800 883-1844	*www.gowanco.com*
GRN	GRIFFIN CORP.	1 912 242-8635	*www.griffinllc.com*
INT	INTERPROVINCIAL COOPERATIVE LIMITED	1 204 233-3461	*www.ipco.ca*
MOX	MONSANTO CANADA INC.	1 800 667-4944	*www.monsanto.ca*
NOC	NORAC CONCEPTS INC.	1 519 821-3633	*www.noracconcepts.com*
NUA	NUFARM AGRICULTURE INC.	1 800 868-5444	*www.nufarm.ca*
PLG	PLANT PRODUCTS CO. LTD.	1 800 387-2449	*www.plantprod.com*
SAR	SARRITOR		*www.sarritor.ca*
SGF	SCOTTS CANADA LTD.	1 800 668-5669	*www.scottscanada.ca*
SYZ	SYNGENTA CROP PROTECTION CANADA INC.	1 800 459-2422	*www.syngenta.ca*
TES	TESSESDERLO KERLEY INC.	1 515 201-2649	*www.NovaSource.com*
TIU	ECOVAL	1 866 298-2229	*www.ecoval.ca*
UAG	UNITED AGRI PRODUCTS	1 800 265-4624	*www.uap.ca*
VAJ	VALENT CANADA INC.		*www.valent.ca*
WBR	WILBUR-ELLIS COMPANY OF CANADA LTD.	1 306 242-4553	*www.wilburellis.com*

ANNEXE I. Liste de sites Web de référence sur la lutte contre les mauvaises herbes

	Comité consultatif sur les pesticides de l'Ontario	1 416 314-9233	*www.opac.gov.on.ca*
	Page du MAAARO sur les mauvaises herbes		*www.ontario.ca/crops*
	Étiquettes de produits		*www.eddenet.pmra-arla.gc.ca/francais/4.0/4.01.asp*
	Canadian Weed Science Society		*www.cwss-scm.ca*
	Mauvaises herbes résistantes de l'Ontario		*www.plant.uoguelph.ca/resistant-weeds/*
	Outil de recherche d'herbicide — Maïs (Ontario)		*www.weedpro75.com*
	Page sur les mauvaises herbes du Collège de Ridgetown		*www.ridgetownc.com/services/weeds_index.cfm*
	Banque de données sur les mauvaises herbes de l'Ontario		*www.ontarioweeds.com*

ANNEXE J. Usage responsable du glyphosate dans les grandes cultures

Bien que les cultures tolérant le glyphosate et le Roundup Ready soient d'une grande utilité :

- Le nombre de mauvaises herbes résistant le glyphosate risque d'augmenter si ce produit n'est pas utilisé correctement;
- On trouve déjà aux États-Unis des peuplements de petite herbe à poux, de grande herbe à poux, de diverses amarantes dont l'amarante rugueuse, et de vergerette du Canada qui sont résistants au glyphosate;
- Il n'existe actuellement aucun nouvel herbicide pouvant se substituer au glyphosate.

Les producteurs de l'Ontario ont l'occasion de devenir des figures de proue dans la gestion responsable du glyphosate. Voici les directives qu'a élaborées le Comité ontarien de lutte contre les mauvaises herbes dans le but de réduire au minimum les risques d'apparition de mauvaises herbes résistant le glyphosate :

1) Identifier les mauvaises herbes à combattre

- Faire le dépistage des mauvaises herbes et établir les densités de peuplement. Les producteurs que la tâche rebute ou qui ne se sentent pas à la hauteur peuvent faire appel à un conseiller en cultures.

2) Se doter d'un plan d'action

- Une fois le dépistage terminé, se faire aider d'un conseiller en cultures pour élaborer un plan de lutte à long terme contre les mauvaises herbes à combattre.

Le plan doit tenir compte des SEPT ÉTAPES D'UNE UTILISATION RESPONSABLE DU GLYPHOSATE.

Étape 1 : Ne recourir à la technologie « Roundup Ready » que dans les champs où elle sera le plus profitable sur le plan économique.

Étape 2 : Pratiquer une rotation entre les cultures « Roundup Ready » et les cultures traditionnelles ou des cultures tolérant d'autres herbicides, et pratiquer une alternance entre des herbicides ayant des modes d'action différents.

Étape 3 : Toujours employer la pleine dose de glyphosate indiquée sur l'étiquette.

Étape 4 : S'il y a lieu, faire le mélange de glyphosate et d'herbicides rémanents dans la cuve du pulvérisateur.

Étape 5 : Recourir au sarclage, s'il y a lieu.

Étape 6 : Être à l'affût des mauvaises herbes pouvant développer une résistance au glyphosate et signaler tout peuplement soupçonné d'y être résistant en appelant le 1 877 424-1300.

Étape 7 : Combattre les mauvaises herbes échappant au traitement et en limiter la dissémination.

Pour de l'information sur les cas de résistances, voir le site *www.plant.uoguelph.ca/resistant-weeds*

* n.d.t. : Pour connaître les correspondances entre les noms français et anglais des mauvaises herbes, se reporter au tableau 18-2, p. 388.

ANNEXE K. Registre d'épandage des herbicides

Matériel d'application utilisé :

Capacité de la cuve :	**Type de buse et pression :**	**Commentaires :**

Vitesse ou embrayage du tracteur en tours/min :

Quantité de bouillie épandue par hectare ou par acre :

Renseignements sur le traitement								Conditions environnementales		
Identification du champ (lieu et superficie)	**Date et heure du traitement**	**Culture et stade de croissance**	**Groupe de produit (résistance)**	**Herbicide utilisé (concentration)**	**Quantité de produit par ha ou par acre**	**Quantité d'eau par ha ou par acre**	**Nombre de cuves par champ**	**Vitesse et direction du vent**	**Température**	**Humidité du sol**

Mesures d'urgence et premiers soins en cas d'empoisonnement par un pesticide

Si un pesticide fait l'objet d'un déversement important, d'un vol ou d'un incendie, le signaler au ministère de l'Environnement au **1 800 268-6060.**

En cas d'empoisonnement par un pesticide ou de blessures causées par un pesticide, appeler le Centre antipoisons :

Toronto	1 800 268-9017
Ottawa (service bilingue)	1 800 267-1373
Malentendants (ATS)	1 877 750-2233

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

- **Lire l'étiquette.** Prendre toutes les précautions recommandées sur l'étiquette. Lire les consignes de premiers soins sur l'étiquette AVANT de manipuler le pesticide.
- **Mettre quelqu'un au courant** des produits qu'on s'apprête à employer et de l'endroit où l'on se trouvera.
- **Garder en dossier les étiquettes et fiches signalétiques des produits employés.** S'assurer que tout le monde sait où trouver ce dossier en cas d'urgence.
- **Afficher les numéros d'urgence près de tous les téléphones.**
- **Garder à portée de la main de l'eau claire, des essuie-tout, des gants de rechange et des survêtements propres** pour le cas où l'on répandrait du produit sur soi.

Si l'on croit qu'une personne ayant manipulé un pesticide présente des symptômes d'empoisonnement ou des blessures causées par ce pesticide, intervenir immédiatement.

Publié par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Toronto, Canada

ISSN 0836-1088 RV 12-09-2M

MESURES À PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT OU D'EMPOISONNEMENT

- En premier lieu, se protéger soi-même.
- Soustraire la victime à l'exposition au pesticide en la déplaçant hors des lieux contaminés.
- Réunir les 4 données essentielles : nom du produit, quantité, voie d'entrée et durée d'exposition.
- Appeler l'ambulance ou le Centre antipoisons.
- Commencer à donner les premiers soins en sachant que ceux-ci ne sauraient remplacer des soins médicaux.
- **Fournir sur place au personnel affecté aux urgences ou apporter avec soi à l'hôpital l'étiquette, la fiche signalétique ou le contenant.** Ne pas transporter de contenants de pesticide dans la cabine du véhicule réservée aux passagers.

PREMIERS SOINS

Si un pesticide entre en contact avec la peau :

- enlever tous les vêtements contaminés; laver la peau à fond à l'eau tiède, avec beaucoup d'eau et de savon;
- bien assécher la peau et la recouvrir de vêtements ou d'autres tissus propres.

Si un pesticide entre en contact avec les yeux :

- maintenir les paupières écartées et laver les yeux à l'eau claire sous le robinet pendant au moins 15 minutes.

Si un pesticide a été inhalé :

- déplacer la victime à l'air frais et desserrer ses vêtements;
- administrer la respiration artificielle si la personne a cessé de respirer.

Prendre garde de ne pas respirer l'air expiré par la victime, sous peine de s'empoisonner à son tour.

Si un pesticide a été ingéré :

- **appeler IMMÉDIATEMENT le Centre antipoisons.**

Les numéros de téléphone d'urgence figurent au début de chaque annuaire de téléphone Bell.

Pour obtenir des exemplaires de cette publication ou de toute autre publication du MAAARO, on peut faire la commande :

- en ligne à l'adresse www.serviceontario.ca/publications
- par téléphone, au centre ServiceOntario, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h 00 HE :
  - 416 326-5300
  - 416 326-3408 (ATS)
  - 1 800 668-9938, sans frais partout au Canada
  - 1 800 368-7095, sans frais en Ontario
- en personne, à un centre ServiceOntario partout en Ontario.

Mesures d'urgence et premiers soins en cas d'empoisonnement par un pesticide

Si un pesticide fait l'objet d'un déversement important, d'un vol ou d'un incendie, le signaler au ministère de l'Environnement au **1 800 268-6060.**

En cas d'empoisonnement par un pesticide ou de blessures causées par un pesticide, appeler le Centre antipoisons :

Toronto	1 800 268-9017
Ottawa (service bilingue)	1 800 267-1373
Malentendants (ATS)	1 877 750-2233

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

- **Lire l'étiquette.** Prendre toutes les précautions recommandées sur l'étiquette. Lire les consignes de premiers soins sur l'étiquette AVANT de manipuler le pesticide.
- **Mettre quelqu'un au courant** des produits qu'on s'apprête à employer et de l'endroit où l'on se trouvera.
- **Garder en dossier les étiquettes et fiches signalétiques des produits employés.** S'assurer que tout le monde sait où trouver ce dossier en cas d'urgence.
- **Afficher les numéros d'urgence près de tous les téléphones.**
- **Garder à portée de la main de l'eau claire, des essuie-tout, des gants de rechange et des survêtements propres** pour le cas où l'on répandrait du produit sur soi.

Si l'on croit qu'une personne ayant manipulé un pesticide présente des symptômes d'empoisonnement ou des blessures causés par ce pesticide, intervenir immédiatement.

MESURES À PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT OU D'EMPOISONNEMENT

- En premier lieu, se protéger soi-même.
- Soustraire la victime à l'exposition au pesticide en la déplaçant hors des lieux contaminés.
- Réunir les 4 données essentielles : nom du produit, quantité, voie d'entrée et durée d'exposition.
- Appeler l'ambulance ou le Centre antipoisons.
- Commencer à donner les premiers soins en sachant que ceux-ci ne sauraient remplacer des soins médicaux.
- **Fournir sur place au personnel affecté aux urgences ou apporter avec soi à l'hôpital l'étiquette, la fiche signalétique ou le contenant.** Ne pas transporter de contenants de pesticide dans la cabine du véhicule réservée aux passagers.

PREMIERS SOINS

Si un pesticide entre en contact avec la peau :

- enlever tous les vêtements contaminés, laver la peau à fond à l'eau tiède, avec beaucoup d'eau et de savon;
- bien assécher la peau et la recouvrir de vêtements ou d'autres tissus propres.

Si un pesticide entre en contact avec les yeux :

- maintenir les paupières écartées et laver les yeux à l'eau claire sous le robinet pendant au moins 15 minutes.

Si un pesticide a été inhalé :

- déplacer la victime à l'air frais et desserrer ses vêtements;
- administrer la respiration artificielle si la personne a cessé de respirer.

Prendre garde de ne pas respirer l'air expiré par la victime, sous peine de s'empoisonner à son tour.

Si un pesticide a été ingéré :

- **appeler IMMÉDIATEMENT le Centre antipoisons.**

Les numéros de téléphone d'urgence figurent au début de chaque annuaire de téléphone Bell.

Publié par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
Toronto, Canada

ISSN 0836-1063 RV 12-09-2M

Pour obtenir des exemplaires de cette publication ou de toute autre publication du MAARO, on peut faire la commande :

- en ligne à l'adresse www.serviceontario.ca/publications;
- par téléphone au centre ServiceOntario du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h 00 HE :
  416 326-5300
  416 326-3408 (ATS)
  1 800 668-9938, sans frais partout au Canada
  1 800 268-7095, sans frais en Ontario;
- en personne, à un centre ServiceOntario partout en Ontario.





Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales remercie Syngenta Crop Protection Inc. pour sa contribution financière en vue de couvrir le coût des onglets de la présente édition du *Guide de lutte contre les mauvaises herbes*.

syngenta

ontario.ca/cultures

Ontario